



45 A. 15 2-1.





CATALOGUE

des Plantes

du

JARDIN BOTANIQUE

de Krzemieniec en Volhynie.



l' An. 1810.

BIBLIOTH ONLY



42712



Ous offrons au public le Catalogue des plantes d'un jardin qui tout recemment vient d'être ouvert et consacré à une partie de la plus vaste des sciences: nous parlons de l'inépuisable étude de la Nature.

Ce jardin établi prés du Gymnase de Krzemieniec est un des nombreux et riches moyens que la munificence du MONAR-QUE ami et Protecteur des sciences et la générosité des Citoyens ont créés comme par enchantement pour les offrir à la jeunesse animée du desir de s'instruire et qui y trouve un temple de sciences propres à

A. 2

ele-

élever le coeur et l'esprit, et tout ce qui, peut former un homme d'état, un savant, et un particulier éclairé.

L' Histoire naturelle, comme les autres sciences est traitée ici dans toute son étendue. Les fondateurs de cet Institut en ouvrant ce jardin n' ont pas borné son utilité seulement aux élèves de la Botanique. En reconnaissant la nécessité de la Flore du pays pour le progrès de la science en général, ils préparerent les moyens de la completer. Dans peu, un hôpital et l' Institut de Chirurgie dans toutes ses parties vont augmenter le nombre des établissemens utiles à Krzemieniec. Ceux qui s' y voueront au service de l'humanité, tout en se livrant à l'étude de la Botanique comme science qui leur deviendra indispensable, pourront en même temps contribuer au progrès de la Flore et atteindre par là double but. Les élèves du jardinage pratique que les particuliers entretiennent auprès de ce jardin, peuvent y puiser des connaissances capables de developper leur génie et de les élever à la hauteur de la science.

La plan de ce jardin fut tracé, il y a quatre aus par Mr. M' Clair qui a fait la découverte de la belle Azalée pontique dans les forêts de la Volhynie. Mr. M' Clair fut aidé de conseils de feu Mr. Scheidt ci-devant Professeur de l' Histoire Naturelle à Cracovie, et qui occupa le premier la même chaire à Krzemieniec. La mort de cet homme éstimable cher aux sciences et pleuré par ses nombreux amis, suspendit le progrés du jardin.

Ayant été appellé ici au mois de Septembre de l'année derniere pour remplacer feu Mr: Scheidt, nous présentons au public ce Catalogue des plantes qui existent dans notre jardin botanique et nous sommes préts à en communiquer les sémences et les doubles aux amateurs à mesure que nos richeses augmenteront.

Le nombre des plantes que nous offrons, au public est à la vérité encore bien modique; mais nous nous flattons de l'espoir qu' avec le secours de nos bienfaiteurs et de nos amis, nous pourrons l'augmenter considérablement dans peu d'années, sans cependant oser nous flatter d'approcher jamais des richesses immenses du magnifique jardin de Gorenki près de Moscou, où le respectable proprietaire S. E. Mr. le Comte Alexis Rozumowski Ministre actuel de l'instruction publique a rassemblé une collection étonnante et justement admirée de l'Europe.

Nous aurons soin chaque année de faire connaître dans un Supplément au présent Catalogue les nouvelles ácquisitions que le jardin aura faites. Ces divers Catalogues seront autant d'hommages que nous croyons devoir à nos bienfaiteurs, et fourniront des matériaux pour l'histoire de ce Gymnase, lequel à tous égards semble s'avancer rapidement vers ce degré de perfection où il a droit de prétendre vû le zêle infatigable de nos chefs, étayé de la libéralité sans èxemple des Citoyens

C'est à cette même libéralité des Cito-

Si en attendant M. M. les amateurs des jardins et de Botanique voulaient bien nous faire part de leurs découvertes et nous enrichir de leur superflu; non seulement ils allégeraient de beaucoup notre travail et augmenteraient notre collection, mais encore ils contribueraient à hater les progrès d'une science aussi utile qu'agréable. Nous osons les supplier de nous accorder cette faveur. De notre côté nous nous croirons heureux de pouvoir leur rendre le meme service et leur temoigner de cette maniere notre vive reconnoissance. ninged (disposit) s

to alsombay bell of

ab Implification I robustant de

, leakened the seller

W. Besser Docteur en Médecine et Professeur de Zoologie et Botanique.

Abbreviations emploiées dans co Catalogue.

and among the fact with

B. signifie M: Boreyko. G. — Grabowski. H. Cr. _ le jardin botanique à Cracovic. H.G. — le meme de Gætingue. H.P. — — le jardiu des plantes à Paris. H.PK. — le jardin à Foryck. H. S. — — le meme de Sielec. - le jardin botanique à Vienne. H.V. H.VL. __ _ a Vilna Jacq. — M. le Baron (Nicolas) Jacquin. Sch. — M. le Professeur Schmidt. Waldst. et Kif. - M. le Cte. Waldstein et Professeur Kitaibel, célebres Botanistes hongrois. Willd. - M. Willdenow Professeur de Botanique à Berlin.

CATA-



CATALOGUE

ABROMA augusta H. Cr. ABRUS præcatorius G. ACALIPHA hispida H. V. alopecuroides H.V ACAN'THUS mollis H.PK spinosus B. ACER campestre negundo H. PK. platanoides pseudoplatanus

tatarica B. ACHANIA malvaviseus H.C. ACHILLEA alpina H. G. filicifolia Bieberst impatiens G. lugustica H. G: magna H. Cr. millefolium. nobilis H. V. ptarmica fl plenoC pubescens setacea *speciosa Achi

ACHIMENES coccinea 1) B ACHYRANTHES aspera H. G.

ficoidea 2) H.VL!

' javanica 3) H. VI. | capillus H. PK lanata 4) H. Cr. lappacea H VG. patula H. V. porrigens Jacquini

sessilis 5) H. G.

ACONITUM

* cammarism Ivcoctonum G. vulgare Trattinik AESCULUS

AEGOPODIUM . neomontanum G. | podagraria

* variegatum H. PKI hippocastanum-

ACORUS

calamus

ACTEA spicata

ACYNOS

valgaris 6) et Cr! ADIANTUM

ADONIS vernalis

ADOXA

moschatellina

AEGILOPS

ovata H. Cr.

* squarrosa H. G. triuncialis H.V.G.

AETHU-

1) Cyrilla pulchella l' Herit. 2)Gomphræna ficoidea Willd. 3) Illecebrum javanicum Willd. 4) J. lanatum Willd. 5) J. sessille Willd. 6) Thymus acynos Linne.

AETHUSA cynapium AGAPATHUS * multiflorus H3 PK. et S. umbellatus B.

AGAVE

americana H. Cr.

* lurida B.

AGERATUM convzoides G.

AGRIMONIA cuputorium

AGROSTEMMA

coeli rosa H. Cr. coronaria B.

etflor.plenisH PK.

githago

niceensis H. V.

AGROSTIS

arundinacea 1) diffusa 2) HostHV. spica venti † tenacissima HV. varia Host HV. vulgaris

AIRA

13

aquatica cespitosa

AJUGA

genevensis

reptans

AJZOON

canariense H.VL. hispanicumH.VL

ALBUCA

major H. Cr.

ALCHEMILLA vulgaris

ALCINA

perfo-

¹⁾ Calamagrostis sylvatica Primit. Flor. Galiciæ Aust. P. I. p. 70. 2) A alba var. B.

(a managihana) perfoliata 1) H.Cr., + sphærocephalum

ALETRIS

fragrans H.S.

ALISMA .

plantago ALLIUM

angulosum

* capense H. PK.

cepa' G.

* cernuum Rotch. H. G.

fistulosum H.V.L.

moly II. Cr.

oleraceum. porrum G.

f ramosum H. Cr.

T rubens H. VL. sativum G.

schoenoprasum G.

senescens

H. V. T strictum H. G.

ALNUS

glutinosa

ALOE

atrovirens B.

carinata B.

fruticosa 2) B.

humilis B.

linguæformis H.

PK.

disticha B.

margaritifera B. T mitræformis B.

picta H. VL. retusa H. PK.

spiralis G.

variegata G.

viscosa H. PK.

vul-

⁾ Wedelia perfoliata Willd. 2) A. arbore-'cens Miller.

vulgaris H, Cr; bicolor G. ALOPECURUS blitum caudatus 3 agrestis H. V. geniculatus cruentus ' ALOYSIA græcizans & citriodora 1) G, T hybridus + lætus H. Cr ALSINE 2) media + lividus ALSTROEMERIA Tpaniculatus? ligtu B. spinosus srictus & ALTHÆA * ficifolia 3) H.V. tricolor AMARYLLIS hirsuta * pallida 3)H.V.etG. † angustifolia H.PK. rosea G, aurea H.PK. ALYSSUM ciliaris H. PK. calycinum curvifolia H. Cr. incanum formosissimall.PK longifolia H. PK. maritimum H. lutea H. Cr. montanum AMARANTHUS undulata H. PK. variabilis H. PK. vita-2) Verbena triphylla Willd 2) Stellaria me-

dia Smith (3) Alceæ Lin.

ANAGALLIS vittata H. Cr. arvensis. AMBROSIA peruviana H. PK. Monelli H, VL ANCHUSA AMETHYSTEA officinalis (Y) 14. corymbosa 1) H.G sempervirens H, Cr, AMMI INDROMEDA majus H. V. polifolia H, PK, AMOMUM ANDRYALA zingiber G. nigricans H, VL. zefumbet H. PK. sinuata (4) H, V, AMORPHA ANEMONE fruticosa H, PK, T agyptiaca H.PK. AMYGDALUS hepatic a communis H, S, narcissiflora nana nemorosa persica HPK putens mana pumila H, PK. ANACYCLUS ranunculoides bicolor (2) H. G. sylvestris

grave-

ANETHUM.

clavatus (3) H,G,

⁽¹⁾ A. cærulen Linn (2) Anthemis Valentina Wild. (3) A. clavata Willd.Rothia cheiranthifolia Willd.

graveolens G, segetum H, Y, ANGELICA archangelica sylvestris ANTHEMIS altissima H. G. arabica H, V, arvensis austriaca H, V, T chamomilla H, Cr cotula mixta H, VL, nobilis H.V.B. rigescens Willd H.G. tinctoria ANTHERICUM annuum H, VI., frutescens H, Pk, ANTHOXANTHUM

odoratum

ANTHYLLIS barba Jovis B. vulneraria. ANTIRRHINUM bipartitum H, P. cirrhosum H, V, genise ifolium By linaria (2) minus purpureum B, triphyllum G. APARGIA autumnalis dubia H. VIA hastilis hispida APIUM graveolens G. petroselinum G AQUILEGIA vulgaris ARABIS

R 2

arenosa pendula H, V. thaliana f turrita ARBUTUS unedo B, ARCTIUM majus Ehrh. ARCTOTIS + rosea H.PK. superba (1 H, Cr, ARENARIA heteromalla rubra serpyllifolia trinervia ARISTOLOCHIA clematitis H, VL, rotunda H, PK,

serpervirens B, + sypho H, PK, ARMENIACA communis (2 H, Pk ARNOPOGON picroides H, V. ARTEMISIA abrotanum G, absinthium argentea B, † autriaca + biennis H,G, campestris dracunculus G, panigulata H, VL, pontica H, Cr, pulgaris. ABUM divaricatum B,

dracun-

Dresdensibus. Distincta ab A. superba specierum plantarum. (2 Prunus armeniaca L. I dracunculus H.pk. maculatum ARUNDO donax at var fol. H,PK. phragmites ASARUM eur opæiimi ASCLEPIAS curassavica G. I fruticosa V, incarnata H, Cr, I nivea H, Cr, syriaca H, V ASPARAGUS officinalis ASPERUGO procumbens ASPERULA aparine Biebest, arvensis G. cynanchica

odoruta tinctoria SPHODELUS albus G. fistulosus H, PK. luteus H, PK, ASTER amellus chinensis ericoides H, Cr. mutabilis H, S. novæ Angliæ H, PK. novæ Belgiæ H. PK: Tradescanti H. Cr. ASTRAGALUS alopecuroides H;G baeticus H, V. cicer exscapus H, Cr. galegiformis B, glycyphyllos

hamo

hamosus H. onobrychis sesameus H, C, tragacantha Bandla virescens H, Cr ASTRANTIA major ATHAMANTA T condensata H, V, libanotis ATHANASIA. annua H, VL parviflora B, ATRAGENE balearica (1 H, Cr, cirrhosa (2 H, Cr, florida (3 B, ATRAPHAXIS

undulata.H, PK ATRIPLEX hortensis on Allah littoralis G, etH.G. patula (4) ATROPA arborescens H, PK, belladonna H, V, T frutescens II, PK, AUCUBA, TORA japonica B. AVENA T fruitcose brevis Sch, clatior, The T nuda . podolica. præcox pubescens

(1) Clematis calycina Aiton (2 Clematis cirrhosa Linne (3) Clematis florida Thunberg (4) Eadem, quæ in Galicia austriaca crescit Vide Primit. Flor. Galic. P,I p 195,

Gativa strigosa

AXYRIS

amaganthoides H, VI

AYENIA

pusilla H, VI,

AZALEA

pontica:

BACCHARIS

halimisolia H, PK, ivæfolia H, Cr,

BALLOTA

nigra

BALSAMITA

suaveolens 1) G,

BLITUM

cheropodioides

Lam

virgatum

BAMBOS

arundinacea B. BARLERIA B.

+ coccinea G, BASELLA

cordifolia B,

rubra H. Cr. BEGONIA

dichotoma H, PK,

BELLIS

perennis

BERBERIS

vulgaris

BERCKHEYA incana 2)

BESLERIA

serrulata H. PK.

BETA

I maritima H, VI

vulgaris G, BETONICA

† grandiflora

¹⁾ B vulgaris Willd: 2) Gorteria astero1des Linne

officinalis BETULA alba pubescens BIDENS cernua Joucantha H, V.et G macrosperma H, G, BRIZA tripartita BIGNONIA capreolata B, catalpa H, PK, radicans B, BISCUTELLA apula H, V, BOERHAAVIA diffusa H. VL BORAGO officinalis B, BOSEA Yerva mora B.

BRASSICA

campestris chinensis G, napobrassica napus oleracea orientalis rapa G, maxima H, V. media minor H, V. BROMELIA ananas B, et var inermis G, BROMUS arvensis distachyos H, G, inermis lanceolatus H, V, maximus H, Cr, mollis poaformis H, V,

seca.

occalinus

BRUGMANSIA

suaveolens 1)

BRYONIA

africana H, Cr,

alba

dioica H, V,

BUDDLEIA

globosa B. salviæfolia B,

BUNIAS

erucago H, VL, orientalis

BUPHTHAMUM

cordifolium grandiflorum salicifolium H,G.

BUPLEURUM

falcatum

quin,

rotundifolium

1) Datura suaveolens Willd. D. arborea Hortu lanorum (2 C, laciniata Ja-

BUXUS

sempervirens

et var: fol varieg B.

CACALIA

articulata 2) HPK repens H, S,

sonchifolia H. VL,

CACTUS

coccinellifer H.PK. curassavicus B,

cylindricus G,

Ficus indica B.

flagelliformis H, S.

grandiflorus G,

mamillaris H, PK,

opuntia H, S,

pereskia B,

peruvianus H, PK,

spinosissimus G

tetragonus B,

friana

triangularis H, S; CALADIUM 1) auritum H, PK, Isagittæfolium H,Pk CALANCHOE verea.2) B, CALDASIA heterophylla Humboldt H, G, CALENDULA arvensis . officinalis G, pluvialis H, VL, stellata H, VL, CALLA, Simugo æthiopica H,S, CALTHA palustnis CALYCANTHUS

floridus By CALYMENIA viscosa (3) H, VL bicolor B, CAMELINA 4) dentata H, V.L, sativa. CAMPANULA bononiensis cervicaria glomerata grandiflora H, G, lilifolia. f lingulata H, V, medium H, V, patula persicifolia ct. var. flor albis plenis G. pyramidalis B, rapunculoides 1:08to-

(1) Arum Linne (2) Verea crenata aiton (3) Oxypaphus viscosus l' Herit (4) Myagrum Linnei quality p

rotundifolia sibirica * speculum trachelium CANNA glauca indica. et var: flor. flavo variegat (1 H.S. CANNABIS sativa CANTUA * fetida * pyriformisH, CAPPARIS spinosa H. PI

CAPRARIA biflora H. VI. CAPSICUM annuum G. baccatum H. Cr. conicum H. G. frutescens H. Cr. grossum G. luteum H. V. torulosum G. CARDAMINE impatiens CARDIOSPERMUM halicacabum G. CARDUUS acanthoides afer

(1 Speccis omnino distincta Folia oblongo — lanceolata; corollæ laciniis interioribus tribus erecto-resupinatis, obovato — lanceolatis, miniatis, subæqualibus; lacinia revoluta flava, lineolis rubris picta Nomen triviale petendum ex descriptione Horti berolinensis cl. Willa.

afer (i G. arvensis' crispus

erisithales lanceolatus marianus G

mollis

* monspessulanus nutans

> oler deeus palustris

pannonicus

pycnocephalus HG.

setosus syriacus H.I

CAREX digitata

fluva

hirta

* multiflora Mu.

hlenb H.G.

G. Ma

muricata pallescens pilosa

pseudocyperus CARICA

papava

simplex

vulgaris

CARPESIUM * cernuum H. V.et, G

CARPINUS

betulus

CARTHAMUS lunatus H. VL

tinctorius G.

CARUM carvi

⁽¹ Asterisco unico signati Cnici sunt ex Willd. duobus vero notati sub Serratulis militarunt. (2 C. aggregata Willd.

corymbosa G. marilandica H.PK. CELTIS occidentalis H. PK tomentosa B. CASTANEA vesca G. CATANANCHE cærulea G. CAUCALIS anthriscus infesta 1) H.V. leptophylla H. V nodosa H. V. CELOSIA argentea cristata H. VL. virgata H. Cr. CELSIA

arcturus B. elata H. P. et G.

T lanata H. P.

orientalis H. V.

occidentalis H. BK CENCHRUS

echinatus H. V.

CENTAUREA aspera H. V. axllaris Willd.

benedicta G. coriacea

cyanus diluta (2) H. VL. ferox H. VL.

jacea

Lippii H. Cr. macrophylla H. P. melitensis H. V. moschata H. V.

muricata H G.

nigricans

* orientalis H. V.

panicu-

(1 Scandix infesta Jacquin (2 Gelon Willd.

paniculata phrygia

pullata H. V ragusina B. ruthenica Lam:

H.G.

* sempervirens II. G. sicula H. VL. sonchifolia H. V:

tenuiflora H. G.

CEPHALANTHUS occidentulis B:

CERASTUM

aquaticum arvense viscosum

vulgatum

CERATONIA siliqua B.

CERCIS

siliquastrum H.PK

CERINTHE

aspera H. V.Fa.

minor

CESTRUM

diurnum H. PK. laurifolium H.

PK. Ba parqui B.

salicifolium B. CHÆROPHYLUM

arometicum bulbosun sativum

syvestre

temulum CHEIRANTHUS

annuus G.

cheiri G.

fenestralis H. V

græcus G.

quadrangulus H.V: sinuatus H. V

tricusvidatus H.V.

CHELIDONIUM

Library Ledinia

(1 Scandix cerefolium Linne

Jaciniatum Willd

majus Amelia

CHELONE

barbata H. PK.

campanulata (1 E. CHENOPODIUM

album

ambrosioides G chrysomelanosper-

mum Balbis

ficifolium H. G.

foetidum schrad &

hybridum

polyspermum

CHIONATHUS

* virginiana H. PK CHLORIS

ciliata H. V.

petræa H. V. H. G. Fradiata G.

CHRYSANTHE-

MUM

carinatum H. VL.

coronarium

carymbosum

frutescens H. P.

fruticulosum 2)

H. Cr

inodorum

leucanthemum maritimum H. V.

miconis H. G.

parthenium H. Cr.

purpureum (3.B.

serotinum G:

CHRYSOCOMA

cernua H. Cr.

Il aladoless ... line

(1 Pentstemon secundum Willd. (2 Asterisco in signita ad genus Pyrethrum secundum Willd. spectant: 3) C. indicum Curtis, Anthemis artemi sicolia Wilds linosyris

CHRYSOSPLENIUm palustris

alternifolium

CHRYSURUS

aureus (1 H. V.

CICER

arietinum HG.PK

CICHORIUM

* divaricatum H. P.

endivia.

intybus pumilum H. V.

CICUTA

* maculata H. V.

virosa

CIMICIFUGA

foetida

CINERARIA

aurantiaca

maritima H. PK. erecta

CIRCÆA

lutætiana

CISTUS

albidus B.

halicababum H.

PK.

* hirsutus H. G.

incanus H. Cr.

ladaniferus H.PK.

ledon G.

vaginatus G.

CITHAREXYLON quadrangulare B.

CITRUS

aurantium C. O.

medica C. O.

amelloides H.S.B.CLAYTONIA

perfoliata H. V.

campestris CLEMATIS

integri-

(1 Cynosurus aureus Walld.

integrifolia H.VL lacrima H G. glauca BAATAOO COLCHICUMUM autumhale H. Cr. r orientalis B. COTUTEADVICO Twittella B. OREOME DATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN NAME arborescens HIPK. frutescens H. PK. arabica H.Cr. et G. icosandra H. V herbacea 1) H. Cr. orientalis By spinosa H.Cr. et G violacea H. V. COMARUM palustre SY 1003 CLINOPODIUM vulgare min GOMMELINA CLITORIA (0.10) africana H. PK. communis G. ternatea H. Cr. tuberosa (Q. 10 CEUYTTA TOOS virginica HiPK. pulchella di H.PK CONTUMPOUPHIE CNEORUM tricoccon B.H.G. * croaticum H. V. maculatum 138 COCHLEARIA armoracea In S CONVALTARIA COFFEA some t . V bifolian worms arabica Bodind japonica 1) B. majalis VAISOD COIX shrigh schmeer irene if . Tillimzelbi-1)Lessertia-Decand-2)Eluggea japonica.Rich

integrifolia H. V 22 lacerima if C. CORIARIA multiflore myrtifolia G. polygonatum CONVOLVULUS CORISPERMUM arvensis squarrosum, Linn. cneorum H. PK. H.G. CORNUS farinosus H. G. alba H. PK. sepium, mascula tricolor H. PK. CONYZA sanguinea * sericea H. P.K. saxatilis H. Cr. CORONILLA thapsoides H. G. CORCHORUS emerus B. securidaca H. PK. Tolitorius G. trilocularis H.G.V valentina H. G. siliquosus H. Cr. varia (1) HOMYO CORDIA CORREADDODITE † sebestena G. alba B. THOCO COREOPSIS CORYDALIS 1) auriculata H. V. * aurea H. VE. tripteris H. PK. bulbosa CORIANDRUM digitata Zio sativum G. sempervirens H.VL.

¹⁾ Fumariæ Willd. Sp.pl.

CORYLUS apellana T colurna COTYLEDON orbiculata H. PK spuria H. Cr. COTULA stricta H. PK. CRAMBE hispanica H. VL. CRASSULA. coccinea H. PK. imbricata G. lactea H. PK. marginalis H. Cr. perfoliata B. perforata B. Portulacea H. PK. spatulata H. PK. tetragona G. CRATEGUS 1) A arbutifolia B.

r coccinea B cordata H. PK. t crus galli B dulcis B. monogyna et var flori rubris B. oxyacantha B. pyracantha H. Cr. CREPIS agrestis H. V. aspera H. V. biennis AMMOUS Dioscoridis H.G. fætida hispida H. V. nemausensis H.P. rubra G. tectorum. CRINUM

CRINUM erubescens H.PK.B CRITHMUM

maritimum H. Cr.

¹⁾ Mespili secundum Cel. Smithium.

CROCUS CUPRESSUS vernus H. PK. distichà G. sempervirens Pr CROTATARIA Radz. B. incana H.V. et G CRUCIANEDA CURCUMA longa H. PK. angustifolia ? CYCAS latifolia mucronata SH.V revoluta H. PK patula H.V. 180 CYCLAMEN CRYPSIS allegge europæum B. schöenoides H.VL persicum H. PK. CUCUBALJUS CYDONIA DY baccifer 100201(1 vulgaris or ami behen 1) Mittal CYMBIDIUM catholicus H. V. aloifolium H. PK.B. verecundum H.PK B CUCUMIS USTUDA melo Go sadura CYMINUM sativus G. * cuminum H. Cr. CUCURBITA CYNANCHUM Citrullus G. nigrum H. V. pepa G. Littan vincetoxicum 3) All Remainistrate I erloliticyr) Pyrus Cydonia Willd: 2) Asclepiade Willd. 3) Silene inflata Smith.

350		
CYNARA sisuomilo	laburnum H.PK.B.	
scolymus Bailles	mantanus Garant	
CYNOGLOSSUM	nigrieans MHT 1340	
* canescens H.G.	sessilifolius inch	
officinale Many	supinus abalesses .	
omphalodes G. III	elatum H.PKI	
scorpioides lineal	DACTIVLIS mental &	
CYNOSURUS TIDI	nlomerata inquis	
retroflexus i)	DALEA metalospriu	
CYPERUS	lagopus H.V. Mad	
alternifolius H.	DAPHNE and idlid	
PK. etG. B.	cneorum anning	
flauescens and the	merercum IAWAI	
monandrus H. Pl	odona 2) G. 100000	
strigosusH.V.etVI	DATURAUHTMAK	
CYPRIPEDIUM	lævis H. Voet VL	
calceolus United	metel H.W. et VL.	
CYTISUS ATTESUNE	stramonium	
cajan G. sysoliq	Takha H. Vilet WD.	
AND REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND		

i) Dactilis secundamb Wildehovir Hort?
berol. 2200 Cylvegetus Willdlei Lihing

capitatus

sarota amanas muricatus H.V. DELPHINIUM

Ajacis G. consolada

elatum H. PK.

intermedium H.G. staphisagria H. G.

urceolatum H. G.

DENTARIA

bulbifera glandulosa

DIANELLA

nemorosa 1) DIANTHUS

armeria barbatus G.

carthusianorum

caryophyllus H.PK.

chinensis G. collinues armylose

deltoides plumarius superbus

DIERVILLA domo.

humilis 2

DIGITALIS 120 / YO lanáta H. Cr.

ochroleuca 3)

purpurea H.PK.B.

DIGITARIA. 4) ciliaris H. V.

sanguinalis ...

DIOSPYROS

† lotus G.

)IPSACUS

sylvestris. pilosus in miles

DOLI-

1) Dracæna ensifolia Willd. 2) Lonicera Diervilla Willd. 3) Dambigua Willd.

) Syntherisma secundum Michaux. Paicis adnumeravit Linn.

2!	7.0
DOLICHOS	* sphærocephalus G.
* lignosus H. V.	RCHIIM
* purpurcus H. Cr.	candicans B.
rufus? H. V.	rubrum Hageren
* sesquipedalis H.Cr	vulgare mandate
Asoia, G	ECLIPTA
DRABA	erecta. H Cr.
perna politopalana	ELÆAGNUS
DRCOCEPHALUM	angustifolius H.
austriaçum	PK. et G.
canescens H. V.	ELSHOLTZIA
moldavica G.	cristata H. V., et
nutans H. PK.	Typerbaces 11 G. ct
peltatum B.	ELEUSINE
* percgrinum H.Cr.	domingensis H.V.
Ruyschiana	ELYMUS
sibiricum H. PK	. * caput medusæ H.
DRIMIA	VL.
alata H. PK.	EPIDENDRUM
DURANTA	species B.
Ellisia H. PK.	EPILOBIUM
Plumieri H. PK.	angustifolium
ECHINOPS	hirsutum
Samenary a	mon.

10.00

Daulandan 38 DOLICHOS acre çanadense lacensii pubescens Villosum"HCW EPIMEDIUM Boglas RODIUM Sailur r chium Hinges k alpinum B, EFIPACTIS * ciconium H. V. nidus avis cicutarium ARA ACE malacoides H.VI. ovata ERVUMHTTDOOMG ERANTHEMUM Frichellun B. hirsutuin "Tanka Tens 2 suprement flexuosa H PK. ERYNGIUMblom planun, enslon Ther bacea H. G. et ERISIMUM Jallag alliaria Taprae mediterranea H. barbarea PK, et B multiflora H. PK * longisiliqua H.V odoratum MARIA species G. parviflorum 3) præcox H. V. * tetralix H. G. ERIGERON ERYTHRÆA All II imm cenvulgaris Salisbury. 2) Cicer eins Willd. 3) E.cheiranthoides Willd.

centaurium i) piscatoria H. V. EUCOMIS DOMES platyphylla Punctala H. PK? prunifolia H.V. G. segetalis H. VL. regin H.PK. et S villoste de allament EPATORIUM EUPHRASIAloinu cannabinum adoutites Alil Wa ageratoides H. Cr officinally surer EUPHORBIA EVONYMUS EUDIA angulata Masiga Europauslangund Berruegsa caput medusæ H. SAMANTRUS carica HE PL cyparyssids mais FACUS .H imbar sylnatical subse helioscopia 1 FERRARAMATATA lathrris G. Oho T undudata H. BK Internta HICVIIA FESTUCA neriifolia "HalPK. calverha H. G. paralias BOSJAO divaricata H. W. pilosa mumbol elation A. Thin flu-1) Chironia centaurium Willd! Centiana entaurium Lian (& Allen arrent aufen

excelsion fluitans in gigantea 1) pendula H. PK. glauca FRIEILLARIA gracilis 1) imperialis H.PK.B tenella H. G. FUCHSIA unioloides H. G. coccinea H PK. B. FUMARIA FICARIA capreolata H. G. verna 2) officinalis 1113 FICUS COMPANY spicata spicata benghalensis H. PK. B. eappit mediased in GALANTHUS carica H. PK. nivalis: indica H. PK. GALEGA scabra B. * alba G. FRAGARIA Childensis G. officinalis B. GALEOBDOLON collina eflagellis G. luteum 5) GALEOPSIS vesca FRAXINUS ladanum nube-1) Brom. secundum Willd. 2) Ranunculus ficaria Willd. 3) Leonurus galeobdos lon Willd. Galeopsis galeobdolon Linn.

An	
pubescens i)	* Movida B.
versicolor 2)	† Mussenda H.PK.
ALINSOGA	GAURA Sementa
parviflora H.V.	t biennis H. Cr.
ALMM	† mutabilis H. Cr.
aparine	GENISTA
Bocconi H. V.	f canariensis B H
glaucum 5)	men newstra Cr.
humifurum Bie-	candidans H P
berst H. Cr	† sibirica H. VL.
A infestum mount	tinetoria
	GENTIANA
parisiense H. V.	cruciata
f rubrum H. V.	GEORGINA
spurium H. Cr.	coccinea H. Cr.
	GERANIUM
verum alettiman	anemonæfolium B

Vide primit Flor. galie, P. II. p. 27. 2)G. cannabina Willd. 5) Asperula galioides Bieberst. 4) Distinctum a G. sylvatico galiciensi et, in fallor, verum G. sylvaticum Linnet.

galiciensis 2) nobis carolinjanum H.V. plicatus II Cp. tristis H. Cr. () phaun in it GLAUCIUM 3) pratente munici luteum II. S. musibly million corniculatum, robertianum - 1 sanguingum violaceum G. I. GLECOM A sylvaticum - hederacea dienuit um orpsum ii. GEVM H ShridE H MEDITSCHIA triacantha H. PK. + album Hat Gas rivale & ALITAAN SLOBBA og alling urbanum + hutans H. PK. B. virginianum H. W. GLORIOSA 41) - + superba G. 1990 GLADIOLLISimon amabilis H. PK. T. GLOXINIA a communis H. Cr. maculata B. cardinalis HARK.GLYCINEIMEQRAD crocatus 1) H.PK. apios H. PK.

r) txis grocea Willds 2), Vide Primit Flor, galic. P. I. p. 51, 3) Chelidonia Willdenovis Spec. plant. 4) Methonica Jussien.

GRONOVIA caribea H. V. frutescens H. PK scandens G. phascoloides G. GYMNOSTYLES GLYCYRRITIZA anthemifolia H. P. T glabra B. GYPSO'PHILA glanduifera H.1Cr. archaria GNAPHALIUM fastigiate arenarium muralis dioicum panicillata I foetidum H. S. viscosa H. orientale G. HEMANTHUS rectum T. coccineus H. PK. COMPHEENA decumbens Jacq. HATORACIS cercodia H. PK. HEDERA GORTERTA rigens H PK. et GOSS PHUM Tabissynicum G, herbaceum H. Cr. Canadense B. Peruvianum H.P.F i * carpaticum H.V. religiosum H. PR. Coronarium Manufacture musting blood flexu-

flexuosum G. HELIOPSIS lævis A) G. gangeticum maculatum G. HELIOTROPIUMonobrychis indicum H. V. P. vespertilio H. G. parvislorum H. Cr. HELENIUM peruvianum H.PK quadridentatum 1) HELLEBORUS HELIANTHEMUM niger H. PK. ledifolium H. V. HEMEROCALLIS cærulea H.PK et S. salicifolium H. V pulgare 2) flava H. PK. et S. HELIANTHUS fulva annuus G. et var, HEMIMERIS urticæfolia B. H.G. flosculis omnibus HERACLEUM sentiflosculosis. T flavesdens gigantens, H. S. HERMANNIA multiflorits G. tuberosus I angularis H. Cr. HELICHRYSUM T candicans W. chrysanthum 3) denudata B H G. micans B. pli-1) Rudbeckia alata Linn. 2) Cisti Linn. 3) Xeranthemum bracteatum Fenten. 4) Buphthalmum helianthoides Willd.

plicata H. Cr. HERNIARIA

glabra

HESPERIS

Tafricana H. Cr.

T inodora H. Cr.

matronalis H. PK

Truncinata H. Cr. tristis G. H. Cr.

HIBISCUS

Habelmoschus B.

manihot H. Cr. G mutabilis B.

palustris H. PK.

rosa sinensis H.PK

et S. B.

speciosus H.S. syriacus H. S.

trionum G.

+ vesicarius H. Cr. lunatus

HIERACIUM

aurantiacum G.

auricula bauhini 1) Schult. collinum r) ngbis

THE STATE OF LEGISLANDING

cymosum dubium

echioides

lævigatum H. V. pilosella

præmorsum

A saxatile H. G.

Tasylvaticum umbellatum

villosum H. V. HIPPOCREPIS

multisiliqua H. Cr

HIPPOPHAE rhamnoides H.PK.

LOSTEUM umbellatum

HOR.

1) Vide Primi. Flor. galic. P. IL p. 149.148.

HORDEUM orientalis G. pattens Bieberst. distichun racemosus H. Cr. HYOSCIAMUS aureus II. Vol. niger murinum Scopolia soni T vulgare YOSERIS alenaria H. Cr. cretica H. Cr. HYPERICUM androsaeintim B. T calyerhum B. canariense B HORTEN dubium * elegans hircinum G. hirsutilm 199 laciniatum H.PK lividus 1) H,G. Muscari montanum perforation serotinus Linn.

* pyramidatum H.Cr amara H. PK. quadrangulare gibraltarica H.PK. HYPOCHAERIS semperflorens arachnoidea H.V H. PK. et S. maculata umbellata H.PK. radicata LEX HYSSOPUS aquifolium H. PK officinalis **JMPATIENS** † scrophulariæfolibalsamina G. us H. P. noli tangere JASIONE **JMPERATORIA** montana flavescens nobis 1) JASMINUM palustris nobis 1) azoricum B. **JNULA** fruticans B. * bifrons H. V. grandiflorum H. S. britannica humile B. crithmifolia H. Cr odoratissimum B. ensifolia officinale B. helenium sambac H. S. hirta **JBERIS** * oculus Christi H.G.

1) Vide Primit. Flor. Galic. P. I. p.213.

pulicaria
salicina
**T syaveolens H. G.etV.
JPOMAEA
coccinea H. Cr.

discolor H. G.
leucantha H. V.
pes tigridis H. V.
purpurea 1) H. G.

quamodit H. Cr.

* anglica H. PK.

fimbriata B. florentina A. S.

germanica H.S.

graminea

† halophila G.

A hispanica H. PK.

lutescens H. VI.

* ochroleuca H. VLJUNIPERUS

odoratissima Jac-

orientalis 2)H.PK. pseudacorus

quin G.

pseudacorus pumila ?

sambucina H'S.

† spuria H. Cr. susiana H. PK.

JSOPYRUM

thalictroides fumarioides H.VL,

JUGLANS

regia

JUNCUS

adscendens Host.

bulbosus campestris

conglomeratus

nemorosus Host.

nemorosus Host

pilosus

communis H. PK.

Sa-

1) Convolvulus purpureus Willd. 2) Mo-

sabina O. KOCHIA virginiana B. JUSTICIA adhatoda H. S. B. coccinea H. P.K.B. cristata 2) cristata H. PK., furcata H. S. et G. Tincompleta H.Cr. nasuta H S. quadrifida Vahl.H PK.S.et Cr JXIA II abilition chinensis 1) B. † fenestrata H. K. Trubro cyanea G. KAEMPFERIA galanga H, PK longa H. PK. KIGGELARIA africana B. KITAIBELIA vitifolia H. V.

eriophora Schrader

H. G. KOELERIA

KYLLINGA

* triceps H.V. et G.

LACHENALIA f lutea H. Cr.

LACTUCA

sativa G.

et var. crispa LAGERSTROEMIA

T indica G. LAGUNÆA

lobata H. Cr.

LAMIUM

album

maculatum

purpureum

¹⁾ Belemeanda chinensis Plant: lil:

²⁾ Poa cristata Willd

50 LANTANA aculeata H. S. involucrata H. V. tuberosus mixta et var. flor. albo-roseis H. S. salviæfolia H. PK. trifoliata H.Criet G LAPSANA communis † lyrata H. V. LASERPITIUM latifolium prutencum LATHRÆA squamaria LATHYRUS clymenum H. V. nissolia G. odoratus G. palustris var. syl- LEDUM vatica 1)

O enides 5. pratensis in the sylvestris : LAURUS nobilis H. PK. et S. B. LAVANDULA abrotanoides 2) G. dentata G. H. Cr. multifida H. S. 7

spica H. PK. LAVATERA africana H. PK. arborea B. cretica H, V.

micans G.

thuringiaca triloba G. H. trimestris H. Cr.

palustre

LEO.

¹⁾ Vide Primit: Flor: Galic: P II p 110

²⁾ L, elegans Hortulanorum

LEONTODON taraxacum LEONURUS cardiaca Terispus H. G. marrubiastrum 1) LEPIDIUM incisumi 2) H. VL latifolium G. ruderade satisquor G. spinosum II. VL. LEPTOSPERMUM + Finifohuma + parvifolium > B. T pubecans 5 LIGUSTICUM austriacum levisticum G:

† peregrinum H.V. LIGUSTRUM

vulgare H. S.

LILIUM bulbiferum H. PK

candidum H. S. chalcedonicum H.

martagon

LIMODORUM

† plicatum H. PK.

LINUM catharticum

flavum

* narbonense perenne H. P.

usitatissimum LIRIODENDRON

tulipifera H. PK. LITHOSERMUM arvense

LOBELIA

cardi

¹⁾ Chaiturus marrubiastrum Erhhart 2) I., Iberis Willd: H, berol.

cardinalis H. PK. creticus. B. Cliffortiana H. Cr. jacobeus H. PK. erinus B. svaveolens H. G. * fulgida G. tetragonolobus G. longiflora H. LUNARIA pubescens H. C. annua 2) H. PK. LOLIUM rediviva 3) LUPINUS percune temulentum albus angustifol- II, PK LONICERA caprilolium H.PK. hirsutus parviflora H. PK. luteus (1911) periclymemum H. natragensis 4) G. LYCHNIS quercifolium B. sempervirens B. coronata H. S. xylosteum LOPEZIA dioica (prateusis) racemosa 1) H. Cr. flos cuculi LOTUS sylvestris Wild. + arabicus H. Cr. flore pleno B. corniculatus viscaria LY-1) L, mexicana Willd: 2) L. biennis Gmel 5) perennis Gmel: 4) Perennans, cæspitosus

LYCIUM

alrum barbarum > H.PK boerhaa. viæfolium

LYCOPSIS arvensis

pulla LYCOPUS

europæus

LYSIMACHIA nummularia punctata

thyrsiflora pulgaris

LYTHRUM

salicaria MADIA

mellosa H. V.

MAGNOLIA

grandiflora H.PK. MALACHRA

capitata H. Cr.

MALAXIS

monophyllos MALVA

alcea

americana H. VL.

asperrima Jacquin.

capensis G. caroliniana G. crispa G. fragrans H. Cr. limensis H. VL. parviflora

peruviana H.V. et VI.

polystachya H. G. rotundifolia scoparia H. Cr.

spicata H. Cr,et G. sylvestris verticillata H. V.

MARANTA

arundinacea B.

MARRUBIUM intertexta H. VL. lcandidissimum H. Lupulina !!! nigra H. Cr. PK. crispum H. V. procumbens nobis 2) pseudodictamnus G tentaculata / terebellum > H.P · vulgare MARTYNIA tuberculata † proboscidea H. Cr. MELALEUCA MATRICARIA f armillaris H. S. B. MELAMPYRUM chamo nilla MAURANDIA arvenise semperflorens B. memorosum pulgatum MEDEOLA MELANANTHERA asparagoides 1) H. deltoidea 5) H.V. MELIA MEDICAGO aculeata Gærtner H azedarach H. S. et MOSEL SETTIVE. apiculata H. VL. MELIANTHUS major B. arborea B. H. S. Man H anolivon mi-W. Therefficition 1) Myrsiphyllum Willd, H, berol 2) Vide Primit Flor Galie P II p 127 lea aspera Willd.

LAND THE COLUMN	55
minor H. PK.	piperita G
MELICA	pulegium G.
cærulea	rotundifolia H.V.
nutans sylvestris	
MELILOTUS	viridis G.
cærulea G.	MENYANTHES
cretica H. P.	trifoliata
dentata H.V.	MERCURIALIS
indica H. P.	perennis
officinalis	MESEMBRY'AN-
MELISSA	THEMUN
fruticosa G.	cordifolium H. V
officinalis H. PK.	cristallinum H.Cr
MELITTIS	forfication H. PK
melissophylla	glaucum H. Cr e
MELOCHIA	PK
† corchorifolia H.Cr	linguæforme H.
MENISPERMUM	PK. B.
canadense H. PK	* pendulinum C.
MEN'THA	pinnatisidum H.
arvensis	PK.
austriaca	spectabile H. PK.
hirsuta Smith.	† stellatum H. PK.
£1018	V and griv and tube:

56

I tuberosum H. VL. uncinatum G. violaceum G.

glauca 5) H.S.et Cr. pudica G. virgata 4) H. Cr. et

MESPILUS

* axillaris 1) H. PK. MIRABILIS cotoneaster

germanica H. PK.

MESSERSCHMI -

fruticosa H. S. METROSIDEROS

lanceolata H.S. MICHAUXIA

lævigata H. PK. MILIUM

effusum

F multiflorum H. V MIMOSA

asperata G.

farnesiana 2) H.Cr. 7

hybrida. H. Cr.

jalapa G longiflora

MOLUCCELLA

lævis G MOMORDICA

balsamina G. elaterium G.

MONARDA clinopodia

didvma fistulosa

oblongata H. VI MORÆA

northiana H. PK

1) Cratægus parvifolia Willd: 2) Acacia Farnesiana Willd. 3) glauça Willd 4) Desmanthus virgatus Willd

7 - Trick proposition
T mucronata G.
A third to be committed in
N.ARCISSUS
* incomparabilis H.
Cr.
jonquilla H. PK.
F minor H. Cr.
T odoratus H. Cr.
poëtieus G.
pseudonarcissus G.
tazetta H. PK.
NEPETA
cataria
italica' G.
melissæfolia H. V.
* mussændi G.
nepetella H. V.
† nuda H. V.
violacea G.
NERIUM
odorum B.
olcander B.
NICANDRA MADE
phy-

physalodes 1) G. polystachion H.VL NICOTIANA tomentosum, H.Cr. OENANTTÆ glutinosa H.G.etV. paniculata H. G. fistulosa H. Cr. pimpinellæfolia H. Cr. rustica tabcum DENETHERA undulata biennis and the interest NIGELLA mollisgima H. V. arvensis muricata G. damascena rosea H. Cross orientalis sinuata Id. G. sativa G. suaveolens 1) H. G. NOLANA tetraptera G. prostrata G palmerris AHO OCYMUM europea, H. PK. * anisatuin H. V] ONONIS / DISTANT basilicum G. alopecuroides H.Cr. minimum H. Target Pin monachorum G. arpensis purchase *odoratissimum H.Cr Columnæ H. V. -odmanninis B.

¹⁾ Atropa physalodes Willd 2) 0, grandiflora Willd

* natrix H. Cr. odoratissima reclinata H. V sambucina rotundifolia H. Cr ustulata * viscosa H. V ORIGANUM ONOPORDUM majorana G. aganthium majoranoides G. arabicum H vulgare illiricum H V PRNITHOGALUM macrocanthum Scho caudatum H.PK,et ush H. G. S. B. tauricum H. VL. luteum OPHRYS minimum nutans H. Cr. monorchis ORNITHOPUS **ORCHIS** bifolia * scorpioides H. V. ORNUS coniopsea latifolia europea 1) G. OROBUS maculata mascula albus militaris Wald, lærigatus et Kit. morio

niger

ORON-

1) Fraximus ornus Willd

	10	
ORONTIUM	PAEONIA	
* majus 1) H. V.	corallina G	
ORYZA	* flava H PK	
sativa H. Cr.	officinalis H, S,	
OSTEOSPERMUM	tenuifolia H, PK,	
cæraleum H PK	PANAX	
OTHONNA	trifoliata HPK B	
* grandiflora B	PANCRATIUM	
* oppositifolia HPK	* caribacum H PK B	
OXALIS	* illyricum H PK B	
accetosella et var: fl.	* carolinianum H	
roseis	PK	
* caprina B.	PANICUM	
cernua G	crus galli	
incarnata G	glaucum	
livida H PK	* maritimum G	
* lutea H PK	miliaceum G	
versicolor B	viride	
* violacea H VL	PAPAVER	
OXYTROPIS	argemone	
* parviflora Decand:		
HG	rhoeas	
somni		
a) anterrhinum majvus Willd		
Manager of the Paris of the Par		

somniferum
PARIETARIA
cretica G
PARIS
quadrifolia
PARNASSIA
palustris
PASPALUM
stoloniferum H V
PASSERINA
filiformis H PK

* hirsuta B
PASSIFLORA
cerulea H. S
foetida G

* glauca H PK
heterophylla G
hirsuta H V.
holosericea H S

lunata H S * padata H Pl

* pedata H PK rubra H S serratifolia G suberosa H S

* vespertilio H PK
PASTINACA

sativa
PAVONIA
aristata H PK S et V
Columella H V
præmorsa B
spinifex B H V
zaylanica G

PELARGONIUM
acetosum H PK etS
alchemilloides H Cr
anceps B

asperum H V
australe H Cr
betulinum H PK
capitatum G
carnosum H PK

coriandrifoliumH.Cr cucullatum G denticulatum G

ec. 'na-

62

echinalum H PK et var: fol: varieg: G * tricuspidatum exstipulatum H S triste H S, fulgidum G HS gibbosum tomentosum B vitifolium H S hybridgm H.S inguinans H S B zonale - flor: coccineis H S longicaule G - incarnatis HS marginatum H S -- roseis H S odoratissimum H albis H Cr papilionaceum H.V PENNISETUM cenchroides 2) H V B peltatum H S et PK PENTAPETES * phoenicea H PK PERIPLOCA procumbens 1) H græca H PK PENCEDANUM radula B officinale xoseum H S tabulare H V alsaticum

ternatum H VL PHALARIS
tetragonum H S aquatica H V

cru-

liaris Willd

r) Pendancudi multiflori 2) Cenchris ci-

erucæformis 1) H P martinicensis H.Cr. Paradoxa H V nepetæfolia H. P. PHALANGIUM 2) tuberosa ramosum fruticosa H. V. PHASEOLUS PHLOX * maculata B. + capensis H P coccineus 3) paniculata H. PK. + pilosa B. vulgaris suaveolens H. PK. PHELLANDRIUM PHOENIX aquaticum dactylifera B. PHILADELPHUS PHYLSCA coronarius H. PK. ericoides H. S. B. * inodorus H. PK * rosmarinifolia H. PK. PHLEUM PHYLLANTHUS asperum H. V. phalaris 4) niruri H. P. et V pratense PHYLLIS PHLOMIS nobla H. V. PHYSALIS lesonurus B. 1) Beckmannia erucæformis Host. 2) Anthericum Linn. 3) Ph. multiflorus Willd. 4) Phalaris phleoides Willd.

alkekengi angulata H. VL. barbadensis H. V. I flexuosa H. Cr. T somnifera B. PHYTEUMA orbiculare PHYTOLACCA decandra icosandra octandra PICRIDIUM tingitanum 1) H.Cr PICRIS hieracioides PIMPINELLA dioica + dissecta H. V. magna nigra PINUS abies

64 alba G. balsamea H. Cr. canadensis H. Cr. larix B. H. RK. maritima H. PK. picea pinea B. sylvestris again PIPER + alatum blandum + clusiæfolium magnoliæsolium H PK et S. B. pellucidum H. VL. pereskiæfolium H. PK. et S. B.

pulchellum Vachl. H. PK.

sati-

¹⁾ Sanchus tingitanus Willd.

sativum + abyssinica H. Cr. PITCAIRNIA annua aireach bromeliæfolia B. aquatica latifolia B. compressa PLANTAGO eragrostis H. V. arenaria nemoralis peruviana H. V. coronopus H. Cr. indica H. Cr. r pilosa H. G. lanceolata pratensis Loellingii H. V rigida H. V. A lusitanica H Cr. trivialis PODALYRIA major media australis H. V. stricta H. Cr. POLEMONIUM PLATANUS eceruleum occidentalis B.H.PK POLLICHIA PLECTRANTHUS cumpestris H. V. POLYANTHES fruticosus B. tuberosa H. G. parvillorus Don-POLYGALA nersm G. PLUMBAGO Bulgaris rosea H.PK. et S.B.POLYGONUM POA bistorta.

aviculare fagopyrum hydropiper lapathifolium orientale G. persicaria POLYPODIUM

aureum Linn. H.

POLYPOGON monspeliensis H.V

POPULUS

balsamica H. PK

canadensis Schmid.

* candicans fastigiata 1) H.S. nigra H. PK. tremula

PORTEANDIA

+ grandiflora H.

P. dilatata Willd. 2) Vid. Prim,

Galie P. I. p. 330.

PORTULACARIA afra H. PK. B PORTULACCA

oleracea

POTENTILLA alba

> anserina argentea

canescens nobis 1) multifida H. V.

ohscura G.

opuca pensylvanica H. V.

recta

verna POTERUM

sanguisorba f spinosum H. Cr.

PRASIUM † majus H. Cr.

PRENANTHES

hieraciifolia H.V. mahaleb H. PK muralis padus PRIMULA spinosa auricula B PSIDIUM officinalis pyriferum B. elatior PSORALEA cortusoides H. Cr. bituminosa B. PROTEA glandulosa B. * obliqua B. odoratissima? H.V T saligna H. PK. palæstina H. Cr. PRUNELLA pinnata G. grandiflora pubescens H. PK. vulgaris tenuifolia H. V. PRUNUS verrucosa G. avium PTELEA trifoliata H. PK. cerasus PTERIS cham ecerusus * alternifolia H.PK. domestica PULMONARIA insitieia laurocerasus Pr.J. azurea nobis 1) H. PK. B. angustifolia Jusitanica B. officinalis PRU-

¹⁾ Vide Primit. Flor. Galic. P. I. p. 150.

68

PUNICA granatum B.H.PK. et S. PYCNANTHEMUM virginicum 1) H. PK. PYRUS baccata H. PK. communis malus spectabilis G. **OUERCUS** T palustris H. PK. pedunculata QUERIA robur canadensis 2) H. G RANUNCULUS acris asiaticus H. PK. auricomus

auricomus

bulbosus

cassubicus flammula

pammui lingua

nuricatus H. Cr. parviflorus H. Cr.

polyanthemos

repens

RAPHANUS

sativus

RESEDA alba H. P.

lutea H. P.

odorota G.

RHEUM

* compactum H.PK

et S.

palmatum H. PK. et S.

rhaponticum H.

PK. et S.

RHAMNUS

1) Thymus virginianus Willd. 2) A. nychia dichotoma Schrad.

alaternus H. PK. catharticus Clausii Willd. H. frangula (PK paliurus G. zizyphus G. RHINANTHUS crista galli 1) minor RHUS cotinus lucida B. pendulina G. radicans H. PK. r semialatum H.PK typhina H. PK. viminalis H. PK. RIBES

alpina H. PK. † diacantha B. 1) R. major Ehrh. 2) Sub nomine R

grossularia H. PK nigrum rubrum H. PK. uva crispa H. PK. CICINUS africanus H. G. et

Cr. communis G. inermis H.V. et P.

RIVINA brasiliensis H. PK

B.

canescens B. humilis? 2) H. V. octandra H. PK.

ROBINIA

caragana H.PK. etS halodendron H.PK hispida H. PK.

pseudacacia H. PK

spi-

purpurascentis ex horto Vindebonensi obtenta.

70	
3	ROTBOELLA
43.00	† incurvata H. P.
in a	BITRIIS
r.	cœsius
01	fruticosus
fo !	idaeus
PK.	var. fruct. flavis E
I. S.	PK.
PK.	odoratus H. PK. S
ATT	saxatilis
et S.	RUDBECKIA
VC.	altissima H. PK.
s ni-	
K.	* digitata H. PK.
В.	laciniata H. PK.
is 2)	
the 1	* salicifolia H. FK.

RUELLIA

clandestina G. lactea B.

patula H. PK.

punicea 1) II. schoenbrunensi gra H. I semperflorens solstitialis nob spinosissima tomentosa unica G.

apinosa B. ROSA alba H. S. bracteata H. C burgundica G a canina centifolia H.S. cinnamomea I T damascena H. gallica G. Jutea H. PK.

ROSMARINUS officinalis O.

notant RH.

1) R. bicolor Willd. 2) Vide Primit. Flor. Galic. P. I. p. 324.

RUMEX acetosa acetosella bucelophorus H.VI. crispus italicus H. PK. obtusifolius sanguineus H. Cr. spinosus H. V. RUSCUS aculeatus H. PK. R hypophyllum PK. B. racemosus B. RUTA graveolens G. halepensis G. SACCHARUM * argenteum H. P.

SAGINA procumbens SALIX

babylonica H. PK.
acutifolia
acuminata
capræa
fragilis
incumbacca
malifolia
pentandra
vitellina H. PK.

SALSOLA arenaria H. V. platyphylla 1) H.G et P.

tragus H. V.

SALVIA

ægyptiaca H. V.

æthiopica H. PK.

angustifolia B.

angustitolia E argentea H V.

au-

officinarum H. PK

† Ravennæ H. PK.

¹⁾ S. stellata Desfont.

SAMBUCUS aurea H. S. B. ceratophylla B. ebulus clandestina H. V. nigra et var. laciniata H. coccinea H. S. PK.S.etCr. formosa H.S. T glauca H. PK. racemosa H. PK glutinosa S. et Cr. horminum G. f viridis H. PK. illyrica H. P SANGUISORBA r media H. P. lanata H. G. mexicana H. S. officinalis T nubia H. P. SANICULA officinalis H. S. curopæa SANSEVIERA pendula Vahl. I pomifera H. P. guineensis G. pratensis zaylanica B. H.PK SANTOLINA pseudococcinea H. rugosa? G. chamæcyparissus runcinala H. V. H. PK B. Sclarea G. pinnata H.S. t viridis B. spinosa H. Cr. T tingitana H. V. SAPINDUS verticillata saponaria H. PK.

SAPO

SAPONARIA officinalis vaccaria G. SATUBEIA hortensis H. VL. SATYRIUM. viride 1) SAXIFRAGA geifolia B.

sarmentosa H.PK.SCIRPUS

tridactilites

SCABIOSA arvensis atropurpurea G. integrifolia H.V.

T lucida H. P. ocheoleuca pyrenaica H.Cr. sicula H. V. succisa

sylvatica H. V. syriaca H. Cr.

SCHOTIA

* mucronata H. PK. speciosa H. PK.

SCILLA

† italica H. PK.

campanulataH.PK. crassifolia H PK. peruviana H. PK. maritima H. PK.

et S. B. lacustris

SCIERANTHUS

annuus perennis

SCLEROCARPUS africanus H. Cr.

SCORZONERA

hispanica G. laciniata H. V.

rosea

SCROPHULARIA aq160-

¹⁾ Orchis viridis Willd.

aquatica SEDUM altaica Murr. H.P. acre glabrata Jacq. H. P. aizoon H. Cr. glandulosa Wuldst. hispanicum H. G. et hit. telephium nodosa SELINUM species H. P. carrifolia SCUTELLARIA cervaria 1) alhida H. P. orcoselinum 1) galericulata SEMPERRIVUM SECALE arachnoideum B. cereale æsti. arboreum H. S. B. hirtum vum hybernum SENECIO - archangelielegans fl. pleno G Jacobæa cum - montalbanemorensis Jacq. paludosus num - multicaule rupestris G. squalidus H. Cr. -norvegicum triflorus H. VL. _ S.Joannis __ tunetanum vernalis

pul-

1) Atlhamantæ Willd.

wallachicum

vulgaris SERAPIAS atrorubens Hoffm. ensifolia 1) grandiflora 2) latifolia 3) palustris 4) SERRATULA centaurioides H.V tinctoria SESELI annuum * montanum H.G.Cr * † petræum H. P., SESUVIUM

SEŜUVIUM portulacastrum.H.

SYCIOS

angulata

SIDA

abutilon H. Cr. G. et V.

angustifolia H.G. carpinifolia B.H.G. crenatiflora G. cristata H. Cr. hastata H. Cr. jatrophoides mauritiana G. rhombifolia H. P. Sonneratiana H. C. spinosa H. Cr. stellata H. P. triquetra G. umbellata G. vesicaria H. Cr. V et G.

T villosa H. P. T virgata H. V. SIDERITIS

ca-

¹⁾ Epipactis ensifolia Willd. 2) E. pallens Willd. 3) E. latifolia Willd. 4) E. pallustris Willd.

canariensis G. candicans? B. cretica G. hirsuta B. perfoliata H. Cr. romana H. Cr. SIEGESBECKIA flosculosa H. VL. orientalis H. P. SILENE armerid atocion 1) H.P. belien H. G. hellidifolia H. Cr. hipartita H. P. f bupleuroides H.P. chlorantha conica H. V. conoidea H. G. eretica H. P.

dichotoma H. G.

A disticha H. P. fe eranthema H. G. * flavescens H V. fruticosa? 2) G. hispida H. Cr. inaperta H. P. italica Schrad.H.G. longicaulis H. P.G. lusitanica H. P. noctiflora mutans otites paradoxa H. V: pendula H. V. picta H. P. quinque vulnera H stricta H. Cr. tatarica H. G. tricuspidata H. P.

undulata H. V.

¹⁾ S. orchidea Willd. 2) Flores rubri. folia margine ciliata.

T viscosa H. Cr. SILPHIUM perfoliatum G. ternatum H. VL. SINAPIS alba G. Allionii H. V. arvensis chinensis H. VL. integrifolia H. VL. * pubescens H. G. SISYMBRIUM erucastrum H. G. irio H. V. Loeselii pannonicum sophia supinum H. V. sylvestre . SISYRINCHIUM bermudiana H. S. * striatum H. PK. SMILAX

Trotundifolia H.PK. SMYRNIUM olusatrum H. P. SOLANDRA grandiflora H. S. SOLANUM aculeatissimum H. auriculatum H.PK. coccineum Jacq. H. corymbosum H.Cr. dulcamara grandiflorum H.P. hybridum G. igneum H. V. insanum H. Cr. judaicum. lanceolatum H. G.

et P.
lycopersicon G.
marginatum H. Cr.
melongena H VI.

ui-

palustris megrum novum ex insula It pinnatus H. P. Franciæ H P. tenerrimus pseudocapsicum B. SORBUS f americana B. radicans H. P. T reclinatum H. P. aria 1) B. sanctum H. V. aucuparia sodomæum G. hybrida H.PH. etS. tomentosum H.V.SORGHUM tuber sum. Ardini H. V. SOLDANELLA bicolor H. V. alpina B. halepense H. V. SOLIDAGO saccharatum H.V. vulgare G. canadensis H. SPARGANIUM lanceolata H. S. procera H. PK. ramosum SPARTIUM virgaurea, hispanicum H.PK. SONCHUS junceum B H. S. arvensis SPERGULA asper arvensis † divaricatus H. P.

SPIGELIA

1) Pyrus aria Willd.

oleraceus,

* marilandica H.PK. coccinea H. S. SPILANTHUS et PK. oleraceus H. VL.et germanica intermedia H. V. SPINACIA lanata H. PK. maritima H. V. oleracea G. SPIRÆA nepetæfolia H. P. palustris aruncus canadensis H. PK. recta chamedryfolia sylvatica crenata 1) H. S. STACHYTARPHE. filipendula opulifolia H.PK.et angustifolia 2) H.VL. SATEHELIMA salicifolia chamæpeuce H. V. H. PK. STAPELIA sorbifolia asterias H. V. ulmaria STACHYS caespitosa H. Cr. alpina H. P. hirsuta B. plataniflora H. V. annua circinata G. variegata H.S. STA-

¹⁾ Sp. pannonica Schmidt. 2) Verbena indica Willd.

See Handson 80 Handland	
STAPHYLEA	officinale
pinnata	tuberosum H. Cr.
STATICE	SYRYNGA
armeria B.	* grandiflora H. PK.
* cordata H. P.	persica H. PK.
* latifolia H.P.	et var. laciniata
monopetala B.	H. S.
speciosa H. Cr.	vulgaris
* totarica H.PK. et P	TAGETES
ETELLARIA	erecta G
graminea	* lucida H. P.
holostea	* papposa Michaux
S'TEVIA	Н, РК.
purpurea H. G.	patula G.
serrata H V.	TALINUM
STIPA	anacampseros H.
* juncea	PK.
- pennata	patens G.
STRELITZIA	TAMARIX
Reginte B.	gallica G.
SWERTIA	octandra H. PK.
perennis	TANACETUM
SYMPHYTUM	vulgare
	TA-

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	I and an	
TAXUS	flavum	
laccata B.	majus	
TELEPHIUM	minus	
Imperati H. P.	nigricans	
TETRAGONIA	THESIUM	
echinata II. P.	ebracteatum	
TEUCRIUM	linophyllum	
* campanulatum H P	THLASPI	
chamedrys	arvense	
flavum B. H. G.	bursa pastoris	
hyrcanicum G.H.V	campestre	
marum B.	THRINCIA	
* orientale H. P.	hirta H. V.	
polium H. P.	THUIA	
storodonia G	occidentalis H.PK	
supinum	orientalis B.	
THALIA	THYMBRA	
* dealbata H. PK.	spicata G.	
THALICTRUM	THYMUS	
angustifolium HV.	batavinus H. P.	
aquilegifolium	pannonicus 1) Al-	
* elatum Jacq. H.P.	lioni.	
	r. 4. Primit. Flor. Gas	
lic. P. II. p. 29.		
-		

serpyllum (exserens) volubilis H.VL. ct H. P. (villosum) [RACHELIUM cæruleum B. vulgaris H. PK. TRADESCANTIA discolor H. PK. B. TILIA americana H. PK. erecta H. Cr. virginica H. PK. europæa 1) parvifolia et var. flor. albis G. TRAGOPOGON TOFIELDIA * palustris TOLPIS pratensis barbata H. Cr. TRIBULUS terrestris H. V. TORDILIUM officinale H. P. TRIENTALIS TORMENTILLA europæa TRIFOLIUM erecta albidum H. V.

TOURNEFORTIA

* foctidissima H. V

* hirsuta H. S.

* mutabilis H. P.

arvense

alpestre

angustifolium H.P

¹⁾ T. platyphylla Scopoli. T. cordifolia Schmidt.

84 maline sara-. Vincivolla atuiti pergli Spelta italomac-Sch. caroni rum nigra repens Romanum Subcomaristatum positum turgidum - muticum TRIUMFETTA polonicum semitriloba H. Cr. sardinicum TROLLIUS siculum Sch. . canneeuropæus TROPÆOLUM zara v. Castigli, majus G. minus H. PK. one TULIPA v. Mischio Gesneriana G. - v. Oriana TURNERA - v. Rocella, osia racemosa H. Cr. ulmifolia G. Majo-TURRITIS ca: * alpina H. V. · scorsone, di som-

35 glabra vilis idaa hirsuta VALANTIA TUSSILAGO glabra VALERIANA farfara officinalis petasites H. TYPHA rubra B. rupestris 1) H.G. latifolia ULMUS vesicaria 1) H. Cr. VELTHEIMIA campestris suberosa uveria 1) H. PK. URENA viridifolia H. PK. et S. B. lobata G. VERATRUM URTICA æstuans H.V. album dioica nigrum VERBASCUM Dodartii * altaicum H. Cr. nivea H. S, B. lychnitis urens VACCINIUM nigrum arctostaphylos H. phlomoides PKI phæniceum m yrtillus species H. P.

1)Fedia Gartneri. 2)Tritoma uvaria Gawl

tha.

thapsus;

VERBENA

bracteosa

caroliniana H. P.

officinalis

paniculata H. P.

stricta H. P.

VERBESINA

alata H. Cr. gigantea H. PK.

VERONICA

agrestis

anagallis arvensis

beccabunga

chamadrys decussata H. PK.

dentata Schmidt.

Boh:

foliosa

latifolia

maritima

cristata Bern.

prostrata BURNUM

orchidea 1) Grant.

lantana opulus

tinus B.

VICIA

calcarata H. V.

cracca.

de Perpignan De-

cand. H. P.

dumetorum Michauxii H. V.

sativa

sepium sylvatica.

villosa

VINCA

major H. S.

mingr

rosea

et var. alba H. PK

VIO-

VIOLA ligustrina B. WATSONIA Canina hirta Meriana 1) H. PK lutea et S. WESTERINGIA mirabilis rosmarinacea 2) G montana odorata et flor.ples XANTHIUM strumarium nis. XERANTHEMUM tricolor VISCUM * purpureo-cæruleum alhum H. P. VITEX XIMENESIA encyoloides G. agnus castus G. VITIS XYLOPHYLLA hederacea Willd.B. * latifolia H. PK. * labrusca H. PK. * ramiflora H. PK. vinifera H. PK. YUCCA VOLCAMERIA aloifolia O. Japonica II. PK. et ZEA mais * inermis B. ZINNIA multi-1) Antholyza Meriana Linn. 2) Cunila fruticosa Willd.

multiflora H. V. revoluta H. P. verticillata H.VL. violacea 1) H. V.

ZYGOPHYLLIIM fabago H. P.

METHEWAX Literack to assemble 1) Z. elegans Willd.

· Cumlement

Andropagon schonanthy H. Ch Volic olopam valentum argemone mexico natt. Cr. Angerdium filix mas - Fragile Mariania Upler won outa muraria Orowallia demistra y Carnoportum Scaparia 9. Cary anthem . mairophyllett Ch Cynomics critatus Conerus esculentes & redumnus fourinella Greoranhalum enneriono Equisetim arvente Bx 45 Jylvaticum. Erysz mum officiale galum boreale - whisisosum themar is exacta Hilk. Lavatora other St. Et. & marchanter polymercha mulalenca hyperinifolia of mentha crispa I. Review o leans . H. plin H. C. Paymum thy outloown Hill

Crobinsornus La In flora incarnata 9 Chalary ariend nacea til Watanus ascritolia. 9 Brumbaro scandens H. Ch Loa Sicula HIV. Lo Grasniem du metorum Steris aquilina Chapietrum pani entation Randex nellen + Vida initica Ho + Volanum ciliare H. L Jachys vugore H. OK Veronica oficinalis - veryllitolia - - - Triphylla -- versa Vicia faba Works

SUPPLÉMENT

au

CATALOGUE

des Plantes

du

JARDIN BOTANIQUE

du Gymnase de Voltiynie

* & KRZEMIENIEC.

Permis d'imprimer. Krzemieniec le 3. Décembre 1812.

> Michel Sciborski Directeur du' Gymnuse de Volhynie, Censeur

Notre jardin, toutes défavorables que sont les circonstances, s'est cependant celte année beaucoup enrichi. La reconnaissance la mieux sentie, nous oblige de publier les noms des personnes auxquelles nous en sommes redevables, tant par leurs envois en pieds de plantes, que par reux en semences. En fait de plantes vives, nous en tenous plusieurs du jardin de Gorenki de S. E. Monsieur le Comte Razoumowski Ministre de l' Listraction publique de celui de Biatacerkiew de S. E. Madame la Comtesse Branicka, de celni de Poryck de S. E. Me. la Csse Czacka, de celui de Samostrzaty de M. Boreyko et des Universites de Charkoff et de Filna. M.M. les Ctes Karwicki et Michel Czacki out donné plusieurs arbres fruitiers. M. Grabowski a aussi rassemblé une quantité considérable de plantes et semences.

M.M. le Dr. Friedlænder. Miechowicz Professeur-adjoint près l'Institut des Méchaniciens (Mz) *) et Andrzeiowski continuent d'augmenter la collection des plantes du pays; et c'est principalement au zèle de ce dernier que nous devons une quantité assez nombreuse de plantes rares indigènes et plusieurs exotiques.

Quant aux envois de semences, nous en

sommes redevables a M. M. Bernhardi Dr. en Med. Prof. de Bot. à Erfourt (E), De la Vigne Dr. en Mid. Prof. d'Hist. natur. à Charkoff, Fischer Dr. en Med. Directeur da jardin à Gorenki, Kitaibel Dr. en Méd. Prof. de Bot. à Pest, Oesterreicher Dr. en Med. Prof. d'Hist. nat. à Cracopie, Rochel Chirurg. à Rownie au Comtat de Trentschin en Hongrie, Roemer Dr en Med. Prof. de Bot. à Zuric **) (Z), Schatt Intendant du jardin botan. a Vienne en Autriche, Schultes Dr. en Med. Prof, de la Thérap, spec, et d'Hist. nat. à Landshut en Bavière, Weinmann Intendant du jardin hotan. à Dorpat, et Willdenow Prof. de Bot. et d'Hist. nat. De ecteur du jardin Royal hot. à Berlin (Bn).

La collection des plantes seroit encore plus avancée, si j'avais pu profiter de la permission, qu'a daigné m'accorder S. E. le Ministre de l'Instruction publique d'aller à Gorenki, et si la guerre n'avait pas été un obstacle pour l'expédition de plusieurs envois de plantes qui nous avaient été promises.

En temoignant à nos bienfaiteurs nos sentimens de gratitude, nous les prions de vouloir bien nous continuer leurs bontés.

Wilibald Besser

Docteur en Medecine, Professeur d'Histoire Naturelle.

ACACIA 3635 glauca R. S. 3634 Lebbek R. ACALYPHA 3035 brachystachya W. 3643 cupatoria E.K. En. E. ACHILLEA 3637 ageratum Ch.E. 3646 pectinata Ch.D. 3638 (asplenifolia Ch. 3647 * pubescens E. (rosea H. Par. 3648 salicifolia No-3639 * bipinnata Cr.

3640 compacia D. 5641 decolorans W.En. Bn. 3642 decombens V. 3644 lutescens? Ch. 3636 rubra W. En. L. 3645 * magna grandiflora Ch. bis ***) Ch. 3649

*) Signe de l'abreviation, dont on a fait

usage dans le cours du sapplément.

***) Affinis valdopere A. ptarmicæ, sub com-

^{**)} Le paquet de semeuces de M. Roemer étant trop tard arrivé, je n'en ai fait semer cette année que très peu d'espères.

ACONITUM

3649 * anthora A. 3650 septentrionale A. Ch

365 i * tauricum D. AGERATUM

3652 * album R. 3653 * latifolium Cc.' 'AGRIMONIA

3654 * odorata Ch. Cr. 3655 * repeus Ch.

AGROSTEM MA
5656 coronaria fl. albe

AGROSTIS
5657 alba Cr.
5653 * decumbers L.
5659 * diandra Ch.
5660 linearis R.
5660 tenacissima D.

K. V.

ARRA

662 caryophyllea K. 663 * gl. uea Cr. 664 * pallens R. 665 * pen ylvanica D. 666 * seminuda K.

AJUGA

667 chamæpitys Cr. 668 * iva Cr.

AIZOON

obe hispanicum R. ALLIUM

ALLIUM

16-0 * baicalense Bn.

Ch.

5671 * carinatum Cr. L. 5672 cepa bulbo albo G. 5675 * descendens Bu. 5674 * fragrans K. V.

5675 * narcissifolium Cr.

3676

quo nomine quoque benigne nobiscum est communicata. Differt canescentia omnium partium, caule ramosissimo, ramis sterilibus corymbo altioribus, foliis mollibus lanceolatis, versus basin notabiliter altenuatis, magis dentato-serrulatis, nec serraturis imbricatis; floribusque minoribus.

36-6 * pallens Ch. 3677 * poniculatum A. 3078 rubenti affine Ch 3098 * cararia 3079 * scorodoprasum Bn. C.

3680 * sibiricum Ba Cr. 3701 flavus Ch. 5081 * spurium Ch. 3082 * triquetrum Ch. 5683 ursinum A.

ALNUS

3684 incana VI.

ALOE

3685 rigida Pk. ALOPECURUS

3686 pratensis Cn.

ALTH EA

3687 narbonensis L.V.

ALYSSUM

3688 alpestre Cr. 3689 campestre D.

3690 gemouense Ch.

5691 * minimum Cr.

3692 * murale K.

3693 utriculatum Bn.

AMARANTHUS 3694 alhus Bn.

5695 angustifolius Ch.

3696 bicolor E.

569: * caracan

5699 chlorostachys Bn. 5700 * esculentus L.

5702 gangetieus E.L. 3705 hecticus Bn.

3704 * incomptus Ch.

R

3 o5 * lætus Ch.

3706 lividus Ch.Cr.E.

5707 oleraceus Cra

5703 * retroflexus E.

5709 * rotundatus Ch.

AMBROSTA"

3710 # trifida Bn.

AMETHYSTEA.

(corymbosa Bn.

5711 (Ch.

(A. cærulea Linn.

AMMANNIA

5712 diffusa W.En. Ch.

ANARRHINUM 3713 * bellidifolium

ANCHUSA

(Barrelieri H. Par.

3914 (Mz.

(Myosotis obtusa:

3715 ochroleuca W.

Eu. *) Ch.

3716 rosea MB. Ch.

ANDROPOGON

3717 contortus D. 3718 * glaucus R.

5719 * strictus K. .

ANDRYALA 3720 cheiranthifolia V.

ANEMONE

3721 coronaria A.

ANTHEMIS

3722 * chamomillæ L.

VI.

3724 * fallax Ch.

3725 * fuscata Bn.

3726 " pubescens E.

3727 triloba K.

3728 Triumsetti Cr.G. 1745 graminitolia Bri

ANTHER CUM

E. R.

ANTHOXANTHUM

3730 * amarum R. ANTHYLLIS

3731 tetraphylla Cr.

ANTIRRHINUM

3732 siculum Ch.

AQUILEGIA

5755 * montana Ch.

3734 * viscosa RI.

ARABIS

3730 * alpina K.

3736 * conferta D.

3757 * hispida Cr.

3738 * i cana L.

3 39 * nutans Rl.

5710 * pendula R.

5725 coronopitelia Bn. 5741 * turrita Cr.

ARCTOTIS

3742 arborescens VI.

ARENARIA

3745 * halearing V.

3744 * fasciculata V.

3746 * macrocar, a R.

3729 pendalum W.Eo. 3747 * prostrata Cr L

^{*)} Variat etiam floribus, pallide cæruleis.

3748 (verna W. En. L. (cæspitosa ARMERIA 3749 * latifolia Ch. ARNOPOGON 3750 capensis *) Cr. ARTEMISIA 5751 * biennis Ch. V. 3752 dracunculus in odora Cha 3753 * inodora Ch. 5754 * monogyna K. 3705 neglecta W.En. Ch. 3-56 * nutans L. 3757 scoparia Ch. Cr. K. ARUNDO 3758 * effusa Ch. ASCLEPIAS 3759 * linearis R. 3760 * pulchra Cr. ASPARAGUS 3761 retrofractus Pk.

ASPERULA

3762 Tævigata D.R.Rl. ASTER 3763 æstivus Cr. 3764 dracunculus Lam. Cn.

5765 glutinosus R. ASTRAGALUS 5760 dasyanthus *) A. 3767 *epiglottis Ch. 3768 exscapus L. 5769 * isetensis Ch. . 3770 * lencophæus D. 5771 spec. e Daburia R. 5772 sulcatus Co.D.L.V.

3773 * tribuloides L. R. 3774 trimestris Ch.

3775 * vicescens K.

ATHAMANTA 3776 condensata? R. 3777. * rigida R.

ATHANASIA 3778 crithmifolia D. ATRIPLEX 3779 nitens Ch.

AVENA B

^{*)} Anne Specie ab A. picroide distincta? **) Caules procumbentes.

3780 fragilis Cr. E. 3781 * hirsuta E. 3782 neglecta E. 3785 sativa americana Ch.

3784 - anglica Ch. 3785 — georgiana Cr. 3756 — trisperma Ch. 3787 * sterilis Cr.

BASELLA 3788 * alba E. BELLIS 3789 perennis fl. pleno 300 glastifolia Ch. G.

BETA 3700 .cicla Cr. 3791 trigyna Cr. K. BETONICA 3792 * hirsuta L.

BIDENS

3795 " stricta L.

3794 bipinnata L. 5795 Irondosa Bu. (parviflora W.En.

5796 Cn. (macrosperma H. · Gor. *)

BISCUTELLA 5797 auriculata Cr. 5798 didyma W. En.L. R.V.

5799 raphanifolia K. BOLTONIA BRACHYSTEMUM 3801 lanceolatum W. En.Ba Pk.

BRASSICA 5802 * elongata K. 3805 erucastrum Ba 3801 cheiranthus k.Vl. 3805 lucida Nobis** G.

*) H.Gor. Dr. Fischer Catalogue du Jardin des plantes à Gorenki 1812.

^{**)} An Brassica oleraceae varietas? Biennis, capitata, foliis viridibus lucidis. Siliqua fe e bipollicaris, subtetraedra, tornfosa. dissepimenti rostro brevi, (2-3 linearum), crassiusculo. Ex Anglia.

BROMELIA 3806 karatas Vl. BROMUS

3807 agrestis Bn. 3 to 3 * angustifolius Ch 3809 * ecectus E. 3810 glaucus H.Gor.R. 5811 * murorum E. 3812 * pubescens R. 3513 tectorum Cr. L. 3814 * villosus Ch. I.

BUFONIA 3815 perenuis R. BUNIAS

3816 æzyptiana Bo. 3817 aspera Ch.

BVPHTHALMUM 37 18 *grandiflorum Cr 5319 maritimum Cr.

BUTOMUS

3820 umbellatus

CALENDULA 3821 acryptiaca Vl. 3542 hybrida Ch.

CAMELINA

3823 dentata Bn. Cr.

CAMPANULA

1824 *betonicæfolia Ch

25 * cernua Cn.

126 divergens E.

327 hybrida E.

328 * lact flora R.

3329 lilifolia stylosa R.

850 perfoliata K.

3331 ruthenica W. En.

D.

3832, rapunculoides var.

pallidior.

CAPSICUM

1855 annuum fructu luteo G.

3834 cerasiforme fr.

miniato G.

3855 pendulum fr. miniato G.

CARDUUS 3836 arabicos L.

3837 * candidans Gr.L.

3838 * collinus L.

5859 crassifolius L.

(Pollichu Nobis*)

3840(cyanoides Pollich.

^{*)} Nomen hocce jam alibi propositum. Nostra planta est omnino Cardaus a Gmeli-

(Fl. Palat. 3841 radiatus Ch. Bl. 4842 * squarrosus D. 3843 spec *) K. CARISSA (tispińosa VI. 3844 (Arduina bispinosa W. CASSIA 3845 arlorescens R. CATHANANCHE 3846 lutea K. CELASTRUS 3847 buxifolius .B. G, CELOSIA 3813 * paniculata K. CELSIA

3849 cretica Ch. Cr. 3800 * elata R. CENTAUREA

3852 * alha Ch. 3853 * altaica V.

3854 amara E. 5855 aspera? Ch. K. 5856 * calcitrapa Cr. 3857 calocephala? R. 5858 mollis Wetk.R. 5859 * neglecta V. 3800 * scabiosa Cr. 3861 seridis? Ch. G. Pk.

3862 solstitialis Cr. 3803 * sordida V. 3864 verulom Ch. Cr. CEPHALANTHUS

5865 occidentatis G. CERASTIUM 3866 * davoricom R. 3867 dichetomum Ch.

3868 * Holosteæ R. 3851 viscosa W. En.L. 3869 perfoliatum Cr. 3870 rotundifolium Ch.

· Cc. V.

3871 tomentosum Ch.

CERINTHE

3372

no Fl. Lib. II. p. 42. n. 36. descriptus et i cone (t. 15.) illustratus.

*) Affinis C. hamuloso, sed minor, square mis anthodii tantum patulis.

5872 * minor maculata 3889 barbata Ch. R. Ch. 3890 radiata? E. V. CESTRUM CHRI SANTHEMUM 3875 * vesperinum K, 3891 * Achillese L. CHAMEROPS 3892 arctionm R. 3874 humilis R. 3893 segetum. L. CHFIRANTHUS CHRYSURUS 3894 (au eus V. 3875 fruticulosus Cn. (Cynosurus Linn. D. Sp. K. 3876 * montanus B. D. CICHORIUM 3877 # pallens Ch. \$895 divaricatum Bn. 3878 *paniculatus Lam. Cr. CINERARIA CHELONE 3896 cordifolia R. L. 3897 longifolia Mz. 3879 for mosa G. 5898 * populifolia R. 3880 (pubescens V. (Pentstemon W. CISTUS CHENOPODIUM 3899 anglicus Cr. 5900 * fætidus Cr. 3881 graveolens Cr. 3882 * marginatum Ch. CLERODENDRUM 3883 murale Cr. 3901 viscosum VI. CNICUS. 3884 - var? carthaginense E. 5902 arachnoides R. 3885 Quinoa Cr. E. R. 5903 eriophorus D.L. 3886 rubrum 5904 * salignus D. 3887 * serotinum L, 905 * spinosissimus D. 3888 * urbicum E. COCHLEARIA CHLORIS 5906 * anglica D.

COLU.

1	2 _	
	5920	maritima K.
3	3921	tala ica V.

COLUTEA 3007 * media L. COMARUM

(fragarioides W. En. Ch.

3008 (Potentilla fraga-/ riastcum

Linn.

CONVOLVULUS 3000 althopoidos Al. 3910 clongatus E. L. 3911 farinosus E. CONYZA

3012 cinerea E. 5915 rupestris L. CORDIA

3014 tetrandra G. COREOPSIS

3019 * lanceolata Ch. CORDNILLA

3916 * cretica K. CORYDALIS

5017 lutea V. COTULA

3918 * aurea R.

3919 coronopifolia Ch CRAMBE

CREPIS 3922 ambigua Ch. L.

3923 aspera V.

4924 * Gmelini L.

3925 * hybrida Ch. (Fragaria sterilis 5926 pinnatifida Ch.

3927 * rigida E

3928 * taurinensis E L.

CROTON

3929 glandulosum Ch.

CRUCIANELLA

3930 angustifolia V. 3031 * inucronata E. V.

5032 latifolia V.

3933 patula Ch. V. CUCUBALUS

3931 * pilosus L.

5935 stellatus R.

CUCURBITA

930 tiarata Bernh. E. CUPRESSUS

5057 fastigiata G. R. CUSCUTA

1938 europæa -

CYCLAMEN

3939 hederæsolium' G

odoratissimum? 5940 (persicum, var. (flor. alois Mill.

CYNARA

2941 scolymus G.

C\ NOGLOSSUM

5942 * apenninum K.

5943 * bicolor D. L.

5944 canescens W. En

V

5945 * montanum L. / 3946 * virginicum D. / CY NOSURUS

5917 echihatus E. CYPERUS

3948 e culentus 3949 sphacelatus? R. 3950 * viscosus E.

CYSTICAPNOS.

(africana W.En. R. (Corydalis vesica 3951 (. /ria

(Fomaria Linn.

3952 alpinus Cr.

3953 * biflorus K. 3954 * capitatus Cr. K.

5955 * hirsutus K.

5956 purpureus §.

(odoratissimum? §. 3957 supinus uralensis

DATURA

3958 Metel Ch. V.

DAUCUS

3969 carota radice a-

tro-rubra R. 3960 * hispanicus I..

3961 * hispidus R.

5962 * polygamus L.

DELPHINIUM

5965 * americanum Cr. 5964 * exaltatum Cr.

3965 grandiflorum ,Ch.

3965 grandinorum Ch.

5966 * hybridum Cr.

3967 * maritimum L.

5968 * puniceum Ch.

DIANTHUS

5969 asper W. En. V. 5970 * bicolor MB.R.

5971 * campestris W.

En. Ch.

(collinus caucasi-(cus H.Gor.R.

5972 (caucasicus W.

En.

3973 — sibiricus R.

3974 rigidus W. En.L. 3990 rotund folia 3075 * sylvations L. 3976 " virgineus L. DIGITALIS

3977 (intermedia D. micrantha Sp. 3978 Alævigata L. 3979 obscura Ch. R. DOLICHO3

3980 Lablab var. Chi 308 i * luteus G. 3952 * madagascaricus

3983 puhescens Cr. 3934 * purpureus Ch. 3985 * tranquebarious Ch. Cr.

DRABA

3986 * hirta Bn. 3087 nemoralis A. DRACOCEPHALUM 9388 # altaiense R. DROSERA

3989 longifolia

ECHINOPS |

3991 ritro Cr. ELEUSINE

3992 filiformis E.

3993 virgata Cr.

ELYMUS

5994 expet medusæ V. 3995 glaucifolius W.

Ea. E.

3996*h rsutus K. 599 - striatus E. E.

EPILO31UM

5998 amplexicaule*)R. 3999 coloratum W.En.

tooo tetragonum A. EPIPACTIS

1001 (rubra W.

(Se apias rubra.

ERICA

4002 scopacia Pk. 4003 spec. G.

ERIGERON

^{*)} Valdopere stoloniferum. Cæterum differt ab E. hirsuto.

4004 * purpureum Ch. 4018 literata Cr. E. 14.

ERIOPHORUM 4005 vaginatum A. ERODIUM 4006 ciconium Cc.

4007 hymenodes K.

ERVUM

4008 diphyllum Nobis *) D.

ERYNGIUM

4000 "corniculatum L' ERYSIMUM.

4010 * angustifolium

4011 hieracifoliumRl. 4012 junceum V.

EUPHORBIA 4013 cajogala? A. Fr.

4014 canescens E.,

4015 * dentata Cr. 4036 * uniglumis R. 4016 * emarginata R. 4037 *vaginata Ba. 4017 * esula K. FICUS 4038 *) E. pedunculis unifloris folio longioribus, stipulis lanceolatis, cirrhis obsoletis dirarius tetraphyllis, leguminibus tenuissime pubescentibus.

4019 maculata Cr. 4020 peplus L. 4021 picta D. 4022 pilulifera E. 1023 provincialis Ch. 4024 valentina E. 4020 lucida A. Fr.

FEDIA 4026 discoidea D. V. 4027 echinata Ba. W. 1028 olitoria Pk.

4029 radiata D.

FESTUCA: 4050 ciliata Stev. R.

4031 opina

4032 * pannonica V. 4033 * proæformisBn.

1034 rubra

4035 * tenuifolia V.

4038 (rubiginosa V. (australis W. FLAVERIA 4050 contrajerba L. FOURCROEA 4040 (gikantea §. Agave foetida W FRANKENIA 4041 lævis Pk. FRITILLARIA 40+2 lutea MB. R. 4013 meleagris G. 4044 tulipæfolia MB.R. GALEGA

GALEGA

4045 * orientalis L.

GALIUM

4045 anglicum Bo.L.V.

4017 * aristatum R.

4048 divarieatum E
4049 * linifolium D.
4050 parisiense D.
4051 * rubioides D.
4052 * rubrum Cr.
4053 * saccharatum E.
4054 * tyrolense D.

GARIDELLA 4055 nigellastrum Bn. GENISTA

4056*candicans Cr. 4057 * florida Cn. 4058 * hispanica G: 4059 * rabra G:

GEORGINA 4060 lilacina pallidissima V.

4061—purpareo-fasciata V.

4062 — basi flavicans G. 4063 pallida V.

4064 purpurea pallidio V.

GERANIUM

4065 carolinianum Ea

4006 lanuginosum Jacq Cr.

4067 rotundifolium Cr. K.

4068*subrotundum Ch. GEUM

4069 pyrenaicum Ch.L. 4070 strictum Ch. L.

GLAUCIUM

(violaceum Ch.

(bridem Lian. GLEDITSCHIA

4072 * florida G. 4036 saxifraga Cr. 4073 inermis Pk. 4037 spec: *) GLOBULARIA 4058 viscosa E. V. 4074. * vulgaris Cr. HEDYCHIUM GLYCINE 4080 coronarium VI. 40.5 * bimaculata G. HEDYPNOIS 4076 * clandestina Ch 4000 arenaria Cr. 1091 monspeliensis Cr. GNAPHALIUM (pensylvanicum 4 HEDYSARUM 3077 (W. En. Bn. 4092 bublearifolium? (americanum. GOMPHRANA 4078 brasiliensis Ch.D. 4079 interrupta Ch. - GOSSYPIUM 4080 barbadense Ch. 4081 * hirsutum V. 4082 * sinense R. GYMNOSTYLES

4093 * junceum Bn. R. 4094 * saxatile Ch. 4095 * viridiflorum Cr. 1096 * viscidum R. HELIATHEMUM 4097 * apenninum R.V. 4008 * brevifolium R. 4000 canariense Cr. L. 4083 anthemifolia Ch. 1100 * mutabile R. GYPSOPHILA 4101 * obscurum L. 4084 elegans MB. R. 4102 pulverulentumL. 4085 paniculata Foem 4103 * punctatum Bn. 4104

B.

^{*)} Simillima G. paniculatæ, sed flores pallide rosei, doplo majores eam statim distinguunt. Cmu G. dichotome seminibus mixta germinavit.

4104 * roseum B. 4121 pruriens? R. 4 05, surrejanum R. 1122 tiliaceus R. 4100 vulgare b. gran. 4123 vitifolius R. diflorum L. HIERACIUM HELIOPHILA 4124 * alpinum L. 4107 emplexicantis Bn. 4125 * Bellardii Rl. 4108 curassavieum Ch. 4127 * coronopifol um HELMINTIA D. 4109 * depilata L. 4128 * crassifoliumOr. HEMEROCALLIS 4110 graminea sibiri ca R. HERACLEUM 411 * auricum Z. 1132 pilose lo des Vill. HERMANNIA 4112 althaecefolia G. 4113 multiflora Cc. R. 4135 * sylvaticum K.V. 4114 trifurcata Cr. HESPERIS 4115 africana K. 4116 laxa E. 5117 (linifoliaH.Par.R. HORDEUM)
(Cheiranthus. 4137 *hysteix HIBISCUS HYMENOCARPUS 4118 esculentus L. R. 4.119 * palmatus R. 4.138 (E. L. 4120 * pentacarpos R. | (Medicago circi.

HELIOTROPIUM 4126 * cerinthoides Cr. 4129 * florentinum L. 4130 * grandiflocumCr. RI. 4131 murorum Cr K. 4153 * polyphyllum Rl. 4134 * prenanthoides E. HOLCUS (bulbosus W. En, 4136 (Cr. (Avena 4137 *hystoix E.

(nummularius Cn.

nata.

HYOSERIS 4139 scabra L. HYPERICUM

4140 baleavicum B.G. 4156 # triloba Cr.

4141 undulatom Ch.D. JRIS

4142 * veronense L. HYPOCHAERIS 4145 * hispida E.

HYPTIS

4144 persica L.

HYSSOPUS

4145 lophanthus Bn.

4146 nepetoides Cr.E. 4147 orientalis L.

JL1.ECEBRUM

4148 echinatum D. JBERIS

4149 odorata R.

JNULA

4150 # dysenterica Ch. 4166 bracteolata S. 4151 * germanica K.

4152 " grandiflora R.

4153 * viscosa L.

JPOMÆA

4154 Dillenii *) L. 4155 quamo IA. Ch.Cr. D.

4157 arenaria K.

4158 xiphioides Pk.

4159 sambucina pallidior Pk.

4160 squalens Linn.Pk.

5161 spec. fol. varie-

gatis Pk.

ISATIS

4162 lusit mica Bu.K.

4163 * orientalis L.

JUNCUS

4161 # tenuis Ch.

JUNIPERUS

4165 sper. G.

JUSTICIA

4167 * paniculata R.

4168 * periplocifolis R.

KLEINIA

4169 * porophylla V. KYLLINGIA

^{*)} Species intermedia inter J. purpaream et Nil.

4170 * umbellata R. LACHENALIA

4171 tricolor §.

LACTUČA
4172 * canadensis K.
4173 * hybrida Ch.
4174 * palmata D. K.
4175 sativa romana C
4176 virosa L. V.

4177 var? *) LAGURUS

4178 ovatus D. LAMIUM

4179 amplexicaule
4180 * rugosum K.

LAPSANA
4181 * lyrata D.

LATHYRUS

4182 cicera Ch.

4183 clymenum Ch.

4184 inconspicuus Cr.

4185 pisiformis?

4186 setifolius Pk.

4187 spurius W. En.

Ch.

LAURUS

4188 benzoin? Pk.

LEONTODON
(Taraxacum H.

Ger.) 189 * bessarabicus R. 190 * glaberrimus Rl.

1191 * serotions K.

LEONURUS

192 crispus Cr.

LEPIDIUM

1193 * coronopifoligm
D.

1194 Jheris Ch.

195 latifolium G.

4 96 perfoliatum K.
LEPTOSPERMUM

4197 * permum arachooideum B.

4198 * scoparium B.

LESPEDEZA

4199 * glomerata R.

LESSERTIA

4200 * herhacea Ch.

LIGUSTICUM

4201 * peregr num Ch.

4202 scoticum R.

LINARIA

4203 *bipunctata Ch.

4204

^{*)} Purpurascens, foliis laciniatis.

4204 Hælava Ch. D. L. 4205 purpurea L. 4206 simplex L. 4207 * variegata R. LINUM

420, spec. D. 4209 tenuifolium Cr 4225 linifolius Bn. 4210 usitatissimum hu 4226 pilosus Bn. Pk. mile Ch.

4211 - multicaule Ch LYCHNIS 4212 * dispermum K. 4213 distichum Ch. D. 1229 * læta K.

LOBELIA

4214 pubescens Cr. LOLIUM

4215 * canadense L. LOPEZIA

4216 racemosa Bn. K. 4252 verticillata Pall. B.

LOTUS 4217 * diffusus Cr. 4218 Dioscoridis? P. 4219 " odoratus Ch. 4220 siliquosus Cr.D. 4221 * tenuis K. 4222 spec. G.

LUNARIA

(canescens W.En. Bn.Cc.D.L. (Alyssum clypeatum. LUPINUS

4224 hirsutus G. 4227 varius Bn. Ch.

LITHOSPERMUM |4228 chalcedonica fl. albo Ch.

4230 sylvestris fl. car-

neo. 4231 viscaria fl. car-

1200. LYSIMACHIA Ch.

MADIA

4255 viscosa Bn. Ch.V. . MALACHRA

4234 * alcemfolia V.

MALPIGHIA 4235 glabra? Pk. MALVA

4236 * fragrans Ch.

4237 moschata, Ch.

4239 niceensis V. 4230 parviflora V. 4240 y peregrina Cr. 4241*stricta L. 4242*tridactylites R.

MARISCUS

4243 " aggregatus R. MARRUBIUM

4244 *astracanicum Ch., 4257 tribuloides Bus 4245 hirsutum? Cri 4246 * sericeum R. 4247 * supinum L. R.

MEDICAGO 4248 denticulata G. 4260 (-Pk.

4249 græca W. En. Bn. (M. alba? D.

1250 granadensis W.En.

4251 * Karstiensis D. 1252 maculata Cr. K.

1255 marginata Bo. D.

4254 murex Ba. Cr. 4255 radiata Cr.

1255 ragidula Ch.

4258 spec. *)

4250 " uncinata Ch.

MELALEUCA (linarifolia? **)

ME.

*) M. perennis, floribus racemosis, leguminibus (anne potens lomentis?) cochle atis cylindricis, anfractibus tribus compressis, distantibus, inermibus, foliolis obovatocuneatis, antice denticulatis. Flores flavi, ra ins viridescenti violacei. Caples patentes. Patria mihi ignota. Anne M. cancel at, MB?

**) Flores albi. Illustr. D. Boreyko possidet cam sub nomine M. albae. Definitio Persocoli M. linarizzioleze ex omni parte quadrat cum nostra. M. albæ descriptionem hactenus desidero.

MELILOTUS 4261 * gigantea Rl. 4252 italica W. 4255 * macrorhiza Ba. K. 4264 Petitpierreana W En. K. MELISSA 4265 * palegioides D. MELOCHIA 4266 pyramidata V. MENTHA 4267* niliaca Ch. 4268 pulegium Cr. MERENDERA 4269 caucasica R. MESEMBRY ANTHE-MUM

4270 spec. 3. MILIUM 4271 * gallecicum R. 4272 multiflorum RV. 4273 * paradoxum V. MIMOSA

4274 " julibrissin R. MIMULUS

4275 * ringens Bn.

MINUARTIA

4276 * montana D. MORUS 4277 nigra Pk

4278 * tatarica R. MUSCARI

1270 racemosum? caueasicum R.

MYAGRUM 4230 perenne Bn. K.

MYOSOTIS

4281 squarrosa Ch. MYRSINE

1282 retusa 8. NEMESIA

4283 * chamædryfolia

Bn.

NEPETA. 4284 * citridora L.

4285 crispa D.

4286 graveolens I.

4287 incana Bn.

4288 \$ longiflora Ba. 4289 * tuberosa K.

4200 * violacea Cr.

NICOTIANA

4291 macrophylla Ch. NIGELLA

D

4292

4202 damascena coar ctata Chi V. 4293 hispanica Ch. NYMPHEA 4294 alba 4295 lutea OCYMUM 4296 album Ch. Cr. 4207 basilicum bulla tum Cb. Cc. 4298 - crispum Ch. 4200 - latifolium Cr. 4500 - purpurascens 4301 (En. Cn. D. (americanum Hort. 4302 sauctum Cr. **OENOTHERA**

4503 * gauroides Bn. OLEA Pk.

ONONIS

4300 altissima L. 4306 * Columna Cr. 4 of feuticosa B. 4308 * glandulosa Cr.

ONOPORDON 4300 * arabicum Cr. 3310 * illyricam Cr. ONOSMA 4511 # arenaria Ch. ORNITHOGALUM 4312 comosum caucasicum R. 4313 narbouense caucasisom R. ORNITHOPUS 4314 compressus Cr. (repandus Cr. (micranthom W 4315 (heterophyllus W En. OTHONNA 4316 * grandiflora Ga OXALIS 4317 reclinata Ba PANICUM 4318 coloratum D. 4304 undulata W. En. 4319 echinatum? V. 1320 * fasciculatum D. 4321 italicum ægyptiacum Cu. 1322 - persicum Cr. PAPAVER

nia-

4329 somniserum laci

niatum G.	1337 aspera W. En.Bn.
4324 - pictum E.	R.
PELARGONIUM	1338 zaylanica Cr.
432) Barringtonii W	PHLOX
Eo. Pk.	339 reptans Ch.
4526 inquinans fol.zo	PHORMIUM
nat. G.	.340 tenax Pk.
4327 # Il. coccineis	PHYSALIS
Ch.	1341 chenopodiifolia
4328 * hybridum fl.	Bo.
roseis V.	4342 flexuosa VI.
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	4543 ixocarpa B of Ch.
THE RESIDENCE OF THE PROPERTY	4344, pubescens B.
4330 speciosum W.Eu?	利用した。例如 15 At 正式で 1900年前の10 10 日本 まいりょう 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Al.	4345 canescens A.
PENTAPETES	4546 * scorzoneræfoli-
4331 ovala V.	om R.
PERYLLA	PIMPINELLA
4352 ocymoides Bn. L.	4347 peregrina L.
V.	PISUM
PHALARIS	4348 arvense K.
4333 hulbosa Sp.	4549 * thebaricum Ch.
PHASEOLUS	PLANTAGO
4354 * fuscus V	4350 * afra Cr.
4335 nanus sem. nigris	4351 attissima Bn.
Ch.	4352 * Bellardi Ch.

luteis Ch. 4353 crassa Bu. K.

1354 Cynops Bn.

4336

PHLOMIS

4355

4355 maritima Cr. 4356 pumila D. 4357 * rigida K. 4358 saxatilis MB. Ch. 43 o spec. *) Cr POA 4361 bulbosa Fr. 4362 cæsia var? aspe ra V. 4363 * divaricata D. (meg stachya Ch. 4365 (Briza eragrostis Linn. 4366 mexicana H.Ma. drit. R. 4367 peruviana Ch. 4368 * procumpens Ch. POLEMONIUM 4369 reptans, G. POLYGONUM 4370 arenarium L. POTENTIALIA 4371 ascendens 4572 * astracanica Ch.

4375 declinata H.Vinz deb. VI. 4374 diffusa W. En. Buc VI. 5359 sibirica H.Gor.R. 4375 * pilosa Bn. Ch. rectæ var? flor. 4576 pallidis majoribus POTERIUM 4377 * hybridem V. PRENANTHES 4364 festucæformis V,1378 hieraciifolia Bn, PRIVA 4379 hispida Juss. D.R. PRUNELLA 43 lo alba Bn. 4381 * hyssopifolia K. 43.2 liciniata K. PRUNUS 4383 lusitanica B. PULSATILLA 4384 vulgaris A. PYRETHRUM 4385 * argenteum. Ch. 4386 * ceratophylloides D. V.

^{*)} Media inter P. crassam et majorem ; magnitudinis vero prioris.

4387 * maximum V. PYROLA 4388 minor 4389 rotundifolia 4300 serunda PYRUS 4591 raci mosa? G. BANUNCULUS 4302 lanuginosus A. RAPHANUS 4595 tenellus V. RESEDA 4394 * undata Bn. RHEUM 4395 caspicum Ch.

4396 * compactum Cr. 4597 * crispum Ch. 4598 * hybridum Cr. RICINUS 4599 viridis Bn. Ch.

ROBINIA

4400 altagana Pk.

4401 tomentosa? Ch. 4414 spec. *)

ROSA

4402 collina K.

ROTTBOELLA (biflora Bn. Cr.

1405 (Cr. D.

(pannonica W.En.

404 filiformis K. ROTHIA

4105 runcinata Sp. RVBIA.

4406 linctorum G. RUBUS

4507 * hirsutus K. RUELLIA

4408 ci. a Ch.

RUMEX

4409 * britannicus Cr.

4410 * divaricatus Cr. 4411 * nemolapathum

4412 * nemorosus R.

4413 * patientia K.

4416

^{*)} Rumex noster omnino quadrat cum descriptione R. conferti W.En. sed definctus a R. conferto ex horto bot. Halensi. Pedicelli

4415 * ucranicus R. SALVIA 4416 abyssinica D. K. 44 17 æthiopis Ch. Cc. 4418 * argentea E. 4410 * austriaca Ch. 4420 * campestris E. 4421 grandiflora B. 4122 lacinista Cr. D. 4423 * patula E. 4424 ragosa D. 4425 sideritidis W. En. K. 4426 sylvestris W. Ch. 4127 tranc. a D. K.

K.

4446 dulcis S.

SCORPIURUS

4427 tranc. a D. K.

SATUREIA

4448 sulcatus Ch.

SCORZONERA

4442 * calcitrapa Cr.

SAXIFRAGA

4449 hypnoides Z.

SCABIOSA

4450 cauescens E.

4451 *longepedunculatary

ta R.

4446 dulcis S.

4441 sulcatus Ch.

SCORZONERA

4442 * calcitrapa Cr.

SCABIOSA

4445 * octangularis Bn.

4444 mellifera V.

4445 * scorodonia Cr.

SCU

1452 * nitida E. 44.3 * pubescens Bn. 4434 * pyrenaica V. 4435 spec. SCHKUHRIA 4436 abrotanoides D. SCILLA 4437 amœna? caucasica R: 4438 b folia A. Mz. 4439 - flor. albis A. SCOPARIA 4440 dulcis . SCORPIURUS 4441 sulcatus Ch. SCORZONERA 4442 * calcitrapa Cc. 4445 * octangularis Bn, SCROPHULARIA 4444 mellifera V.

prope basin nodulo instructi, versus apidem incrassati. Valvoire latissime cordate, I titudine longitudinem fere dimidio superante, reticulato-venose, repando-denticulate spadicere, granulo parvo pallidiori.

Λ.//eq	29 —
SCUTELLARIA	SERRATULA
4446 late iflora Bn D.	4464 * alata Bn.
4447 * peregrina Cr.	4465 * centauroides V.
SECALE	4466 * coronata D. R.
4448 cereale tauricum	4 67 * quinqueflora Bn.
Ch.	SESELI
SEDUM	4468 * corsicum R.
4419 aizoides Red. Pl.	4469 * hispidum Sp.
grass. G.	4470 spec. Z.
4450 * d syphyllum V.	SIDA
	4471 * alnifolia Ch.
4452 hybridum Cr.	4472 * tiliefolia V.
the second secon	'SIDERITIS'
4454 sparinm W.En.V.	
SEMPERVIVUM	4474 * hyssopifolia R.
4455 * canariense R	4475 perfoliata Cc.
SENECTO	SILENE.
4406 * coriadeus La	4476 armeria fi. car-
4457 * desquamatus Bn	neo Ch.
4458 erucæfolius K.V.	
4459 lividus Cr.	4478 * colorata E.
4460 montanus Ch.	4479 (fabaria E. K. Cucubalus
4401 umbrosus A.	Cucubalus (Cucubalus
4462 viscosus Cr.	4480 * flavescens L.
SERIANA	4481 linifolia W. En.V.
(mexicana Al.	E.
4463 (Paullinia mexi	4489
(cana Linn.	(Cucupains
10 Suffer J 10 Suffer	4483

4483 * nemoralis L.V. SISYRYNCHIUM 4184 ornata D. V. 4501 convolutum W. 4486 * pinguis E. 4487 * rubella L. SILPHIUM 4488 * connatum Bn. SINAPIS 4430 eracoides Bn. 4400 foliosa Ch. 4401 incana Cr. SISYMBRIUM 4400 contortum L. R. Bu: D. 4497 erysimoides K:

4485 (picta Ch. K. En. *) (reticulata Hort. 4503 * luteum Ch, En. *) Pk. SOLANUM 4503 corymbosum K. 4504 * diphyllum V. 4505 Humboldtii Wa En. D. 4506 pyracantha V. 4507 suffruticesum W En. D. 4402 juncea Bo. L. V. SOLIDAG) 4495 * orientatis D. 4508 lateriflora Ch. SONCHUS 4494 * harbarea Bn. 4009 chinensis H.God. 4496 eckhartsbergenselibio fenticosus P. 4511 teverrimus Ch. SORGHUM 4498 obtusangulum K. 1512 Arduini V. 4499 orietale K. 1013 balepense K. 4500 strictissimum Cr. 45,4 rubens Bn. L 4515 saccharatem D.K SPAR-

³⁾ S. convolutum Red. Plan. liliac. videtul alia species ob scapum teretem, qui manifest in nostro est anceps, immo alatus.

SPARTIUM 4516 livifolium R. SPERMACOCE 4517 tenuior Ch. D. SPILANTHUS 4513 oleraceus fuscus

I.

SPIR/EA 4519 " triloba R. STATICE 1 20 * limo ium Pk 4021 * olemfolia Ch. 4)22 spathulata L. 4.23 * reticulata K.

4524 virgota W. En.V. STERCULIA 4525 platanisolia R. STEVIA

4526 purpurea W.En. 4541 ce alocarpon Ch. Ch.

4527 pedata Bn. 4523 ivæfolia W.En.D.

R.

(Bunias W.

STIPA 4529 cupillita SUCC) WIA

SYMPHYTUM 4551 * læve

SYNTHERISMA 4532 agyptiacum M.

TAMARIX

4553 germa ica \$.

TETRAGONIA

4534 froticosa K. TEUCRIUM

4535 orientale Cr. In

4536 spec? G.

THALICTRUM

4537 * disvolor Bn. 4538 * medium Ba. Ch.

4530 * nigrescens.

4540 * purpurascens

Ch. L.

THLASPI

THRINCIA

4542 bicta V.

THYMUS

(calamintha W.

4543 (En. Cr. K.

(Melissa

4544 hirsutus MB?

4530 (balearica Ch. Cr. 4545 nepeta D TRADESCANTIA

4!

4

4

41

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4 4

4

4576

4546 undata W. En. E. 4563 sibiricum W.En 454 - * Zanonia L. D. TRIBULUS 4564 tenellum Ch. 4545 terrestris Ch. TULIPA TRIFOLIUM 4565 sylvestris cauca sica R. 4549 Cherleri D. 4566 volgensis R. 4550 hispidom L. TURNERA 4551 Jupinaster D. 4002 * ochroleucum K. 4567 ulmifolia G. 45.53 parviflorum Cr. | TURRITIS 4554 spumosum Ch E 4568*minor G. K . 4569 * nutans Cr. 4555 squarrosum K. AHTYT 4556 subterraneum D. 4570 augustifolia 4557 spec. *) URTICA TRIGONELLA 4571 baleariea Ch. 4558 cancellata L. 4572 * membianacea 4559 esculenta Ch. E. VALANTIA 4560 * monspeliaca Cr. TRITICUM 4573 cucullaria E. (caninum Ch. 4574 * granulata Cr. 4575 (* maralis E. (Elymus Linn.

*) E familia lupulinorum. Capitula magni albida, erubescentia; in fructiferis carina in flexa, vexillo erecto.

(Galium

4562 imbricatum MB

Ch.

4576 (pedemontana E. 4596 * maritima fl. al-(aspera V.

VALERIANA 4577 rubra fl. albo G. 1098 saxatilis Ch.

VELESIA

4578 *rigida D.

VERBASCU M 4579 Boerhaavii E.

4580 * floceosum E.

4581 * glabrum D.E.V. 4605 * biflora Ca. 4582 * pulveruleutum

Ch.

VERBENA 4583 bonariensis Ch. 4584 paniculata L. 4585 * rugosa L.

4586 * stricta K. L.

VERONICA

4587 * raustralis V.

4588 (canescensCr.D.

4589 caucasica Ch.

4590 * complicata D.

4501 digitata E.

4592 * foliosa Cr.

4593 incana Ch. Cr. K.

4594 * incisa D.

4595 media D.

bo Ch.

597 pinnata D. L.

dogg * serrata Cr.

600 teucrium Ch.

4 .01 * articæfolia Ch.

VICIA

4602 * bicolor L.

4604 * ferruginea G.

4605 globosa Barla L.

4606 * lencosperma E.

4607 *megalosperma E.

1608 * nodosa Cu.

1609 * pyrenai a G.

4610 * segetalis G.

4511 * serratifolia K.

4612 * syriaca Ch.

VIOLA

(neglecta Vahl. 4615* lancifolia?

VITIS

4614 laciniosa Pk.

XANTHIUM

4615 spinosum Ch.

XERANTHEMUM 4616 inspertam E.

ZAPANIA

4617

4617 (nodiflora E. V. 4619 multiflora lutea (Verbena Linn. Ch. ZEA 4618 mais rubra Ch. 4620 capitata D. ZINNIA

ZIZIPHORA

ADDENDA

ÆGILOPS 4621 * cylindrica E. AMARYLLIS 4622 spec. Pk. BISCUTELLA 4625 pumila? Cr. BROMUS 4624 commutatus Bn. 4634 repandum Ri. CAPSICUM 4020 torulosum? fr. luteo G. CHEIRANTHUS 4626 * erysimoides K. 4627 incanus G. CICER 4628 lens sem. albis G. PHASEOLUS CORDIA 5629 spec ? G. CREPIS 4639 spicatum A. (sibirica 4630 (Hieracium W.

CUCUMIS 4651 * anguinus Ch. DIPSACUS 4652 * ferox R. DOLLOHOS. 4655 * varids K. ERYSIMUM HIERACIUM 4635 molle ORIGANUM 1636 * pillidum L PANICUM 4637 italicum alhum Cita 4638 max V.

PHYTEUMA

4640

POA

4940 * maritima Cr. SEDUM 4641 * spathulatum E. 4644 æstivum e Can-STELLARIA 4642 nemorum TRIFOLIUM

4643 diffusum V. TRITICUM dia Ch. VALERIANA 1045 * sibirica G.

SYNONYMA.

(Acmella buphthalmoides (Buphthalmum sca brum (Bidens nivea (Verbesina dichotoma (B. dichotoma? (Centaurea ochroleuca Adams. (C. collina H. Vind.

(Metrosideros lingaris (M. speciosa (Panax aeuleatum (P. trifoliatum (Sonchus floridanus (Llactuca floridana (H. Dorp. (Stevia ovata W En. (St. paniculata Thou-

DELENDA

Nº. 5 Acacia species 33 Achillea spec. 83 Agrostis verticillata 510

510. Artemisia spec. 11214 Ervum spec. 457 Blitum cheropo-1233 Erysimum spec, Euphorbia spec. dioides *) 1265 Ferula spec. 600 Campanula spec 1282 642 Carduus sper. 1313 Erankonia spec. 813. Chrysanthemum Georgina spec. 1362 creticum 1563 853 Cistus spec. 1495 Heracleum sphondylium **) 876 Cleradendrum 1668 Iris hispanica spec. 941 Cordia speciosa 1775 Lathyrus palu-995 Crepis spec. stris var. svl-1031 Cyclamen inodo vat. Prim. Fl. Gal. rum 1139 Dolichos speci 1975 Medicago spec. 2020

*) Examine multoties repetito et comparatione cum Chenopodio rubro instituto cognovi Blitum meum chenopodioides esse verum Ch. rubrum Linn.; hinc æque ex Flora Galiciæ austriacæ quam ex catalogo nostro est delendum. Notari vero meretur in systemate hæc inconstantia numeri et laciniarum calicis et staminum; raros solum in-


**). Planta sub hoc nomine communicata non differt a nostro H. flavescente; hinc ut indigena est hucusque delenda.

veni flores pentandros, calyce 5 partifo.

2029 Mespilus cocci- 2443 Pistacia speca nea Var. in-2542 Potentilla spec. Rosa spec. ermis 2771 2889 Salvia spec. 2049 Mimosa spec. Sanseviera spec. 2093 Myrtus spec. 2910 Nicotiana spec: Silene hispida 2130 3108 2100 __ viscida Origan. spec. 3135 2205 Ornithogalum 3166 Sisyrinchium spec. spec. 2236 Paeonia spec. 3197 Solanum spec. Stipa juncea 2286 Payonia spec. 3285 3498 Verbascum speci

2332,4 Pelargonium

spec.



AD

CATALOGUM

PLANTARUM

in in

Horto botanico

GYMNASII VOLHYNIENSIS CREMENECI

cultarum

ANNO MDCCCXIII.

CREMENECI MDCCCXIV. Mandato Censuræ in Universitate IMPE-RATORIA Vilnensi, permittitur impressios Cremeneci die 22. Decembris. An. 1813.

Michaël Sciborski Director Gymnasii et Censor. Exiguus est numerus plantarum, qui anno hoc collectionem nostram auxit. At quis mirabitur? Varii funesti et adversi eventus conspirarunt quodammodo ad progressum horti nostri retardandum.

Subita Thadæi Comitis Czacki mors, *)
cujus perrara merita ac tot præclaras actiones non solum Gymnasium hoc posteritati et
scriptis et monumentis mandabit, sed cujus
quoque imago menti concivium harum Procinciarum semper erit infixa, cujusque famam nulla delebit dies, atque grata tuebitur Patria; mors inquam tanti Vici eripuit
horto nostro, in sinu ejus nato, ingens patrocinium. Fatale bellam interrupit tam utile horto nostro commercium cum pluribus
hortis exterarum Nationum, et inferendo anno præterito duobus hortis nostri Imperii **)
damnum extenuavit æque emolumentum redundans in nos ex commercio intra limites no-

A 2 stros

^{**)} Obiit die 8. Februarii ex febri nervosa.

***) Hortis Excell. Comitis Razumowski Ministri Instructionis publicæ etc. etc. et Universitatis Imper. Vilnensis.

-

stros servato. Ad complendos sinistros eventus accessit quoque humida et frigida tempestas anno hoc fere non remittens.

Grato animo repeto nomina Excell. Com. Czacka ex Porycko, Ilmi Mareschalli et Commissarii Boreyko, Cl. Prof. et Doct. De la Vigne Charkoviæ, nec non seduli nostri hortulani Grabowski, qui hoc etiam anno hortum pulchris ac raris plantis ditarunt. Singulari in Floram pavitate eminens Illmus Colonellus Justinus Ratomski (Ra.) præbuit nobis non solum plures extraneas, verum etiam quasdam a nemine adhuc observatas nostrates plantas ex horto suo Kolesnicensi. Il. Consil. Colleg. Eques Steven (St.), Præpositus erecti Sympheropoli in Tauria Instituti œconomico-botanici, cui hortum nostrum elapsa æstate învisere placuit, plantis et seminibus tauricis eum suppeditare solitus est. D. Andrzeiowski, qui constanter omnem operam ac diligentiam in perlustrandis diversis oris harum Provinciarum ponit, intulit horto nostro plures majores momenti plantas ex Podolia, Subsidia in seminibus, quæ anno hoc obtinuimus, debemus præcipue benevolentiæ Excell.Com. Czacka, tum Cl. Cl. V. V. Prof. et Doct. De la Vigne, Doct. Fischer Præfecti horti Gorincensis atque Prof. et Doct. Schrader Gottin,

gae, Germinant insuper adhuc semina plura anno præterito nobis serius transmissa.

Ad reddendum hortum botanicum adhue utiliorem conamur jungere ei collectionem Præstantissimarum et nobilissimarum arborum fructiferarum, quarum Catalogum opportuno tempore vulgare non intermittemus.

Tum arbores fructiferas quam etiam diversas plantas perennes, frutices et arbores, quarum penum habemus, dabimus lubenter amatoribus justo pretio venales.

Cremeneci primis Decembris 1815.

W. Besser
M.D. Professor HistorNaturalis.

ACACIA	4656 moly B.Ra.
(acanthocarpaW.	4657 saxatile)
4646 (En. Pk. Z.	4658 moschatum)Si
4040 (Maculestocarpa	4659 rotundum)
(Hort.	46bo * vincale A.
4647 * glandulosa Z.	ALYSSUM
ACER	466 serpyllifolium S
(pensylvanicum	AMARANTHU
4648(W. G.	4662* spicatus L.
(striatum	AMARYLLIS
ACHILLEA	4663 Reginæ B.
4649 ptarmica fl. sim-	ANDROSACE
plice G.	4664 lactiflora Fisch.l
4650 serrata) Ch	4665 villosa dahurica
4651 santolina)	R.
AGAPANTHUS	ANEMONE
4652 præcox W. En.	4666 hortensis Pk.
Pk.	4667 * virginica Bn.
AGROSTEMMA	ANGELICA'
4653 coronaria fl. ple-	4668 spec. e Dahuris
no B,	R.
ALCHEMILLA	ANTHEMIS.
4654 pubescens St.	4669 hungarica K.
ALLIUM	(spec? Ch.
4655 * glaucum Schrad.	
K.	(pensis Hort.
	AN-

ANTIRRHINUMI 4671 asarina L. AQUILEGIA 4672 vulgaris fl. pleno Ba ARABIS 4673 * bellidifolia R. 4674 procurrens K. ARCTIUM 4675 * minus Sehk. ARMERIA W. En. (Statice). 4676 denticulataSchrad. H.G 4677 - scorzoneræfolia W. En. D. ARUM 5678 orientale A. ASCLEPIAS 4679 * tuberosa Z **ASPARAGUS** 4680 spec G. ASTER 4681 annuus Ch. Ra. 5682 " cordifolius Ra. 4685 laxus W. H. G. 4684 novi belgii Ra. 4685 spec B.

4686 sibiricus R. ASTRAGALUS 4687 asper Ch. ATHAMANTA 4683 * alata R. ATRIPLEX 4689 angustifolia W. En. 4690 verticillata R. 4601 virgata Cr. AVENA 4692 * pratensis K. BELLIS 4693 perennis radio rubro Ra. 4694 - flosc. omnibus ligula tubuloso A. BERBERIS 4695 canadensis? B. BETULA 4696 lenta BISCUTELLA 4697 depressa W. En. Bn. BRASSICA

4699

præcox G.

4698 oleracea capitata

4699 lapponica v. Tur- 4710 trachelioides M. nepa Pk. BULBOCODIUM 4700 vernum Ch. BUPLEURUM 4701 fruticosum B. 4702 Gerardi V. CACTUS 4703 mammillaris a. culeis rubris Pk CALTHA 4704 palustris fl. pleno B. CALYCANTHUS (lævigatus W.En. 4705 (. (ferax CAMPANULA

4706 aures E. 4:07 rhomboidea H.G. 4708 speculum G. 4709 thyrsoides H.G.

B. Ch. 4711 ucranica nobis *1 CAPPARIS 4712 ovata D. R. CARDUUS 4713 centauroides H.G. 4714, spec. c. Dahuria R. CARICA 4715 microcarpa Pk. CENTAUREA 4716 apula Ch. 4717 austriaca? 4718 dealbata Al. 4719 pectinata? 4720 procumbens L.

CERASTIUM 1722 manticum K. CHENOPODIUM 4723 olidum E.

4721 spec. nov. Ch.

CHRY-

^{*)} Sub nomine C. betonicæfolia nobiscum communicata. Simillima C. rapunculoidæ. Essentialiter differt calycis laciniis et germine glabris, laciniis oblongis erectis inflexis, corollaque empliore et breviori.

CHRYSANTHE-4735 (peltata D. C. umbilieus var. MUM 4724 rotundifolium K. 4756 umbilicus R. CISSUS 4725 orientalis Pk. 4737 coronopifolia K. CLEMATIS 4726 crispa HG. 4727 lasiantha H.Gor. 4738 schoenoides K. CYPERUS CLINOPODIUM AL. CONVOLVULUS CONYZA

4759 bulbosus R. 4728 vulgare variegat. 4740 pannonicus K. DELPHINIUM COLUMNEA 4741 elatum fl plen. Pk. 4729 scandens G. 4742 spec.e. Dahuria R. DESMANTHUS 4730 lineatus (4745 (diffusus W.*)Pk. 4731 saxatilis (DIANTHUS 4732 * bifrons K. 4744 * alpestris Ch. 4753 * Gouani V. (atrorubens Prim. CORCHORUS 4745(Fl. Galic. A. (carthusianorum 4.734)* multisiliquosus var ? Z 4746 chinensis fl.pleno COTYLEDON B Ra. DIGI-

CREPIS

CRYPSIS

^{*)} Flores in nostris decandri; cæterum congruit; imo semina ex horto berolinensi proveniunt.

DIGITALIS 4747 lutea H. G. 4748 purpurea fl. albo G DORYCNIUM (Lotus Linn.) (herbaceum K. 4749 L Dorycoium DRACOCEPHA. LUM. 4750 * peregrinum K. 4751 speciosum R. EPIMEDIUM 4752 alpinum Ra. ERICA (procera Salisb. Pk. 4753 ((arborea Linn. ERIGERON 4754 * delphinisolium Bu. ERODIUM 4755 chamædryoides Pk. ERYNGIUM 4756 dichotomum H.G. 4757 * polustre Ch.

EUPHORBIA

4758 esula taurica St. 4759 glareosa MB. A. 4760 saxatilis St, FERULA 4761 * communis Ch. FESTUCA 4762 * seroting Ch. GALIUM 4763 diffusum Schrad. H. G. 4764 hispidum W.En. 4765 humifusum MB. St 4766 maritimum H.G. 4767 palustre GEUM 4768 intermedium? e. Dahuria R. 4769 * macrophyllum GNAPHALIUM 4770 graveolens St. HALLERIA 4771 lucida Pk. HEDYSARUM 4772 pictum 4773 triquetrum(HELI.

HELIANTHUS 4774 annuus flosculis omnibus ligulatis Ra. HELLEBORUS 4775 yiridis B. HEBACLEUM 4776 * absynthifolium 4777 longifolium ? *) RL HERMANNIA 4778 aluifolia \$. HIBISCUS 4779 syriacus fl. pleno 4780 vesicarius Al. HIERACIUM 4781 andryaloides H.G. 4897 spec. e. Dahuria 4782 * flexuosum V. 4783 * flosculosum Cr. 4784 lanatum Kit.H.G.

HYACINTHUS 4787 citiatus St. HYDRANGEA 4788 arborescens Pk. HYPERICUM 4789 hyssypifolium St. 4790 monogynum Ra. **JATROPHA** 4791 napæifolia Pk. INDIGOFERA 4792 tinetoria Ch. H.G. INULA 1793 bubonium K. IRIS 4794 * aphylla Ch. 4895 * foetidissima K. 4796 pallida var. albida G. R. 4798 variegata

limbata **) G. JUNCUS

4786 spec. e. Dahuria 4799 effusus

B.

4785 * pallescens K.

4800

^{*)} Folia et habitus H. longifolii, sed flosculi æquales. **) Lacinize exteriores refleace flavo-limbate.

4800 glaucus 4801 tenuis Ch. JUNIPERUS 4802 nana lithvanica Ra. 4803 phoenicea G. KOELERIA. 4804 * glauca Cr. LASERPITIUM 4805 hirsutum H. G. LEERSIA 4806 oryzoides *) LEPECHINIA (spicata W. En.G. Z. 4807 (Horminum cau. (lescens (Ulricia pyrami-

data Hort.

LEPIDIUM

4808 * crassifolium K.
4809 spec. e. Dahuria
R.
LILIUM
4810 crobeum **) Pk.
Ra.
4811 * pomponium G.
4812 tenuifolium R.
LINUM
4813 angustifo tum Cr.
4814 maritimum H.G.

4815 * suffruticosum. Al.

LOLIUM

4816 complanatum H. G.

LONICERA

4817 alpigena Pk.

4818 tatarica fl. rubro

Pk. LO-

*) Culmi erecti bipedales et ultra, panicula ampla patente. **) L. croceum omnino distincta species a L. bulbifero, quod diversa forma capsulæ evincit. Prioris capsula pyriformis, hexagona, angulis alatis, apice retusa; L. bulbiferi caps. oblonga hexagona, angulis rotundatis obtusissimis, apice emarginata

1	
LOTUS	4836 * linearis D.
4819 congestus (H.G.	MENTHA
4820 peregrinus	5857 lævigata (Ch.
LYCHNIS	4838 villosa (
4821 chalcedonica car-	MESPILUS
nea Ra.	4839 * americana B.
4822 flor. pleno.	4840 germanica var?
LYSIMACHIA	minor Pk.
4823 ephemerum H.G.	4841 latisolia Pk.
4824 * decurrens L.	4642 * lucida B.
MALPIGHIA	MIRABILIS
4825 canescens Pk.	4845 jalapa fl.albis(
MALVA	4844 — fl. albo-(
4826 borbonica H.G.	rubroque(
4827 mauritiana fl. al-	varieg. (Ra.
bo Al.	4845 — fl. flavo (
4828 micrantha K.	rubroque(
4629 reversa BR. R.	varieg. (
MARŖUBIUM	MUSCARI (Hya-
4830 peregrinum K.	cinthus).
MEDICAGO	4846 monstrosum Ra.
4831 rupestris St.	MYOSOTIS
4852 * minima Ch.	(montana Prim.
MELALEUCA	4847(Fl. Galic.
4835 alba (B.	(sylvatica Ehrh.
4834 nodosa (NEPETA

MELILOTUS. 4835 Kochiana W.En.

H.G.

4849

4843 * amethystea Ch.

OENANTHE

4849*involucrata(Ch. 4862 minima Cr. 4850 * prolifera (PELARGONIUM ONONIS 4863 canarieuse Z. 4851 * minutissima K. 4864 gonale flor miniato Pk. ONOSMA 4865 — marginatum 4852 stellulata St. ORNITHOGALIIM fl. roseo Ra. 4866 - var ? *) G. 4853 fimbriatum St. OROSTACHYS Fisch. PEPLIS (malacophyllum 4867 portula PHASEOLUS 4854 (R. (Cotyledon. -4868 * exoticus Z. OXYTROPIS PHILADELPHUS 4860 inodorus B. 4855 ambigua R. 4856 uralensis R. Z. PHLEUM 4870 Michelii H. G. PAEONIA PHLOMIS 4857 * anomala Bn. 4858 triternata Pall.St. 4871 herba venti H.G. PANCRATIUM 4872 caribæa Ch. 4859 disciforme Ch. PHLOX PARIETARIA 4873 glaberrima Pk. 4860 judaica Z. 4874 suffruticosa B. PASPALUS PINUS 4861 * pubescens Z. 4875 larix sibirica R. PASSIFLORA 4876 spec. G.

*) Tota planta hirta. Petela rosea reticu-

PI-

PULMONARIA PIPER 4877 obtusifolium Ch. 4888 detiurica R. PISUM PYRETHRUM 4878 sativum umbella- 4889 parthenium fl. tum Ra. PYRUS PLANTAGO 4879 recurvata H. G. POA 4880 pilosa Ch. (tatarica Fisch.R. 4881 (Aira arundina-(cea MB. PRENANTHES 4894 * Koelpinia K. 4882 viminea K. 4883 spec? e. Dahuria RHUS 4895 coriaria B. Pk. PRIVA (Verbe-RIBES na Linn.) 4884 mexicana H. G.

PRUNUS

4885 pumila B. 4886 serotina G.

POTENTILLA

4887 hirta St.

pleno Ra. 4890 coronaria Pk. 48q1 malus fl. pleno B. RANUNCULUS 4892 aconitifolius fl. pleno B. 4893 asiaticus Pk. Ra. RHAGADIOLUS

4896 rubrum fir.(albo (Ra.

4897 spec. RICINUS

4898 hybridus nobis*) Ra.

RO-

*, Videtur hybrida proles R. communis et lividi. Caulis pruinosus foliorumque costæ rubræ. Racemus - longior quam prioris, Pedicelli

BOBINIA . 4899 * fraticosa Pall.B. ROELLA 4000 cernua Z. ROSA 4901 carolina K. 4902 (mollissima B. (pomifera Hort. 4903 reversa K. 4904 rubrifolia V. 4905 pumila? (4906 spec. nova? (St: e. Tauria(ROTHIA (Andryala). (cheiranthifolia W. Z. 4907 ((sinuata RUELLIA 4908 * strepens Z. RUMEX 4909 abyssinicus Jacq.

4910 *lævigatus Ch. 1911 undulatus K. ! SALIX 4912 arenaria Ra. 4913 variegata B. Rac SALSOLA 4914 arenaria SALVIA 4915 Habliziana St. 4916 lanigera *) Z. 4917 pratensis alba Ra-4918 - carnea 4919 napisolia E. SATUREIA 4920 montana St. 4921 thymbra Pk. SCABIOSA 49221 comosa R. 4925 dichotoma Z. 4924 inflexa Klukii***) (arifolius H. G. | 4925 ucranica St. SCAN-

celli fructus cocco plus duplo longiores, fructusque magis distantes quam R. communis. Duratio hactenus ignota. Sub dio annuus.

^{*)} Affinis S. ceratophylloideæ. Verticilli remoti. **) Vid. Prim. Fl. Galic. T. II, Ap-

SCANDIX 4934 campestre K. 4926 pecten Bn.Cr.L. SEDUM SCIRPUS 4955 spec? *) G. SEMPERVIVUM 4927 sylvaticus SCORZONERA . 4936 tectorum Ra. SENECIO 4928 hispanica Ra. 4937 * aquaticus K. 4929 purpurea Z. SCROPHULARIA 4938 dentatus Cr.H.G. 4930* hastæfolia (Ch. 4959 saracentcus A. 4940 spec: ? B. 4951 hispanica 4941 tenuifolius Ra. 4952 peregrina L. SCUTELLARIA-SESELI 4042 selinoides nobis 4933 orientalis St.

4943.

pend. p. 336. Jam alibi nota, possideo enime eam jam a 2 annis ex seminibus exteris. Semina coronata, sine pappo stellato, caules diffusi ramosissimi, ramis ascendentibus, floresque minores præcocioresque distinguunt hane speciem potissimum a S. succisa.

SECALE

*) Affine S. telephio, sed flores majones, pauciores, rubri. Non est S. t. maximum.

1 **) Umbellæ planæ et folia Selini, fruetus ero et petioli Seseli. In nemorosia fire. O trog. Semel tantom in Galicia legi nanc Umbelliferam ast defloratam, fructibusque nondum maturis.

(Cheiranthus panicu. | (S. nilotica latus . (Erysimum repandum (Salvia abyssinica

Sorbus intermedia nostra (S. latifolia

DELENDA.

104 Allium capense 224 Anemone ægyptiaca 584 Campenula junces 1152 Dracocephalum spec. 1159 Dolichos spec. Euphorbia cajogala 4057 Genista florida

1596 Hypericum spec. 1614 Jatropha spec. 4208 Linum spec. 4636 Origanum pallidum 2268 Passerina tinifolin 4455 Scabiosa spec. 4556 Teucrium spec. 3548 Thymus hirsutus var. glabra

AD

CATALOGUM

PLANTARUM

Markets Consume in Constant LINE

Horto botanico

GYMNASII VOLHYNIENSIS CREMENEC

oultarum

ANNO MDCCCXIV

CREMENEC!
MDCCCXIV.

Mandato Censuræ in Universitate IMPERATO. RIA Vilnensi, permittitur impressio. Cremeneci die g. Novembris. An. 1814.

> Michaël Sciborski Director Gymnasië et Censor.

ACALIPHA diversifolia Polystachya ACHILLEA e ranopilolia E Gerberi W St. * lanata D leptophyila MB St. magna major e Dahuria R " odorata Ch paradoxa E pubescens di Schkuhrii tomentosa ÆGILOPS squar osa D. ESCULUS Hava N AGROSTIS (dulcis L " flivescens L (retrofracta (versicolor AIKA canescens A. Fr

præcox D semineut a K su spicata AJUGA chamospitys At ALBUCA 1) spre B. PK ALHAGI (Cimelorum H. Gr. R (Hedysarum pseudal-(hagi MB. ALLIUM aceuarium L * capillare R * danobiale K fl.verm ? tauricom St # illyricum K neapolitanum L

¹⁾ Habitus et magnitudo A. coroutæ Rad. Liliae sed forma flarison nino quadrat cum A. lastigiata.

eseum K rotundum A Stellerianum? 2) A# 2) Tota planta tenerior, folia obtusa et bulbi albi. striatum Ch # suaveolens Ch * tataricum R (wolly nicum nohis 3) 4 spec. Catal. nostri 3) A. (caulescens, planifolium, staminibus appendiculatis, capsuliferum) umbella globosa, staminibus alter. nis basi auriculatis, corolla vix duplo longioribus, foliis linearibus canaliculatis subcarnosis glaucescentibus. Differt ab A. lineari, cui maxime affine: flores centia pracociori, um. bella semper erecta, mec ante anthesin cer mua. foliis canaliculais, fere teretibus et

staminibus tantum auriculatis, auriculis rotundatis. In apricis. ALOE arachnoidea PK cymbiformis BM. VI plicatilis PK. ALOPECURUS (bulhosus) K *(nigricans) pratensis ALTHEA officinalis ALYSSIIM * creticum K Daba MB. ST. gemonense (hirsutum MB St (scabeum linifolium Steph.D spec 4) T. 4) Planta imo generis dubii. Habitus et affinitas cum Draba stellata Jaeq. D. hirta Linn. (D. stellata Fl. Dan.) et D.

et D. incana vix per- |clongata A* mittunt separationem filiformis R. hujus plantæ a Drabis; septentrionalis T. attamen stamina quatu ANGELICA or longiora dente mem branaceo magno in terne sunt instructa et valvulæ siliculæ ovatoellipticae convexae lon. gitudine vix semel latitudinem superant. Supra saxis in apricis. tortuosum Ch. L * vernale H. Er l. L AMMI majos Ch ANCHUSA lutea D. L. ochroleuca A? spec 5) A 5) Media quasi inter A officinalem et angustifoliam. Biennis testante Dno M. D. Kosinski. zaylanica Jacq. L. ANDROSACE

Bocconi K.

atropurpurea K. V ANTHEMIS ruthenica MB. St. tinctoria b. cinerascens R L ANTHYLLIS * apicularia K. ANTIRRHINUM * intermedium D. APARGIA * angustifolia E Villarsii D. E. AQUILEGIA (bicolor D *(sibirica B ARABIS (ciliata L *(erispata E (lucida L ARAKATSCHA N. ARENARIA (graminifoliaSchrad. 4* (procera Spr. -meb mebsm if la# (rostrata D

(triflora E
ARISTOLOCHIA

plematitis A*
ARTEMISIA

elegins (e China) R

pocera A*

scopuria

ARUND

Langsdorfii R

* tenax L ASCLEPIAS

a gustifolia E

ASPARAGUS

o tentalis R ye ticillatos R. St.

ASPERULA

Azalindes MR T.

(Galiom glaucom Linn.

(glauca mihi 6)

(G. glaucum Jacq.

6) A. galioides MB sequodum specimina e genninibus tauricis ab Jl.

Eq. Steven mecum com-

municatis culta non est Galium glaueum Jacq. sed Lionei, si licet supponere Limeum prætectisse sile tio corollam jufundibuliformi campanulatam. Cseterum congruit cum planta hujus nominis H. Landish. et cum descriptione Linnei in Roth Tent. Flor, Germ. Il, T II P.I p 184 citata. D ffert vero a G. glauco Jacq. caulibus diffusis tenerioribus. floriferis adscendentibus, foliis plerumque 5 6 . dimidio angustioribus et longioribus superne magis viridibus, floribus rario ibus, serio ihus et corollæ lacinis parvo mucrone inflexo

instructis.
(humifusa mihi 7) A*
(G. humifusam MB.

7) Spe-

7) Specimen vivum e Tauria communicatum omnino quadrat cum planta nostra, etiamsi definitio in Flora Tau. rico Caucasica data discrepat. * montana L supina MB. R ASPRELLA Humb. (Elymas) Hyst ix L ASTER corymbosus E. N junceus E. N lævis L. N punctatus S spec 8) A 8) Affinis valde A.amela lo, sed differt potissì mum: foliis acutis, inferioribus obovatolan. ceolatis, remote plus minusve medio serratis. spectabilis E N * Spigelia Ra ASTRAGALUS arenarius VI.

MEMacantna MB St

ustrideus An cymb formits K Li spec. e Dahuria R spec A" Fr. taurious St. ATHAMANTA # flekuosa D ATRIPLEX argentea D L AVENA flavescens D panicea D pratensis? q) 9) Spiculæ 2-3 floræ flosculo sterilis tertio Folia angustissima complicata, fasciculorum fere setacea. Vagiua pubescentesi BELLIS perennis fl.albo pleno G. BIDENS * diversifolia E BROMUS lanceolatus At * maximus D. L multiflorus Di

* racemosus D * scoparius D tectorum * volgensis E BRYONIA alba BUPHTHALMUM salici olium Ch BUPLEURUM junceum St. * scorzoneræfolium D CACALIA Cl ngerillan anteuphorbia N Kleinia G suaveolens B. N CACHRYS taurica St. CACTUS glomeratus VI CALENDULA fruticosa N CAMPANULA carpatica Ra marsupii flora R persicifolia fl. pl. caruleo PK opec 10) 10) Campanulam præse-

fert glomeratam, sed folia subtus incano - tomentosa uti in C. hononiensi, * speciosa Ram. L [₩] spicata L trachelium fl. pleno B CARDAMINE hirsuta * italica L * major L CARDUUS arctioides D * defloratus L hamulosus A personata L uncatus R CAREX Drymeia (recurva) *(stellulata) K (vulpina) CARLINA echinus E CARPINUS orientalis St. CASSIA

sericca N. Ra CASTIARINA stricta § CAUCALIS arvensis A# daucordes CEANOTHUS (glaber Bot. Cult. B (microphyllus Michaux CENTAUREA arenaria MB. St. calocephala A* centauroides St # flosculosa K glastifolia K. N. VI mollis ? 11) T. 11) Ambiguat inter C. mollem et axillarem. Calyces sunt fere prioris, folia vero alterius. In uno specimine vidi flos. culos radii perfecte foemineos: parviflora D. St. orientalis A* * pubescens St * rupestris K salicifolia MB Ch

sibirica T * sphærocephala D (tatarica A* (centauroides b MB trichocephala MB D * vochinensis L CERASTIUM anomalum lanatum L sylvaticum D * pensylvanicum E CERCIS canadensis N CETERACH (officinarum W.En.Ch (Asplenium Ceterach Linne CHEIRANTHUS * asperifolius WP * decumbens fragrans? R odoratissimus R scoparius W. En. V CHENOPODIUM bonus Henricus * crassifolium K ficifolium opu-

* ppul'folium D t midam K CIRYSANTHEMUM struum D. L C IRY SOCOMA villosa St. CICHORIUM i tegrifolium K CICUTA davo ica H. Gor. Pa CINERARIA geifolia \$ sipi ica milor R CLEMATIS integrifolia A maritima VI virginica N vitalba B CLINOPODIUM ægs ptiacum D (CNICUS (C sium Tourn. carthamoides R ecui o ephalus St exs apus H. Gor. R. * Halleri Ch * neterophyllusL pachyacauthos H. Gor.

tatarious D. L. COLX exaltata (e China) N COMMELINA augustifitia D CONVALLARIA majalis fl pl. CONVOLVULUS citiatus K holose iceus MB St linearis N CONYZA " factida L * longifolia L squarrosa K. L. St COREOPSIS ferulæformis N CORONILLA coronata St minima HG. CORYDALIS fungosa D L CREPIS * neterosperma D * scabra D Sprengeriana D. Va

CU

CUPRESSUS horizontalis N CUNILA * pulegroides L CYNANCHUM acutum St CYNOGLOSSUM * lanceolatum L CYRTHANTHUS angustifolius Pk CYTISUS argentens Ch austrigeus A leuranthus Wet K. A. * teiflorus DACTYLIS * 21 ucescens W. En.E. DAPHNE alpinum K DECUMARIA b chara N DELPHINITIM chineuse 12) R 12) Folia fere D. Aia. cis, perenne. (danuricum 13) mili (spec.e Dahuria Suppl. 11 15) D. (nectatio tella-

phyllo) galese phyllis in equalities ellipticis, labelli amplissimis genitalia abscongentibus subrotundis crenulatis basi barbatis , foliis mollibus, tri subquinquepartitis , lacibiis coneatis sobtrifido-inc so-dentatis. Petala colo is et megatadinis D. ucceolati, nectaciom, violaceum, Prima vice florens, sesquipedate, perenne. fissum D.K. L * intermedium villo. sum L * varians L DIANTHUS atrorubens Jicg. At barbatus fl. pi. * ræsius Ca * furcatus E prolifer A DIASIA (miditolia Dec. R

Ul Gide

silleda melen d'alles (Gladiolus gramineus BR. circulations has a DIOSPYROS virginiana B DIPSACUS laciniatus A's DOLICHOS (vexillatus) *(violaceus) D DORYCNIUM (fruticesum St (monspeliense W ECHINOPS ritro A* * ruthenicus D ECHIUM asperrimum Ch. St strictum DE EHRETIA tinifolia WP EHRHARTA panicea D ELEPHANTOPUS carolinianus D ELYMUS (crinitus.) L (rampsus) EPHEDRA

monostachya St EPILOBIUM alpestre K tetragonum b obscus rum L **EQUISETUM** hyemale ERIGERON alpinum K (lævigatum D *(philadelphicum ERVUM * punctulatum tetraspermnm. ERYNGIUM maritimum ERYSIMUM bicorne B K EUPHORBIA agraria MB. St epithymoides V pubescens D. L rigida MB. St spec T. salicifolia Host. A tenuifolia St. EVONYMUS atro

atropurpureus 9 (FEDIA (Valerianella Tourn. (dasycurpa Ster 14) A* (dentata MB 14) F. caule scabro, fructa ovato acuto, apice unidentato, pul bescente. Steven in Memoires de la Société impériale des Naturalistes de Moscou T.If. p. 178- Fructus apex revera sex dentatus, sed quinque denticuli minimi. Pili fructus incurvati. dentata A: rigulosa E FERULA nod flora A: FESTUCA (duriusculat) at care (flavescens) D' *(myurus) (sylvatica L (stricta K tenuiflora Schrad. D

* vallesiaca V FICUS stipulata VI FONTANE IA phillyræoides N FRANKENIA pulveculenta K FRAXINUS (oxyphylla MB St (oxycarpa W. GALIUM (erectum) *(litigiosum) L (purpureum) GENISTA ovata L GEORGINA variabilis purpurea flor plen. S GERANIUM bohemicum A * collinum Ch dissectum A * ibericum D * mollé K * parviflorum D umbrosum A

GEUVI * vi gi icom D GLAUCIUM. falvom D GLECOMA hirsura W. et K. GNAPHALIUM germanicum D. L factidum cal. flavis G margaritageom VI nitidum D undulatum D GRATIOLA officinalis Ch GYPS) H'LA acutifolia H. Gor. R. 序 dubia E HEDYSARUM paniculatum D. V HELIANTHUS decapetalos L. N # macrophyllus K trachelifolius PK HELI PHILA erithmifolia) D pinnata) HELIOIR PRIUM Chenopodioides Humb.

HELLEBORUS purpurascens W. et K. HEPATICA trilob. fl. pl. B N HERACLEUM angustifolium RI HERNIARIA hirsuta D hireuta? 15) A* St 15) H. hirsuta nostra est eadem cum taurica distincta vero a H. nirsuta Primit. Flor. Galic. et H. Dorpat. Differt ab utraque caulibus basi lignescentibus (Duratio hucusque ignota. In Flora Taurico Caucasica dicitur annua) incanescentia evident ori omnium partium, foliis lineari lanccolalis obtusis aut oblongis bast attenuatis, antueris flavis, stamini. C .bandoB at

bus et filamentis sterilibus illis æquilon gis annulo prominulo giar duioso ad basin laciniarum calycis ins f tis. Anne potitis H. in cana? In planta e horio Dorpat. stamina solum tria, antheris rubris. An. ne bicce character con veniat etiam plantæ galicianse, ob defectumi speciminis bene siccati difficile mini est eruere. HESPERIS Bituminosa D matronali affinis Ucrania B * sibirica L (HETEROTRICHUM (MB. (Saussurea Dec. pulchellum H. Gor. R HIERACIUM blattarioides b pyremarcum L & fallax L

foliosum At (hirsutum E *(humile D (Lachenali Li * lapsanoides L murorum (parvifl rum D (pictum Bernh: Ch (pumitum L *(racemosum K (speciosum D (tubulosum L (undilatum K HIPPOCREPIS unisiliquosa D HORDEUM secalinum HY ACINTHUS * amethystinus HG: HYDROPHYLLUM magellanicum R HYOSCIAMUS pallidus W. et K. A# senecionis W. En. N HYOSERIS radiata K HYPECOUM proa

procumbens D HYPERICUM tomentosum D HYPOCH/ERIS dimorpha EL **JBERIS** linifolia D. N INULA germanica A# oculus Christi A" palusiris K. L JPOMÆA. heterophylla D. L IRIS bitlora germanica taurica St * humilis Ch hungarica K sibirica fl. albo S Swertzii? S virescens Red. Lil? 16) 16) Forma et color florum atque foliorum quadrat cum icone cel. Rejoute, sed differt scapo trifloro et florendi tempore seriori: **JSATIS**

* bannatica L tinctoria A* JUNCUS atratus Krok. 17) 17) Confer. Primit: Flor. Galic: T. I. p. 2416 JUNIPERUS bermudiana N oxycedrus B IXIA * bulbocodium L LANTANA melissæfolia N pivea VI LEPIDIUM latifolium As LILIUM candidum variegatum PK martagon fl. pl. B LINARIA Silenæfolia L LINUM alpinum K LITHOSPERMUM tenuiflorum K LOBELIA splen-

splendens W. En. N LOPEZIA hirsuta Jacq. E LOTUS arabicus EL. corniculatus lius L (cytisoides D * (edulis D (humifosus E intermedius Lois, L LYCHNIS * alpina E * brachypetala Ch LYCIUM (chinense) * (lanceolatum) L (obovatum) (LYCOPSIS (Echioides Desf. nigricans L LYCOPUS exaltatus A: LYSIMACHIA "dubia L LYTHRUM virgatum A* MALVA

abutiloides VI. L WF * divaridata D * obtusata L MARRUBIUM peregrinum A* MEDICAGO (caspica D *(falcata L (glomerata L * glutinosa L helix D AMMAZOM minima A MELICA ciliata A * pyramidalis * uniflora L MELILOTUS cærulea A: madrochiza A * rugosa E spec. a Tauria St. MELOTHRIA pendula D MENTHA * canescens) * undulata) D MESEMBRYANTHE C del-

Eulitorium at 5

deltoldeum N no tiflorum G terellion N (MESPILUS (Cratæ: us glandules. PK punctata PK MICROPUS Supious K L MONARDA (altissim . Le * ciliat Ch (rugosa K. N MUSCARI comusum A MYOSOTIS barbata St. marginala MB. A. squarrosa As NAPEA (levis VI. (Sida Napaca W. NEPETA Ailioui K. L. * lanata L # latifolia ma embiordes D La deucrioides D.

NICOTIANA chinensis). R gigantea) NITRARIA sibirica Pall. 17) R 17) Flor. Ross. T. L. p. 80 tab L fig. A **OENANTHE** pimpinelloides St **OENOTHERA** pomila D OLEA europæa buxifolia PK **ONOBRYCHIS** Boxbaumii MB. St. petræa Ch. R sativa hungarica K ONOPORDON * gratum L ORNITHOPUS ebracteatus K perpusillus D ORTEGIA hispanica D OXYTROPIS spec. e Dahoria 18) R E familia foliis ver-

verticillatis. # s. Ivatica St. PANCRATIUM decimatum VI PANICUM * crythrospermum V PAPAVER cadeasieum D. R dub um A hypridum St * nudicaule L PASPALUS * patotos E PASSIFLORA pedata N perfoliata § PEGANUM harmala L St PELARGONIUM altugoides DL cordatum? § PEUCEDANUM * alpestre L * tenuifolium D PHLEUM # arenarium L odoratum L

PHLOX

an all amadical fine

latifolia VI maculata N. S. VL undulata N. V4 PIMPINELLA dichotoma D tragium St PIQUERIA triocrvia Ch. D PISTACIA lentis us N (tofolia G Terebinthus pistacia (Bot Cult. PISUM sativum umbellatum VI. Lus 32 muenderugi PLANTAGO * albicans L asiatica DK cord ta? D " hirsuta K monspeliensis K stricta K * sericea E * Wulfeni D POA amabilis? D

COAT-

coarctata E. L. V elatior prolifera Ra dura A* * pulchella D sterilis MB. St * vivipara St PODALYRIA australis L POLEMONIUM carruleum fl. albo PK gracile H Gor. R POLYGONATUM lat folium T POLYGONUM divaricatum L fruticosum St 1 17 maritimum St POPULUS candicans VI monilifera VI POTENTIELA fragarioides Ch. D geoides Ch. H genines & supina POTERIÚM agrimonifolium Ch. St. PRENANTHES ramosissima R PRIMULA

PRUNELLA vulgaris Var ? minor PRUNUS cerasus A** - . fl. plenó - - semperflorens G PSORALEA bracteata PK PYRETHRUM * latifolium L millefoliatum St PYROLA umbellata PYRUS malus sibirica B salicifolia R OUERCUS suber B QUERIA hispanica Ch RANUNCULUS illyricus N nodiflorus K * platanifolius N polyanthemos ? tauri. cus St 19) 19) Foliorum forma

verticillaties.

acceditad R Januginosum. Valde hirsutus est. Steveni A20) 20) R. calycibus hirsutis patulis, pedunculis teretibus, foliis 3-5 partitis, laciniis cumeatis trifidis inciso dentatis. summis linearibus, stigmatibus patentibus, radice bulbi cipite. Differt præter mox enarratis a R. acri floribus fere duplo majoribus, Stigmata in R. acri uncinata. RESEDA glauca L N

RESEDA
glauca L N
lutea A*
RIBES
diacanthon? B
pensylvanicum VI
rubrum T:
ROBINIA
pigmæa VI
spec 21) A*
21) Est eadem cum R.

tomentosa MB (nequa-

quam vero Linnei)
nomen hine specificum adhuc desideratur.
A R.frutescente potissimum differt stipulis
membranaceis emarcidis et foliolis angusticuloribus longioribusque;
ROSA

Andrzeiowscii Stev. 22 A

quicum facile auglin. 22) R. foliolis duplicato-serratis ovatis acutis, utrinque villosis petiolis cauleque aculeis subulatis rectis (quam plurimis) pedunculis fructibusque (coccineis) globosis aculeatis calyce porrecto creberrime glanduloso muricato Stev. in Lit. Flores carnei magni. collina? dimorpha mihi 23) 23) R. calycis tubo el.

liptico pedunculisque

is glandulos . hispidis, petiolis cauleque spars aculeatis, aculeis subdeflexis rectiu culis, foliolis elleticis acutis vill siasculis bi. serratis fractibus glo bosis (coccineis). Dif fert a R tomentosa, quacum facile confundenda, foliolorum ser. raturis eglan lulosis. odore balsamico feliocum place distincto, floob sminoribus pallidissime carneis et feuciu magno globoso. Cremeneci in dumetis. frutetorum mini 24) 24) R. calveis tu 10 globoso peduncul sque gl bris, lacinits foli). lisque ellipticis villo gulis, aculeis infrastipularibus subternis. Differt a R. solstitiali, que similes, foliolorum

sctoso-aculeatis, lacini- forma et colore intense is glandulos chispidis, petiolis cauteque spar- rubro floris et forma magnitudineque fructus, folioris ellicticis Cum priori.

glandulosa mihi 25) A
25) R. calveis tubo elliptico beiniis pedunculis petiolis costisque
fol olorum glandulosobispidis foliolis elliptico- ovatis biserratis
suntus glorescentibus,
aculeis subr flexis sparsis, p ope Luck lecta.

parvula Ca

pyriformis S vartz 26)
26) Testante Ji. Eq.
Steven.

spec e Cashek)

- - ex alpe Kaischaus Cauc) Ch.

-- e Władi Caucasus)

RUDBECKIA * triloba L

RU.

RUMEX alpinus K * ex anguis K 🍍 purpureus 🖒 ve ticillatus D. K SALSOLA fruticosa N A* prostrata soda K SALVIA amplexicaulis E. L andidissima Ch * hæmatodes L nemorosa fl. albo A" * Spielmanni L verticillata fl. albo A" SANTOLINA alpina D squartosa PK SAPONARIA v ccaria A# SAXIFRAGA granulata G SCABIOSA * caucasica N gramuntia Ch. tatarica Ch. Spr. Grulensis A.

SCIRPUS * dichotomus K holoschoenus V SCORZONERA crispa St hirsuta B * muricata L rese refelia L taurica MB. St. SCROPHULARIA * Balbisii E betonicæfolia V * biserrata K lyrata D. R SCUTELLARIA altissima At hastifolia Ch SEDUM maximum L *(portulacoides E (rupestre L SELINUM Mounieri K Schiwerekii Prim. FI Galic. SEMPERVIVIIM toriu sum Ch SENEBIERA

coronopus

SENECIO

halimifolius N * hieraciifolius N * ilicifolius L tenuifolius 27 At 27) S. tenuifolius podolicus est genuinus S. hujus nominis. Ille antem ab Il.Col.Ratom ski lectus differt etiam in horto in loco aprico et solo argilloso cultus, laciniis foliorum remotis divergentibus foliisque laxis. SFRRATULA ciliata St radiata 28) T 28) S. radiata nostra differt a planta hungarica, foliis radicalibus et inferioribus lyratis, lacinia terminali ovata magna, floribusque præcocioribus majori. (* asperum K husque.

SESELL dichotomum St * elatum V * Pallasii E SIDA ulmifolia B SIEGESBECKIA orientalis L SILENE bicolor Ch * clandestina dichotoma A muscipala V * Mussini E petræa K saxatilis D. L. saxifraga Ch. V (scabra R (Cucubalus (viscosa T (Cucubalus SILER (aquilegifolium Gertn AX (Laserpitium SISYMBRIUM

*(glabrum D (pyrenaicum SMILAX sarsaparilla N SOLANIIM * dichotomum N (lycopersicum pyri forme Dan. R (spurium Cat. taurin. * melapocerasum melongena fr. albo E miniatum Bernh. St villosum D * virginicum D SOLIDAGO (arguta) * (mexicana) N (minuta) reflexa N. Vl. sempervirens Ch. N SONCHUS * caucasiens E * multiflorus E spec e Dahur. 29) R 29) Facies Hieracii aut Crepidis. Calyx Crepidis. Semina subcosta. ta transverse rugosa.

Pappus plumosus. Ans nua. Sub nomine Hieracii e Dahuria eandern quoque hoc anno obtinni. * uliginosus E SPIREA filipendula fl. pl. PK * lobata) N * trifoliata) STACHYS * erecta K * decumbens E nepetæfolia 30) D 30) Caulis pubescens, pilis deflexis. Ambigua quo ad genus. Corolles labii infer latera patentia nec deflexa; deflorata a margine marcescens. Stamina in tubo hæren. tia. Stigmata truncata crassiuscula, inferiori crassiori brevioriques Affiniorne Sideritidi? * scordifolia STAPELIA radiata VI D retia

geticulata 1 revoluta) VI tubata) vetola) STATICE * cord to K. L elata H Gor. R i cana L. N STELLERA passerina A STIPA * arisiella K STRELITZIA Region R SYMPHYTUM Suberosum TALINUM L reflexum V. TETRAGONIA cri t llina V L TEUCRIUM asiation Cr * canadense L THALICTRUM "foetidam L * nuta s L THY MUS Marschallianus angua

stifilius A* SE * montanes L * rotund fol us L TRAGOPOGON ressions B TRIANTHEMA monogyna D. V TRIFOLIUM (agrarium K * angulatum K (bractestum L diffusum conicum R filiforme Molineri I. V ochroleucum A# pensylvanicum DL scabrum ? caucasicum R striatum K TRITICUM cristatum A# * pannonicum K (squarrosum Roth patolum W. En. (Secale pungens variegatum muticum TUR.

TURRITIS * stenopetala TUSSILAGO * alba N. anandria R odorata N Petasites As VALANTIA checsonensis W. St VALERIANA phu VI VELLA pseudocytisus V VERBASCUM * Flongatum L Hornemanni D. I Orientale? A# VIRBENA erinoides K aupina D. L. V VERONICA austriaca A* elation ? Co. laciniata HG. montana multifida R Peregrina K taurica St

virgiotana VI VICIA megalosperma Ch. E te uit lia St VINCA herbarea W. et K. At minor fol argenteo varieg. PK VIOLA rothomagensis E spec 51 A 31) Observavi eandem jam i Galicia, uni varietatem parvulam V. lau ifolize esse put vi. Conf. Prim. Flor. Gal. P. I. 1.1.3. Adpopinget ad V. upestrem, i qua præprimis differt magnituline omnium parti im imo capsulæ alisque, VOLCAMERIA a lata N WULFENIA e rudhinea Ch XERANT LEMUM GISHULLIS A# YUC.

IV enemarked playman su	
YUCCA	# spicata D
aloifolia Pk	tauriea St
ZIZIPHORA	* serpyllacea D
ADDENDA	
* ACONITUM pyra-	DIGITALIS
midale N	orientalis L. WP.
AGERATUM album	DORONICUM
E	(pardalianches)
* latifolium L	(EUPATORIUM)
ALLIUM	(purpureum)
* canadense N	(GERANIUM)
ANEMONE	(album)
polsatilla fl. pl. N	(prostratum)
APOCYNUM	(lancasteriense
* venetum) N	(HEDYSARUM)
AQUILEGIA	*(canescens)N
vulg. stellata)	(HELIANTHUS)
* alpina) N	(divaricatus mollis)
* formosa)	(JRIS)
AVENA	(lurida)
sativa sibirica Ch.	(canadensis)
CARLINA	(plicatilis)
acaulis)	LINARIA
# corymbosa) N	chalepensis L
CENTAUREA	versicolor E
scubiosa	LINUM
* CREPIS	usitatissimum sibiri
nhagadioloides D	cum K

cum K
LYCHNIS

miniata N
MILIUM
(pauciflorum R)

(Agrostis berica D
MONARDA

clongata N

NEPETA

* argentea N

nuda

OCYMUM

(integerrimum)

*(pilosum)D

RUMEX

nemolapathum ? A*

SYNONYMA

(Achillea decumbens V (A. pubescens E (Aira pallens (A. pensylvanica (Allium glaucum HG (A spirale ' (Andropogon glaucus (R (Erianthus saccharo-(ides (Anthemis parthe-(moides D (Matricaria capensis (Ch. *) (M. mandiana N *) Confer. Suppl. II. p. 4. Anthemis sper. (Anthemis triloba W

(Zaluzania triloba N. (Asclepias pulchraHG. (A. incarnata Hort. (Athamanta rigida H (Gor. (Bubon buchthor-(mense (Atriplex virgata (Hotfm. Fl. Germ. (A. patula Schkuhr. (Man. (A. augustifolia W. (Campanula lobelio-(ides (C. juncea R (Roella cernua Z **) ** Capsula bilocu.

laris

laris, hivalvis apice deniscens. (Canna crocea H. (VI drit R C. lates C.t. (C strum auricula. (tum Hort. (C hirsutum Jacq. (Chelone formosa (Wadl. (C. barbata (Commelina caelestis (W E 4. (C. tuperosa Red. Li-(liac. (C. tahe-osa (C dubi R d L liar? (Cyperus:badius E.K. (C. hulhosus (C. sphacelatus (Delpainium exilta-(toin (D. americanum D. maritimam L (D, staphisagria (Dia ith is pateus (Hornem.

(D monspeliaensHort. (Ferraria Tigridia (F pavonia Linn. fil, (Ti ridia pavonia Jus. (Festuca elatior (Bromus litureus (Festuca cristata (F. cynosuro les D (Helianthemam (elongatum W. En. (C stus H licacaoum (Lolium arvense (L. can dense L (Lolium complana-(tom (L. asperum (Mariscus aggregatus (M. elatus (Macrubium serice. (um H Madr. (M. caudid ssimum (Mespilos americana (Suppl. II. (M. coccines (Pelargonium inqui-(nans fl. fulgida (P.bentickianum Hort. (Pen-

(Pentaphyllum lupi-(naster (Trifolium lupinaster (Phlox reptans W En (P. stolowifera BM. (Pulmonaria dahuri-(ca H Gor. (P. amoena Stev (Sapindus saponaria (S. edulis. (Scabiosa inflexa (Kluk ***) (Sc. australis Wulf. ***) Confer. Primit. Flor. Galic. P.H.p.336 (Rosa solstitualis Prim (Flor. Galic. (R. collina MB (ex (clasis nonnallis sy-(nonymis) (Scilla amoena cauca. (sica (Sc. cernua Red.pl.l.l. (Se. sibirica BR. (Selinam podolicum (本本本本) (S. Chabraei Jacque ****) Speciminibus

primis siceis comparatis. cum austriacis S. Chabraei, a quibus sufficienter distincts mihi visa sunt seductus, propriam constitui speciem; ast mode convictus sum nost am esse eandem cum austriaca, etiamsi lacioiæ folio um superiorum nungoam altingant longitudinem illerum plantæ aù∞ stciacae. (Spiræa canadensis (Hort. (S. carpinifolia W.En (Thalictrum glau. (cum HP (Th.speciosum W En DELENDA 599 Campanula spec 4029 Cordia spec 1606 Iris anglica 4950 Scropbularia hastæfolia

4940

4940 Senecio spec 4939 Veronica, spec 460e V. teuerium. 1716 Juia specfl.incar nato 1717.-fl.striate

me non must me in woo

4258 Medicago.spec 4897 Ribes spec 4899 Robinia fruticosa 2854 Salsola spec 4531 Symphytum læve

3405 Trifolium spec.

Explicatio novarum abbreviationum in hed Supplemento usitatarum.

A* designat plantas a D. Andrzejowski allatas ex itinere podolico.

- N ex horto in Niedzwiedziec Duc. Varsov. sito Excell. Com. Wodzicki Præf. Crac.
- T lectas in excursione botanica initio Maji v. St. cum D. Andrzejowski a me instituta in Circulum Tarnopoliensem usque Grzymałow.

WP. - - 2 D. Weinmann

nomico-batanici Sympheropoli, Cl. Cl. V. V.

Bernhardt M. D. Prof. Bot. Befording De In Fil I fantis vivis hoc anno ditarunt hortum Excells Ex ell Com. Com. Czucka ex Porycko et altera ex Stelec, Wodzicki Prælertus Cracoviensis, Illmi. Illmi Mareschallus et Commissarius Boreyko, Colonellus J. Ratomski, Cl. Cl. V. V. De la Vigne M. D. Prof. Hist, Natur. Charkoviæ, Fischer, M. D. Præfectus horti botanici Gorenkensis, et Rever. Jundziff Prof. Hist. Nat. Vilnæ. Nonnullas attulit indefessus noster hortulanus Grabowski. Uluz octaginta species intulit hocto ardentissimus Floree Volhynicie et Podolicæ cultor D. Andrzejowski ex peregrinatione sumptu liberalissimi Illmi Com. V. Rzewuski instituta scopo perlustrandi regiones adjacentes fluvio Borystheno incipiendo ab urbe Zalesczyki usque ad Mohylovism, nec non exaliis hujus provinciæ locis.

Semina plantarum suppeditarunt Jll. Consil.
Colleg. Eques Steven Præpositus Instituti œco.
E nomico.

nomico-botanici Sympheropoli, Cl. Cl. V. V. Bernhards M. D. Prof. Bot. Erfordiæ, De la Vigne, Fischer, Rev. Jundzitt, Ledebour M D. Prof. Hist. Nat, Dorpati Livon. Kitaibet M. D. Prof. Chem. et Bot. Pesthini, Oesterreicher M. D. Poof. Hist. Natur. Cracovice, Rochel Mag. Chir. Rakoweczia. Hung, Schott Hortulanus Unive sit. Vindebonensis. Schultes M. D. Prof. Bot et Therap. spec, Landishuti Bojorum, et Weinmann Hortulanus Imperatorius Gatschinæ, quibus omnibus et singulis quamplarimas publice agimus gratias, atque rogamus, ut semina vel plantas a nobis desiderare etalia nova nobiscum communicare velint.

Cremeneci primis Novembris v. st. 1814

W. Besser M. D.

Professor Historica

Naturalise

CATATOR

St. All the Control Market and Land St. All the Control of the Con

with the additional appropriate to a

S. S. P. W. C.

Tarona letter

being the late of the one of the state of the late of the late

AD

CATALOGUM

PLANTARUM

Al Bornson of Lines Common J. A. DERRA

The Hardenstein Vancous process of the Committee of the

Horto botanica in management

GYMNASII VOLHYNIENSIS CREMENECI

cultarum

Michel Salburshi

Anno MDCCCXV.

CREMENECI MDCCCXV.

CATALOGUM

SUPPLIENTUM IN

Ad normam et leges Censuræ JMPERALTORIE Universitatis Vilnensis præscriptas; Manuscriptum Supplementi IV ad Catalogum plantarum in horto botanico Gymnasii Volhyniensis Cremen-ci cultarum, ad

IMPRIMATUR, Die 7. Decembris 1815.

Director Scholarum per Volhvniam, nec non per eandem Librorum Censor Michael Sciborski.

CREWERT

THE SHEET AND ACACIA latisiliqua R WP. (falcata WP (obliqua Wendl. tomentosa? G ACALIPHA caroliniana K ACER monspessulanum N **ACHILLEA** bannatica Ch * crassifolia D cristata K dracunculoides WP fragilis E hetefophylla K micrantha K # montana N nobiles PU Thomasiana K A (alemperature) A 2

ACHYRANTHES Spec. 1.) WP. ACONITUM Spec. 2.) pyrengicum L uncinalum? B AETHUSA cynapioides V. elata Holfm. *) A AGRIMONIA eupatoria fl. albo D ACROSTIS

sylvation Hoste and

cinna D. K d ffusa Host. his ida) obliqua) K pubescens) * ser (ina)

sobolitera E

Syl-

1.) Frutex. 2.) E sylvaticis Circ. Ostrog. et Luceor. Affine A. Cammaro.

^{*)} Genera plantarum unibelliferarum. Mosquæ 1514. temporis nondun vid.

sylvatica Host. trichotoma K vulgaris aristata E AIRA juncea V ALBUCA fragrans WP ALCHEMILLA aphanes L ALLIUM acuminatum K (albidum H.Gor, (Stellerianum SupphIII. ciliatum VL * (descendens RL (rigidum Kit fuseum Kit RL globosum K.V. VI purpureum K Snec. PU. subhirsutum VL violaceum E

ALPINIA

galanga VL ALYSSUM micropetalum K saxatile 3) AMARANTHUS rigidus K strictus A AMARYLLIS hæmanthoides WP purpurea WP AMORPHA. spec? .B. ANAGALLIS rosea D novalis K ANCHUSA tinctoria RI. ANDROSACE alismoides Vmicrantha K ARCHANGELICA Hoffing (atropurpurea V (Angelica

rates. 2.) E windless Charleston, we had

^{3.)} Hæg species substituenda est loco A. gemonensis in Suppl. III. p. 2. siliculas hujus tunc temporis nondum vidi.

ANTHEMIS
caucasica K
cota Ch,
montana L
saxatilis L
ANTHERICUM W.
(Liliago PU
(Phalangium
(Liliastrum B
(Hemerocallis W: En.
ANTHRISCUS
sv/p:stris?hamilis 4.)

hispanica D

* pontana &

* Taraxaci D

AQUILEGIA
grandiflora WP

ARABIS
diversifolia K
hirsuta D

ARENARIA
fastigiata L
linifolia K
marina E
setacea K

ARMERIA
plantaginea K. E

AR-

4.) A sylvestris sub titulo duas colo plantas sat distinctas. Præcocior humilis semina fert breviora, gibbosiora, a rostro ad medium subangulosa, involucella emarcida et foliola latiora, serraturis obtusioribus. Caulis in norto bipedalis. Altera 2-3 septimanis serior, nrocero, dat semina graciliora et longiora, involucella habet persistentia, foliolaque angustiora, acute incisa. Caulis (in horto 4-5 pedalis) lacres seit, quod in priori jam nimis deflorato non sum expertus. Utraque Volhyniæ et Podeliæ sylvaticarum incola.

ARTEMISIA annua K arborescens? N campestris caucasica St. (glauca Pall. D. (obliqua VL grandiflora K herbacea K ARUM Di mitolinii arisarum VL. tennifolium WP ARUNDO calamagrostis? K speciosa H Gor. R ASCLEPIAS fuscata R ASPARAGUS decumbens Jacq. G. sylvaticus ASPERULA * taurica K ASPLENIUM (septentrionale A. (Acrostichum Linn.

ASTER

ambiguus E

biennis E concolor N dumosus N foliosus). giganteus?) N hyssopifolius) macrophyllus E. N multiflorus) ranunculoides) salicifolius) N tenuifolius) tripolium) vernus) ASTRAGALUS aduncus R baicalensis R buceros E lagopodioides K Laxmanni VL melilotoides WP (mouspessulanus (spec Suppl. III spec. WP virgatus uralensis R ATRAGENE alpina K AVENA

whose shurmaint

chinensis H.Gor. R

Juna A*

pentensis A

sativa georg. nigra Ch

- anglica nigra L

- pensylvanica præcox L

- - tatarica Ch - - sibirica Ch

BABIANA

villosa nigro cyanea WP.

BALLOTA foetida E

BERRIA

athmomilla WP

BETONICA orientalis N

BISCUTELLA

lævigata D pranatifida E

BLITUM

virgatum B minus V

nduvitue.

BORAGO

laxiflora **E**BROMUS

asper

laxus V

longiflorus V

(squarrosus MB.

(lanceolatus Suppl. III

volgensis? E

BUPLEURUM

(baldense St.

(Jsophyllum Hoffm.

CACTUS

spec 5.) WP

CALADIUM

sagittæfolium VL

CALLISACE Fisch.

(dahurica H.Gor.

(Angelica spec. e Da-

huria. Suppl. II.

CAMPANULA

barbata L

lanuginosa E

Lychnitis V

pen-

⁵⁾ Dicotyledoneus, cotyledonibus oblongo lanceolatis. E familia Opuntiarum.

pendula caue. St. reniformis L urticefolia K CAPSICU M erectum E Lowers (frutescens) macrocarpum F. (grossum) cydoniforme the fivenment of . (Tourneforti) pornife-Firm d. CARDAMINE pratensis CARDUUS (nitidus Kit. (Serrutula radiata? Supply Hi salinus VI. CAREX nemorosa K CARICA citriformis Vandand CARLINA

acanthifolia? 6.)

CASSIA : absus glandulosa 2 spec. WP CAUCALIS orientalis caucas.) - sibirica) CELSIA orientalis L sublanata V: CELTIS Tongaefortii St CENCHRUS tribuloides VL CENTAUREA babylonica N dilEusa E Isnardi L nervata R pratensis D reflexa D Scabiosa taurica St CERASTIUM repens tauric. St.

CHEL

^{6.)} Attulit e Podofia Cl. Zienowicz Prof. Chemiæ et Mineralegiæ G. V.

CHEIRANTHUS firmus E longifolius, V. turritoides R CHELONE, MARIA glabra V obliqua Namaliado) CHENOPODIUM botrys my feetidum PU GHLORIS polydactyla K CHRYSOCOMA biflora, N CICHORIUM, intybus hortense G CINERARIA alpine Wellerine CISTUS OF SUMMERON monspeliensis. 9 CITEUS N solding decumana B. St limon pomum Ada-And mi B. pomum paradisi. B. G. CLEOME: DO

uniglandulosa V CLEMATIS TO THE STATE OF angustifplia, N CLITORIA PUMBER virginiana L. V.L. CNICUS J.J.JIVE ACO eriophorus CHALLINS rivularis uliginosus E COLINSQNIA canadensis N COLLADEA (monostachya. VL (Tripsacum herman phraditicum Linn COMMELINA benghalensis L pallida? K CONIUM croaticum J sibiricum VL CONYZA inuloides Kit. COOKIA punctata VL CORIANDRUM

8 __

satioun A host ging CORISPERMUM canescens K CORNUS flogida? Name CORONILLA glauca K CORYLUS cornuta N COTULA cunei olia L maderaspatana VL CRAMBE cordifolia V CR TTALARIA (T) Ialifolia WP CRUCIANELLA molluginoides K CRY PSIS aculeata VL CUCUMIS guineensis L

CYDONIA
Justianica B
CYPERUS
elegans K
**infbricatus K

CXTISUS

capitatus A

DALECHAMPIA

scandells WP

scanders WP
DELPHINIUM

Ajacis A*
(cheilanthus H.Gor.
(dahuricum Suppl. III
cuneatum Ch.
pseudoperegrinum H.
Gor. R

spurium H.Cor. R Spec. (perennis) PU. DESMANTHUS

cinereus B

fruticulosus D montanus Ch.

moschatus major WP.

DIGITALIS

aurea WP
DISANDRA

prostrata VL

orientalis G. WP 19

DO.

DOLICHOS lunatus Ch. DOBONICUM altaicum WP DORYCNIUM latifolium D DRAGOCEPHALUM moldavicum PU virginicum L DRYPIS A THEORY spinosa K. L DURANTA Plumieri spinosa WP EBENUS cretica WP ECHINOPS horridus Ra ECLIPTA MINISTRAL latifolia V ELÆAGRUS hortensis edulis St. ELYMUS " curopaus A*, giganteus? VL hystrix K *intermedius E EPILOBIUM

incanum K origani olium. V ERIGERON glutinosum D ERIOCEPHAI US africanus N. V.L. ERODIUM AMEXAND glaucor hyllum VL. litoreum L moschatum I. maritimum K EUCOMIS striata VI. EUPATORIUM trifoliatum VL EUPHORBIA esula l'esticume. juncea V nummulariæ folia r L * pilosa V.L. sylvatica Jacq A. FAGONIA cretica L. WP FESTUCA alopecurus Ch. diandra? E

B 2

pube

pubescens K pumila K pinnata A. serotina PU FRAGARIA monophylla K FRAXINUS lentiscifolia N FUMARIA parviflora VL GALIUM adhærens K austriacum K caucasicum H.Madr. R cinereum E (intermedium Schult 7 (sylvaticum Prim. Fl. Gal. lividum St scabrum Ch. verum podolicum 3.)

GENISTA

syrmiensis RL.

(GEORGINA (Dahlia d) pulami coccinea G. Diversion GERANIUM THE STATE OF THE STATE ambiguum K collinum PU divaricatum PU roundifolium A GEUM II musicipaire hirsutum L GLADIOLUS " angustus WP blandus WP longifolius VL

> tubiflorus) tubispathus) WP

pterophyllus VL

venosus versicolor)

tardiflorus)

GEYCINE SIRMS TO A spec. WP. CUME IN

GLY CYRRITIZA

foetida

3.) Caulis magis tomentosus,

⁷⁾ Observationes botanice in Linnei Spec. pl. edit. C. L. Willdenow. Oeniponta 1809.

- 11 ----

foetida VIII RAROT GNAPHALIUM luteo-album K GOSSYPIUM (2016-dut) latifolitim ! V and) GYPSOPHILA compressa K (Steveni H Gor. Trepens MB Struthium K HTAI HARRACHIA Jucq fil. (speciosa R. V. (Justicla infundibuliformis Wahl. HEDYSARUM RVAL alpinum Dimens _ fl. albo R arenarium K 3 spec WF. styracifolium WP HEELANTHEMUM -* lineare R HELMINTHIA LISIM) rigida E HERACLEUM angustifolie var? etta clekana haumas

flavestentis Mail siberteum podokoum spec. e Tauria St. A. HERMANNIA hysogyi olia K. V. HESPERIS AND MI matronalis A HIBISCUS militaris W P of suratensis VL HIERACIOM Tolorid bifidum Lbironog I subandum e _ glabrum K OUL stoloniserum Land HORDEUM AND I RUE jubatum ok Stiem) HYPERIOUM : d) minus K. AIXI JATROPHA Igossyphiolia WP aquifolium fol. wameg. echinatis 3 JULECEBRU M argenteum Lag (.o

mulolipac

narhöhense R

cparonychia VL

Apudescens Z

INDIGOFERA

sarmentosa WP. 1

HESPERIS ALUNI

thapsoides Spr. V.

JRIS DV standarda

pomeridiana R
spec. e China R
2 Spec. e Sibir. WP

nigra N managa JUSTICIA (malabarica VL malabarica WL malabarica WL managa Manag

aristata VII. WF
efecta carrulea WP
lancea WP
palmarfolia WP
nolystachya VL

rosea VL scillaris WP - TAKE KOELERIA Harasini (tuberosa ? V 1 (328)) (Aira Wallesiaga appl LACHENALIA quadricolor WP LAMIUM) maculatum? roseum LATHYRUS IN COS I Cangustifelius Danage heterophyllus E. L. sativus e Sibir. W.F sphæricus Ch. LAWSONIA inermis WP LEPINUM * divaricatum K spinosum Char suffruticosum, K LEPTOSPERMUM (ambiguum Sm. B

(Metrosideros conifo-

lium Vent.

-MERACLEUM

^{9.)} Species intermedia inter germanicam et, en,

NEPETA MITILI MAGNOLIA candidum fl. pl. ul discolor? PK spectabile H.Gor. R (MALABAILA Hoffm. LINARIA COLLEGE (Pastinaca spuria La lo mivina graveolens MB St (1) LINUM alemiyers MARRUBIU Massara) hirsutum Fr. A. Y. Jafridanum K LITHOSPERMUM catariæfolium V purpureo - cæruleum cineseum? L LOEFLINGIA MASS MEDICAGO hispanica L. VC obscura K AZOMIM LOLYUM MELAREUCA tenue Ch leucadendron / B V L.T. LOTUS a sodola MELIAV MODELO decumbens V sempervirens [V.E. 14] Gebelia K deunie MELICA Marketin glaucus K ci 4046 Bauhini L maritimus V MELISSA cordifoliacL persicus K singen spec. e Taur. St. MENTHA LUZULA cervina Ra pulescens Wahl. rotundifolia varieg. N LYCHIM sativa? N MESEMBRYANTHE. ruthenicum V LYTHRUM maciles) MUM hyssopifolium K aureum) VI. tomentosum VI echinatum) Calle

14

NEPETA NITTE scabrum ALJOY DAM serratuin) VL hirdutal Vy Problem umbellatum) A 1/ 1/1) mullibractenta K parviflora StanAMI spec. § special (1) (MESPILUS salviæfolia, V.L. (Crategus GISUANAM serpyllifolia Killing NYMPHÆA melanocampa MB St monogyna fl. pla B carulea R 2011 METROSIDEROS OCKIMUM O TOTAL pinifolia RADIO M capitellatum Ly VI MIMOSA 2 ciliatum ? Ch scutellarioides (V) capensis WB OENANTHE MINUAREDA dichotoma VALI globosa D BUTOL OENOTHERA MONARDA media? K AOLISM sinuata Ch. indeb SNONIS I BORRES MONTBRETTA securigera WP 111/ antiquorum I MYOSOTIS aspera K montana taur. St. Matrix IV MYRICA of surviye ornithopodjoides U. faya? Balolisoner pinguis K (OREOSELINUM: 1 quercifolia 9 - (carolimensis B. V muoli Hoffin. (pensylvanica DuH. (Selinum NARCISSUS montanum R incomparabilis fl.pl.G. ORMTHOGALUM

cau

caudaium G latifolium VL Sternbergii Hoppe 10) OXALIS asinina WP digitata WP fabæfolia VL filicaulis WP flabellifolia VL. flava WP hirtella WP lanata) (in monetain lateriflora) WP pectinata) reptatrix VL. WP speciosa WP var:ia:bilis WP

PÆONIA tenuifolia? fl. albo B PANICUM capillare A

orientale fl. dupl.

PARIETARIA

officinalis

PASPALUS

(elegans Elnegg.VL)
(tenellus H. Par.

Kora L

PASSIFLORA

incarnata VL

PELARGONIUM

asperum? angustilo-

lium L. betulinum Dum. Co-

urs. G 11)

columbinum VL glutinosum cratægifo.

lium L

* muliticaule K

appetits on pursuentibus

pro-

10) O. minimum (villosum MB) delendum est e Flora volhynica. O. nostrum luteum est O. sylvaticum Pers. (O. Perseonii Hoppe)

11.) Flores albi, pet. 2 super. venis purpureis ramosis pictis, 3 infer. lanceolatis obtusis. Fo-

lia longiora.

。这一年

procumbens 12) I soendens PHASEOLUS stipularis Lam. VL zebra L PHLEUM Hostii V *tenue L PHLOX subulata § PHYLLANTHUS (montanus? B (Xvlophylla W. PHYLLOLOBIUM Fisch chinense H. Gor. R.VL. PIMPINELLA ocientalis L PISU M

sativ. umbellat. rose-

PLANTAGO dentata D * psyllium K salsola WP serraria K PLUMBAGO scandens VL POA angustifolia? VE cenisia b. L depauperata E K distichophylla V elongata K Eragrostis PU pilosa 13) PU * scabra L POLYGALA myrtifolia § POLYGONUM amphibium

Bel.

um L

¹²⁾ Folia coloris et vestitus P. exstipulati; suprema 3 partita. Pedunculi 3-6 flori, flores 4-5 ndri, stamine supremo tune brevissimo.
13) Dilfert a P. pilosa (caucasica) magnitudine multo minori, (tota planta vix 8 policaris) et spiculis pu purascentibus.

Bellardi L patulum MB St. POLYMNIA uvedalia WP POPULUS

> balsamifera angustifolia R

græca N suaveolens H.Gor. R. FOTENTILLA caulescens L agrimonioides V grandiflora E * hungarica E pedata? D Tyrenaica V

rubens VL umbrosa Stev. * viscosa, Differentian PRENANTHES arborea WP

PRUNELLA ovata I pinnatifida E

PRUNUS virginiana G

PULSATILLA

pratensis? spec PU

PUNICA

granatum fl. albo pl. 9

PYRETHRUM

uliginosum L

PYRUS

apetala N (edulis N (Cratægus Hort.

eleagrifolia? St. RANUNCULUS

arvensis Ch lanuginosus fl. pl. N

pedatus VL sceleratus

Thora? L

RESEDA canescens. K

RHEUM palmatum

RHUS

copallinum Ch. semialatum? Ch

RIBES

ant Carrop petræum

ROSA

Canada and Amai

- 18 -

(arvensis VL (repens Scop. balsamica Mihi 14) caryophyllacea Nobis
15) A.
hollandica major B

bris, petiolis pubescentibus cauleque remote aculeatis, aculeis compressis recurvis, foliolis subrotundo ellipticis, biserratis, subtus glanduloso scabris, fructu globoso. — Foliola odoris balsamici Malvæ fragrantis aut balsamicæ. Flores carnei Fructus globosi, calveis laciniis reflexis. Affinis quidquam R. rubiginosæ, at præter odorem, cal. tubi et pedunculorum glabritie, petiolis pubescentibus, foliolis majoribus aculeisque rarioribus minoribusque differt. E Podolia A. Ad ripas abruptas Tyrais prope Zalesczyki.

calycum laciniis pinnatis, petiolis pubescentibus, foliolis ellipticis subtus incanis et serraturis duplicatis glanduloso-scabris, aculeis infrastipularibus et petiolorum recurvis, basi compressis — Flores rosei parvi. Folia redolent Caryophyllos. Differt a R. rubiginosa foliorum forma, incanescentia paginæ inferioris foliolorum, odore, et pedunculis glabris. E frastetis elatis Cremenecii.

16) R. ealycis tubo elliptico basi altenuato glabro pedunculis calycisque laciniis pinnatis glanduloso hispidis, caule aculeato, aculeis raris subuncinatis, foliolis ellipticis inaqualiter serratis, subtus petiolisque pubescentibus - Affinis præprimis R. floribunda Stev. R. pigmene MB et R. pumilæ; differt vero prima a nostra habitat proceriore, aculeis fortibus compressis densis valde uncinatis, foliolis minoribus bisernatis "subtus glandulosis, calyoum laciniis brevionibus. R. pigmæa differt foliolis rotundioribus subtus glaucis biserratis, serraturis glandulosis, petidlis omnibus aculeatis; ultima vero distinguenda caule dense aculeato hispido, foliolis magis ovatis majoribus biserratis, serraturis glandulosis, pedun-Peulis aculeatis, ealycisque tubo majore. Flores explicatos nondum vidi-Cum R. balsamica legi. 17) R. calycis tubo elliptico gracili utrinque attenuato basi; laciniis, pedunculis petiolisque glanduloso hispidis, caule pruinoso petiolisque remote aculeatis, aculeis subteretibus subrectis, foliolis ellipticis acutis glabris subtus glaucis biscrratis, __ Flores solitarii medice magnitudinis, rubri. Proxima videtur R. pigmeæ M B Hiffert vero secundum descriptionem T.I. p. 307 n 978 aculeis fere rectis nunquam, nec in caule, nec in ramis deficientibus, calycis tubo basi tantum hispido et flore minore. A specimine sictorato R. pigmem taurico differt aculeis magis rectis, remotis, sine interjectis setis, foliolis and gustioribus, magis acutis, floribusque minoribus.

18) R. calycis tubo globoso pedunculis cauleque setoso (aculeatis, aculeis subulatis rectis subdeflexis, petiolis foliolisque 7-9 ellipticis serratis glabris. - Flores solitarii sat magni albi. Fructus atri, magnitudine pisi majoris. Supra saxis Cremenecii. Proxima R. spinosissima L. R. myriacanthæ Dec. et reversæ Kit. A prima differt aguleis minoribus, petiolis inermibus calycis tubo setoso aculcato et fructibus minimis, ab altera aculeis densioribus, foliolis attrinque lavibus (nec subtus glanduloso - scabris) serraturis simplicibus, calycumque tubo undique (nec solum basi) setoso aculeato; ab ultima denique aculeis for. tioribus magis inæqualibus, foliolis subtus glabris, serraturis simplicibus, flore albo, calveis tubo globoso aculeato - hispido, (nec solum basi hispido aut penitus glabro uti in culta vida).

19) R. calycis tubo subgloboso glabro pedunculis setosis petiolis canlegue aculeatis, aculeis com-

sinica Ait.? 20) PK

v tiosu A

uncinella mihi 21)

ROYENA

lucida §

RUBIA

cordifolia V

RUBUS

corylifolius cauc. St.;
RUDBECKIA
pinnata VL
RUELLIA
ovata L
RUMEX
acutus? St.

aquaticus and

M do monimum RU.

pressis aduncis, foliolis lucidis ovato-ellipticis, acutis biserratis glabris. — Flores solitarii sat parvi carnei. Fructus coccinei magni subrotundi sapidissimi. Affinis A. collinæ Jacq., a qua differt, glabritie et serraturis duplicatis. Ju frutctis et dumetis Cremenecii.

- 20) Secundum descriptionem per D. Du Mont de Courset în operc: Le Botaniste Cultivateur datam.
- 21) R. calycis tubo elliptico, laciniis subbipinnatifidis pedunculisque glabris, caulis aculeis fortibus recurvis, foliolis ellipticis aculeis sortibus recurvis, foliolis ellipticis aculeis soliservatis costa petiolisque pubescentibus. Differt a Rosa canina petiolis, aculeis magis aduncis, calycum laciniis maximis, caterum viridine læta foliorum et rubedine ramorum. Flores explicatos nondum vidi. Cum R. balsamica
 lecta.

		-	12/2
IS	Hilolius	OR LOS CO.	SCIL

RUSCU androgynus N SABAL LEV plaguing Adansoni &

SALVIA acetabulosa K. bicolor N. Santage compressa? K horminum Ch. N * lusitanica V

SAPONARIA, aurigulata; E ocymoides Je hirsuta V

rotundifolia E SEDUM Sternbergii Les of saxatile R

SCALIOSA amoena Vinies (telephium Dec. Pl. graminifolia K. V laxiflora, E. SEMPERVIVUM. montana Versender of tectorum Scopolii V arboreum varieg. G

SCHOLLIA SENECIO, (crassi olia lacq. Mn abrotanifolius E (Asclepias carnosa Hort. croaticus N

LA CHIA conta autumnalis. W.P. SCOLORENDRIUM officinarum ()

SCORPIURUS subvillosus VII.

SCORZON ERA calcitrapifolia Value stricta R villosa K

pomifera V. SCROPHULARIA

SATUREJA laciniata L juliana. Lab orientalis WP. SAXIFRAGA- trifoliata R

(telephium purpuraum

elegans

elegans fl. pl. albo G. rigidus V * verbenæfolius L SERISSA fætida VL - fl. pl. PK SERBATULA Jyrata E quinquefolia cauc. St. SESELI glaucum cauc. R spec. e Cauc. R spec. PU. tortuosum cauc. R - laur. Var? R SIDA (see of all supply lanceolata K triangularis L. VL SILENE alpina K corsica: R fimbriata (Cucub.) L obtusifolia E saponariæfolia V supina cauc. St villosa (Cucub.) R

volgensis K

CHIEV

SISYMBRIUM. affine E V amphibium aquaticum tenuifolium L strictissimum A* SOLANUM bombense V humile E memphiticum L SOLIDAGO altissima? VL. I rigida N SONCHUS acuminatus WP SPARRMANNIA africana WP SPARTIUM patens G radiatum K SPERGULA pentandra A (SPHONDY LIUM Hoffm. (Heracleum (branea Ursi Hoffm. A (H. Sphondylium SPERMACOCE ca pitata

capitata L hispida L. VL SPIB EA ulmaria varieg B STACHYS purpurea WP scordifolia V sibirica R STAPELIA grandiflora) replicata) roriflua) VL paniculata) variegata) STATICE spec. WP SYMPHYTUM bullatum K SYRINGA indica? N media? N persica fl. albo N * vulgaris rosea THALICTRUM concinnum E nigrum WP rugos on K ruthénicum E

triquetrum R TRAGOPOGON angustifolius K V TRIFOLIUM campestre repens fusco-maculatum (suaveolens W.Suppl. E. (formosum Say. Vaillantii L (TRINIA Hoffm. (Pimpinella (spec. (P. dioica rossica V TRITONIA crocata b. rosea) squalida) WP ___ B) VALERIANA alissima? PU VERBASCUM acuminatum V austriacum) blattaria lacin.) condensatum) V speciosum) virgatum) VERO.

VERONICA

amethystina E arguta D gentianoides B major fl. albo

hybrida? K
incana A*
*lævigata V
pulchella L
spicata L K
villosa? L
VICIA
sibirica VL

nigrum volubile R

VIOLA

(glauca MB 23)

(spec. Suppl. III (arenaria Dec.?

VITIS minutes museul A)

laciniosa PK

VOLCAMERIA

spec? G

WEDELIA

(ovatifolia L

(minor K

ZOEGEA

leptaurea K

Da

SYNO.

22) differt a V. canina calycis phyllis trinervibus, appendicibus brevissimis, obtusis, duobus lateralibus vix allis, capsula minoci, foliia magis cordato-ovatis acutioribus, petalis magis cuncatis cum calcari purpurascenti-pallide violaceis. Sæpius bis floret.

simillima quoad calycem et capsulam mi V.

canina podolica a V. canina vulgari

(22 milhor na NYMA.

Jarcostin Dec 2 1 16 C OCCUPATE (Alyssum calycinum Cat. (A. campestre MB *) et Schk. (Andropogon, argenteus Dec. (Erianthus saccharoides WEn. (Arenaria, graminifolia Schrad.

(A. filifolia var glabra MB *)

Smill linger

(A. procera Spr. (Arrhenatherum Palis. en out retaide Belv.

(Holcus avenaceus (Asperula humifusa Cat. thus.

(Galium procumbens H. A amor Erf.

Ernisholdes B run

(Bubon rigidus Spr. ***)

(Seseli dichotomum MB.

(Campanula spec. III. Suppl.

(C. glomerata - B farinosa

Rochel Fascic (Ceratochloa unioloides Dec.

(Festuca unioloides

(Cymbopogon schoenana thus Spr. **)

(Andropogon Schoenan-

and the same and the Public and the (Euphorbia

🐲) Plantarum minus cognitarum pugillus secundus. Halæ 1815.

^{*)} Has et plures alias notitias debeo singulari benevolentiæ Illmi a Consiliis status, Equitis I. B. Marschall a Bicberstein.

(Euphorbia angulata
Jacq *)
(E. macilența Hoffmanns.
(E. spec. T. Suppl. III.
(E tristis MB *)
(Fedia dasycarpa Stev.
(F. conica Lois.

(Festuca tenuiflora Schrad. (Triticum Nardus Dec. (T tenellum

(Gladiolus tenuis MB *) (G.,galiciensis

(Hedysarum paniculatum ***)

(H. abyssinicum (Heracleum tauricum H.

Tig
(If. pyrenaicum MB *)
(Hieracium bifurcum

1B *)

(H. collinum Prim, Fl. Gal.

(Koeleria phleoides Pers (Festuca cristata Schrad (Melilotus vulgaris W.

En.

(M. gigantea Rochel
(Mespilus, cotoneaster
(M eriocarpa Lam.
(M. coccinea Kit.
(M. prunifolia Duh.
(M lucida B
(Poa coarctata
(P. glaucanthos Garid. L
Pollinia gryllus Spr. **)
(Andropogon gryllus

Linn.
(Robinia tomentosa MB

(R. mollis MB Suppl. ined.

(Rosa

***) Dubito valdopere, an sit vera planta Linneana, qui ipsi tribuit folia lineari-lanceolata in spec. pl. Edit. II. Vindebon. (oblongolanceolata glabra Willd. Sp. pl.) quæ in nostra ovata, margine et ad costas pilosa.

(Rosa chinefisis Jacq. (R. semper florens Cat. (Rosa berighalensis (R. semperflorens Jacq. (R. semper florens pallida Cat. (Saccharum strictum Spr **) (Andropogon strictum Host. (Salvia sideritidis Vahl (S. hirsuta Jacq. ***) (Schultesia petræa Spr. (Chloris petræa Thunh. (Scutellaria lupulina L. (Sc. verna, Prim. Fl. Gal. (Sc. n. 52 t. 48 Gmel. Fl, Sibir *)

(Sc. altissima MB *) (Sc. peregrina (Semper vivum aizoides Lam

(Sedum aizoides Dec. Pl. gr. (V. hybrida MB *)

annualidat medanai / lik sana

(S. selinoides Suppl II (S. dubium Schk. (Selinum pratense Spr. Fl. Hal. (Senecio rigidus (S. ilicifolius L (S. longifolius P (Solanum mauritianum W. Supple (S. formosum Weinm. H. Dorp. (S. Thouini Schult. H. Land. (S. decurrens Balb. (S brancæfolium Jacq. (Thymus rotundifolius L

(Th. melissoides HG

(Trisetum paniceum

(Avena neglecta Savi

(Veronica orchidea

(Seseli venosum Hoffin

A cerementum plantarum debemus hoc anno Excell. Excell. Com. Com. Mniszek e Krzeszowice (Mn), Wodzicki Præfecto Cracoviensi. Illinis, Illmis Marechallo et Commissario Boreyko. Colonello Ratomski, Cl. Cl. V. V. De la Vigne M. D. Prof. Hist. Natur. Charkoviæ, Fischer M. D. Præfecto Horti bot. Gorenkensis, Reverendiss. Jundzitt Prof. Hist. Natur. Vilnæ et Weinmanno Hortulano Imperatorio Gatschinee. Plures rariores indigenas attulit indefessus D. Andrzejowski e Podolia et Ucrania ad fluvium Hypanim vulgo Boli crescentes (PU) et aliunde; quasdam intulit sedulus noster hortulanus Grabowski. Semina nobiscum communicavere Ill. a Consiliis Collegii et Eques Steven Præpositus Instituti oeconomico. botanici Sympheropoli, Cl. Cl. V. V. Bernhardi M. D. Prof. Bot. Erfordiæ, De la Vigne, Fischer. Jundzitt, Kitaibel M. D. Prof. Chemiæ et Bot. Pesthini, Ledebour M. D. Prof. Hist. Natur. Dorpati Livon, Rochel M. Ch. Rakovecziæ Hung.

Schott Hortulanus Universitatis Vindebon. Schul. tes M. D. Prof. Bot. et Therap. spec. Landishuti Boyorum et Weinmann.

51 D. Pest Hist. Mater. Combovine, Pisther 54 D.

dispusa attulit indefessor O. Suitestook) I o Fuconsolies (200) State of Signature Setdalus nostes, hortelaine Grahemati. Bendus nohistoric communicações D.A. a Consillis Collegii et Eques Servas Propositas Justitude accomunicata bosaniel Symplicaçuali, C.L. Cl. V. V. Paradardi M. in Prof. Bat. Edicidia, Lie I. Vigin, Prochardi Jandarit, Assault II. D. Frot Chamin, et Bot, L'Alimi, Market M. D. Frot Chamin, et Bot, part Elson, Rochel M. Ch. Balcoverse Hungpart Elson, Rochel M. Ch. Balcoverse Hung-

Scrip. Cremeneci ipsis Kal. Decembris 1815

W. Besser M. D.

Prof. Zoolog. et Botan.

CATALOGUS

PLANTARUM

ARTHUR Contract to the investment of the LARE HA

Horto botanico

GYMNASII VOLHYNIENSIS

CREMENECI

cultarum.

CREMENECI.
MDCCCXVI.

Mandato Censuræ in Universitate IMPERATOL RIA Vilnensi, permittitur impressio. Cremeneci die 9. Novembris. An. 1816.

Michaël Ściborski Director Gymnasii et Censor. Defectus speciminum Catalogi plantarum horti nostri Anno MDCCCXI editi et frequens ejus expetitio præcipua est causa novae hujus editionis. Quantum circumstantiæ variæ favere, præcedente et supplementis ad illum est correctior, atque hujus anni auctus acquisitionibus. Ea solum cum mutatione prodit in lucem, quod cuilibet generi auctorem, cuilibet speciei inventorem, qui mihi innotuere, addiderim. Continet simul enumerationem plurimarum plantarum in Guberniis Volhyniensi, Podoliensi, Krioviensi sponte crescentium hucusque collectarum, quas aut in horto colimus, aut quarum semina vel specimina exsiccata promutua communicatione conservamus.

Specimina viva plantarum hujus anni decursu siugulari benevolentia largiti sunt Exc. Exc Com. Com. Branicka, Barbara Czacka, Razumowski Minister Instructionis publicae, Wodzicki Præses Senatus Cracoviensis. Illmi. Illmi. Marescallus et Commissarius Boreyko, Colonellus Ratomski, Commissarius Isydorus Sobański. Præpositus Imper. Instituti botanico-oeconomici Nikitensis Tauriæ, Collegii a Consiliis Eques Steven, Cl. Cl. V. V. Reverendissimus

DUDIE

Simus Jundzill Prof. Zoolog. et Botan. Vilnæ, Oesterreicher M. D. Prof Hist. Natur. Cracoviæ, Schott. Hortulanus Univers. Vindebonæ, Weinmann Hortulanus Imperatorius Pawłovscii alique Plures plantas intulit horto sedulus noster hortulanus Grabowski.

Singulari cum servore, studio Botanices deditus Antonius Anarzejowski sexaginta circiter species et plurium adhuc semina attulit exitinere per Podoliam et Ucrainiam sumptu liberalissimocum Itlin. Illm. Com Commissarii Philippi Plater et Venceslai Rzewuski suscepto.

Semina plantarum suppeditavere Illmi Illmi. Status a Consiliis Eques L. B. Marschall a Bieberstein, Colleg. a Consil. Eques Stepen Cl. Cl. V. V. Bernhardi M. D. Prof. Botan. Erfordiæ, De la Vigne Prof. Hist. Natur. Charkoviæ, Fischer M. D. Director horti bot. Gorenlensis, Oestereicher, Rochel M. Ch. Rakovecciæ in Hungaria, Schott, Schultes M. D. Prof. Therapiæ specialis et Botan. Landishuti Boyorum, Sprengel M. D. Prof. Bot. Halæ Saxonum, Thouin Præfectus borti plantarum Parisiis, quæ AUGUSTISSIMA IMPERATRIX MARIA THE. ODORIDA singulari elementia nobis transmittere dignata est, Weinmann et alii plures, quorum nomina grato hie repetimus anima

atque

atque rogamus, ut semina aut plantas a nobis exquirere, aliasque nobiscum communicare velint.

Scripsi Cremeneci Kalendis Novembris v. st. MDCCCXVI.

rate bedraine o note.

An Lower Sones

Wilibaldus Besser, M. D.

Prof. Zoolog. et Botan.

(1) (1) (1) (1)

mount out on the land

position and more included the state person to

adden a remain de de de de la constant de de la constant de de la constant de de la constant de

ti singili in representation est du liptorità di la constitue del la const

remain to the Pales of Sections, while

incl. to the extended Will helders Merch McD.

of the following the first property of the stay of the

the state of the s

and the state of t

Library to the supplied compensation of the latest

particle coming grain his repetions, mining

(ACACIA W.

(Mimosa L.
cornigera L.
elegans ?
falcata W.

* farnesiana L.

* glauca L.

(Guel ebruschim *) (Julibrissin Scop.

lebbek L. lophantha Vent. mollissima W?

paradoxa.

Spec?
ACÆNA Mut.
sanguisorba L.
ACALYPHA.

 brachystachys Horn. diversifolia Jacq. hispida W.

* rubra W.

* virginica L.

ACANTHUS L.
mollis L.
spinosus L.
ACER L.
austriacum Tratt.
campestre L.
dasycarpum Ehrh?
heterophyllum W.
monspessulanum L.
negundo L.
pensylvanicum L.
(platanoides L.
(striatum Lam.

* pseudoplatanus L?
fol. variegatis.
saccharinum L.
* tataricum L.

tataricum L.
(ACHANIA W.
Hibiscus L.
malvaviscus L.
ACHILLEA L.

ageratum L.

^{*)} Hoc sub nomine testante cel Fichero Dir. h. botan. Gorenk. hæc Acaciæ species in Persia est nota, quod florem sericeum significat.

* alpina L.

* anthemoides W?

* asplenifolia Vent,

* bannatica K.

bipinnata.
 compacta W.
 coronopifolia W.

* crassifolia.

* cristata Retz?

crithmifolia W K.

* decolorans Schraddecumbens Lum.

* distans W K. dracunculoides H P.

* eupatoria MB.

* filicifolia MB.

Gerberi W.

grandiflora MB, heterophylla.

* impatiens L.

* Janata Spr.

* lutescens.

* magna L.

major e Dehuria.

major e

micrantha W.

经自公司经验证证证

* millefolium.

__ fl. rubris.

* montana ?

* nobilis L A.

* ochroleuoa Ehrh?

* odorata L.

paradoxa?

* pectinata W.A. ptarmica L.

— fl. pl,

pubescens L? A.
salicifolia mihi *)

* santoling L.

* Schkuhrii.

serrala Retz.

* setacea W et K.

* speciosa Spr.

tanacetifolia All

Thomasiana? tomentosa L.

ACHYBANTHES.

* aspera L.

* axillaris Brouss.

^{*)} Confer Suppl. I. p. 3.

javanica L.

lanata L.

lappacea L.

patula I..

prostrata L.
spec, e Sem. amer.
ACMELLA Pers.
(buphthalmoides W.

Aconitum.

anthora A.

* cammarum L?

* lycoctonum L
neomontanum Koelle *
pyrenaicum L.

* septentrionale Koelle A

* tauricum Wolf.

* uncinatum ? variegatum Hort.

* vulgare Trait.
ACORUS L.
calamus L.
ACTÆA L.

adel montas

* spicata Li

(ACYNOS Moench. (Thymus L. alpinus L. patavinus HK. rotundifolius. vulgaris Li ADJANTUM L. capillus Veneris L. ADONIS L. autumnalis L. miniata Jacq. A. vernalis L. ADOXA L. moschatellina L. AEGILOPS. cylindrica W et Ka ovata L. squarrosa L. triaristata W. AEGOPODIUM L. podagrarium L. ESCHYNOMENE L. aspera W. ÆSCULUS L. alba?

opening he

flava HK.
hippocastanum L.
macrostachya Mich.
ÆFHUSA. L.
bunius L.

* cynapioides MB.

* cynapium L.

* elata Friedl.

AGAPAN THUS I' Her.

* umbellatus l'Her.

— fl. albo?

AGAVE L.

americana L.

— fol. margin.

lurida HK.

AGERATUM: L.

* conyzoides L.

* latifolium
'AGRIMONIA L.
americana?
euputorium L.

* odorata L.
repens L.
AGROSTEMMA L.

* coeli rosa.

— fl. albò — fl. pleno.

AGROSTIS L.

alba L.
cinna VV.

* decumbens Hall. f.

* diandra Retz.

d ffasa Host.

dubia.

flavesčenš.

hispida.

* mexicana L.

* obliqua.

retrofracta W. spica venti L. stolonifera Sm.

sylvatica Host.

verticillata Vill?

pulgaris Sm.

AILANTHUS Desf.

glandulosa Desf. AIRA.

aquatica L. articulata Desf.

canescens L D. Friedl. * _ fl. pl vario. caryophyllea L. cæspitosa L. glabra ? gracilis?

juncea Lois,

semineutra Wet K seminuda.

AJUGA L.

chamepitys L. genevensis L.

pyramidalis HP, replans L. ALZOON L.

* canariense L.

* hispanicum L, ALBUCA L. erecta? longifolia Dr? *)

* major L. ALCEA L. ficifolia L.

pallida W. et K. _ fl. pl,

rosea L.

ALCHEMILLA algina L. montana W. sulgaris L. ALISMA L. plantago L. ALLIUM L. acuminatum. acutum Spr. albidum H.Gor.

arenarium L.

* ampeloprasum L A.

angulosum Aut. ascalonicum L.

* atropurpureum WetK

baicalense W. bulbosum.

carinatum L,

carneum L.

cepa L.

_ bulbo alho cernuum Roth? ciliatum Jacq.

controver um Schrad,

Confer Suppl. III. p. 1. A. spec.

danubiale.

descendens L.

- rigidum K.

* fistulosum L

altaicum Pall.

* flavum L.

-- tuuricum.

* fragrans Vent.

fuscum K.

glaucum Schrad.

(spirale W.

* globosum * guitatam Stev. globosum MB.

* illyricum. inodorum.

lineare L. moly L. moschatum MB.

2/2 narcissifolium?

2/4 neapolitanum?

3,5 nigrum L.

* nutans L .

215 obliquum L.

2/4 ochroleucum Wet K.

3,5 odorum L.

oler accum L.

paniculatum L.A. porrum L. purpureum.

roseum.

rotundum Pall A.

rubens Schrad. rupestre St.

sativum L.

Schoenoprasum L, scorodoprasum L.

seuescens L.

sibiricum HK.

sphærocephalum L. 2 spec. e Pod! A.

striatum Jacq

strictum Schrad.

suaveolens Jacq.

ursinum L.

* pineale L. violaceum W.

volhymeum mibi *).

(ALNUS T.

(Betula L.

glutinosa L (B Alnus)

incana L.

ALOE L.

^{*)} Confer Suppl. III. p. 2.

arachnoides Th. arborescens Dec. atrovirens Dec. brevifolia Dec? cymbifolia B M. humilis Th. linguæformis L. — a. latifolia.

andalicum-noits of)

margaritifera 'L. - a. major. -b. minor. mitræformis Lam.

picta Th. pluatilis L.

* radula larg. retusa L. serra Dec. light L.

- b. minor foll sparsis. armabina L. Succotmina Lain. * hirsuta L.

variegata L. verrucosa? viscosa Dec. vulgaris Dec. ALOPECURUS L.

& officinatis L A.

* agrestis L. geniculatus L. r pratensis L.

b. verrucosa Dec. * ruthenicus HD.

(ALOYSIA Ort. (Verbena L. (citriodora Ort. (V. tryphylla E.

ALPINIA L. cal arataBR (Amomum) (Globba recta Dec 11.L.1. nulans L Globba)

rigida Dec. ALSTROEMERIA L.

* spec *) * pelegrina L. spiralis Th. ALFHÆA L.

trigona Schott ? ** norbonensis Cav. ephysical semioibus, or com

^{*)} Confer Catal. 1811. p. 11; not. 3 **) Confer Cat. 1811. p. 11. not. 2.

* officinalis L A.
ALYSSUM.
alpestre L.

* argenteum A11? A.

* cumpestre Schk *)

* gemone isc Jacq.

* hirsutum MB

* incanum L.

* linifolium Steph.

* m ritimum L.

* mi ropetalum H Gor.
i ericum,

* minimum L.

* montanum L.

* murale Wetk A.

* - aff ne A.

*(podolicum nobis **)
(a spec. Suppl. III.p. 2
* saxatile ***) A P 2
* spec. e Tauria. St.
* tortuosum W et K.
* verm le H Erl.
AMARANTHUS.
æpeus.
albus L.
angustifolius MB.
aureus.
bicolor Nocca.
bl. tum L.
canariensis.

caracam

cararia.

* Confer Suppl. IV. p. 26.

**) A. canescens, cæ pitosum, cauliculis erectis simplicibus, foliis dentatis; in erioribus
subcuncatis, oblongisque obtusis, caulinis ovatis
semiamplexicaulitus, siliculis ellipticis convexiusculis. Nobis—Cauliculi rarius ramulo instructi sunt. Proximum A. hyperborco, moneme cel. Sprengelio, a quo tamen forma silicularum et seminibus, nec marginatis, specifice est distincta

****) Confer Suppl. III. p. 2.

caudatus L. thlorostachys. W. clavatus ruber: - viridis. crocatus. cruentus L. deflexus L. dubius. esculentus. flavus L. gangeticus L. giganteus. (gracilis HP. (Chenopodium caudatum Jacq. *) grædizans L. hybridus L. - b. hecticus W. hyphochondriacus L. hypochondrylloides. inamoenus W. incomptus W. lætus W. litoralis Host.

本)

p. 2

P 2

t.

IS

is

.

lividus L. lucidus. lusitanicus. melancholicus L. obstipans. oleraceus L. olitorius. paniculatus La parisiensis. persicarioides. polygamus L. polygonoides L. potystachyus W. prostratus Bilb. retroflexus L. rigidus. rotundatus. sanguineus L. - niger. spinosus L. spictus W. spicatus Lam. tricolor L. tristis L.

^{*)} Confer Catal 1811. p. 32. Utriculi non sunt circumscissi. Semen omnino Amaranthi.

ye.

viridis L.

AMARYLLIS L.

aurea l' Her.

Belladonna L.

curvifolia Jacq.

formosissima L.

hæmanthoides.

longifolia L.

purpurea.

Reginæ L.

sarnien is L.

b. capensis Jacq.

spec.

undulata L.

* vittata l' Her.

AMBROSIA L.

peruviana W.

AMETHYSTEA L.

*(corymbosa Pers. (A. cærulea L. AMMANNIA L.

agyptiaca W.

* auriculata W.

* diffusa W.

* indica Lam.

* sanguinolenta Swa AMWI L.

majus L.
AMORPHA L.

fruticosa L.
AMYGDALUS L.

communis L.

* nana La persica L. pumila L. fl pl. spec *;

ANACYCLUS L.

* bicolor Desf.

* divaricatus.

valentinus L.
ANAGALLIS.

cærulea Schr.

.* latifolia L.

Monelli L.

* phoenicea L.

rosea.

ovalis?

ANAGYRIS L.

foetida L.

ANARRHINUM Dest

^{*)} Confer Catal. 1811. p. 13, not. 14

bellidifolium L. ANCHUSA MB.

angustifolia L. ANDROPOGO arvensis L(Lycopsis)*(argenteus Dec.

Barrelieri All. D.
Miechowicz.

* italica Retz.

* lutea Lam.(Lycopsis)

* Milleri Lam.

* lycopsoides.

ochroleuca MB A.

— fl. cærulescente A*

* officinalis L.

_ fl. ochroleuco.

* — fl. roseo.

pulla L (Lycopsis)

procera nobis *)

sempervirens L.

tinctoria L.

* undulata Loefl.

* versicolor Stev.

* zaylanica V.
ANDRACHNE L.

* telephioides L.

ANDROMEDA L.
polifolia L.
ANDROPOGON L.

(Erianthus saccharoides W.

contortus L.

* hirtus L.

ischæmum LA.

laguroides.

ANDROSACE L.

elongata LA.

*(lactiflora H Gor. (alismoides Horn.

* maxima L.

micrantha.

* septentrionalis L.
ANEMONE L.
coronaria L fl. pl.
hortensis L fl. pl.

narcissiflora L.
nemorosa L.
ochotensis HGor.

ranunculoides L.

G

^{*)} Confer Anch. spec. Suppl. III. p. 3.

* sylvestris L.

* virginica L.

- minor.

spec. e Sibiria.
ANETHUM Hoffm

flavescens B(Imperatoria)

* - uralensis.

lucida L.

palustris B (Imperatoria *)

pratensis MB. Razoulii Gouan.

sylvestris L.

verticillata I.

ANNONA L. triloba L.

ANTHEMIS L.

altissima L. arvensis L.

* australis, W.?

* austriaca Jacq.

« caucasica.

* chamomilla W.

* coronopifolia W.

cota L.

cotula L. fruticulosa MB.

* fuscata Brot.

genevensis? maritima L.

mixta. L.

montana L.

*(parthemoides. (Matricaria mandiana HP

* pubescens W.

rigescens W.

* saxatilis W et K.
spec e Kuban St.
tinctoria L.

- ciperascens Pers.

* Triumfetti.

(ANTHERICUM L.

^{*)} Species hæc, cui proxima est A. pratensis MB. bene monente Illm. a Cons. Stat. L. B. Marschall a Bieberstein, generice separanda est, ob calycem manifeste quinquedentatum, sat magnum persistentem.

(Phalangium T. liliago LA.

(liliastrum L.

*(Hemerocallis W. En.

ramosum, L. ANTHOLYZA. æthyopica L. grandiflora? ANTHOXAN-THUM L.

amarum Brot.

odoratum L.

ANTHRISCUS Hoffm cerefolium L(Scandix) nemorosa MB. (Chærophyllum)

nodosa L (Scandix) sylvestris L (Chæro * dichotoma. phyllum)

- a. humilis nobis *;

- b. elata nobis.

* vulgaris Pers(Scandix) Anthriscus L.

ANTHYLLIS.

barba Jovis L.

cornicina L.

Hermannie V.

polyphylla.

Tourneforti.

tetraphylla L.

vulneraria L.

(ANTERRHINUM L.

Oronium Pers,

majus L.

- fl. albo

molle.

orontium L.

intermedium.

siculum Ucr.

ANY CHIA Mich.

(Queria canadensis L.

APIUM L.

graveolens L.

APOCYNUM T.

androsæmifolium L.

^{*)} Confer. Suppl. IV. p. 3.

AQUILEGIA L. atropurpurea W.

bicolor Ehrh.

* canadensis L.

* grandiflora.
glandulosa H Gor?

* viridiflora Pall.

viscosa Gouan.

vulgaris L.

— fl. plen.
— stellata.
ARABIS. L.
albida Stev.

alpina L.

arenosa L (Sisymbrium)*

bellidifolia L.

conferta.

crispata W.

flexuosa.

Halleri L.

hirsuta L.

incana Roth.

lucida L.

multicaulis Bell.

pendula L

procurrens W et K.

recta Vill. saxatilis All.

stricta Huds.

thaliana L.

ARALIA L.

racemosa L.

ARBUTUS L.

unedo L.

upa ursi D Friedl.

(ARCHANGELICA (Hoffm.

(Angelica L.

atropurpurea Mill.

saliva L. (A. archangelica)

ARCTIUM.

majus Ehrh (A.Lap-

pa L.)

minus Ehrh.

tomentosum Schk (A. Bardana L)

ARCTOTHECA Wend! repens Jacq (Arctotis).

ARCTOTIS.

aspera L.

hypochondriaca L.

rosea?

* spec *)
ARENARIA.
balearica l' Her.

a cæspitosa Ehrh.

* fasciculata.

* graminifoliaSchrad.A (fil:folia MB. var. glabra

* heteromalla Pers.

* laricifolia L.

* macrocarpa W et K.

* marginata.

* marina Roth.

* _ b media L.

* mediterranea.

* serpyllifolia L.

* tenuifolia L.

* triflora L.

* trinervia L.
ARGEMONE L.

* mexicana L.

ARISTOLOCHIA L.

clematitis L A.

*) Confer Catal. 1811. . 16.

Frutex bipedalis.

rotunda L
sempervirens L.

sipho l' Her.

ARMENIACA L.

(communis.

(Prunos armeniaca L.

(ARMERIA W.

(Statice L.

alpina. Hoppe.

denticulata Lois.

fasciculata Vent

atifolia W.

* plantaginea W.

* scorsoneræfolia W.
vulgaris W.
spec *)

ARNOSERIS Gærtn

pusilla L. ARONIA Pers.

botryapium L Pyrus)

racemosa Lam.

rotundifolia Pers (Me-

spilus Amelan-

chier L?

(ARRHENATHERUM

(Palis.

(Avena L.

apenaceum L.

bulbosum Schrad.

ARTEMISIA L.

abrotanum L.

absinthium L.

anethifolia H Gor.

(non W.)

annua L.

arborescens L.

* austriaca *) Jacq.

* biennis L. campestris E.

caucasica W. desertorum Spr. dracunculus L. elegans H Gor. glauca Pall. herbacea Ehrh. (inodora MB. (lednicensis Spr? integrifolia H Gor. laciniata L. maritima L. monogyna W et K. * neglecta Spr. nutans W. (paniculata Lam A. **) (procera W.

* pontica L. saxatilis W et K.

scoparia W et K. * Sieversiana Ehrh. tanacetifolia L. vulgaris I. -mongolica HGor. ARUM L divaricatum L. dracunculus L. maculatum L. (tenuifolium L. (gramineum Lam. ARUNDO L. effusa Gmel. epigeios L. Langsdorfii H. Gor. phragmites L sylvatica Schrad. ASARUM L. europeum L. ASCLEPIAS E.

* angustifolia W.

* curassavica L.

* fruticosa L.

* fuscata W.

* incarnata L.

linaria Cav.

* · nivea L.

parviflora H. K. syriaca L.

tuberosa L.

ASPARAGUS L.

decumbens Jacq.. off cinalis L.

orientalis MB.

retrofractus L.

sylvaticus W et K.

verticillatus L.

ASPERUGO L.

procumbens L.

ASPERULA L. -aparine MB.

-aparine MD.

arvensis L.

* cynanchica L.

(galioides MB. (excl.

*(Syn. Jacq.)

(Galium glaucum L.

(glauca mihi. *)

* (G. glaucum Jacq.

* humifusa M B: Ga-

lævigata L.

^{*)} Confer Suppl. III. p. 4.

10

montona W et K. odorata L. supina MB A.

* tinctoria L. ASPHODELUS L. albus W. fistulosus L.

* luteus L.

* ramosus L.

* taurious MB. (ASPIDIUM Sw. (Polypodium L. cristatum L. filix mas L. filix foemina L. fragile L. oreopteris Sw? ASPLENIUM L. ruta muraria L. septentrionale L. (A. crostichum) trichomanoides L. ASTER. aculeatus Labill.

adulterinus W.

amygdalinus Lam. amellus L. amelloides nobis *) A. annuus L.

bellidiflorus? bicolor? biennis Ledeb.

chinensis.

__ fl. pl. - rad. abbreviato. concinnus W. concolor W.

cordifolius L. corymbosus HK. corymbiferus H Gor. dracunculoides W. dumosus L. ericoides L. floribundus W. foliosus H K. giganteus? hyssopifolius L. junceus HK.

laxus W.

levis HK.

^{*)} Confer Aster spec. Suppl. III. p. 5.

linifolius L. macrophyllus L. multiflorus HK? mutabilis L. novae Angliæ L. paniculatus HK. punctatus W et K. purpureus? salicifolius HK? salignus W. sibiricus L. simplex W. spectabilis HK. tardiflorus L. tenuifolius HK. tenellus L Tradescanti L. vernus L.

vimineus Lam? ASTRAGALUS L (adsurgens Pall. (Laxmanni Jacq. (semibilocularis Dec. aduncus W. alpinus W.

alopecuroides W.

arnacantha MB.

asper Jacq.

austriacus L.

baeticus L.

: buceras W.

:: cicer L.

clandestinus.

: contortuplicatus L.

10 cymbiforinis Brot. disyanthus Pall A.

depressus L.

epiglottis L. exscapus L. falcatus Pall ibericus. galegiformis L.

glaux L.

glycyphyllos L.

hamosus L. lagopodioides Lam?

4 leucophæus Sm. melilotoides Pall.

: monspessulanus L. D. Friedl. A. onobrychis I. - latifolia.

penta lottis L.

physodes L. ponticus Pall. reptans H et B.

* scorpioides Pour. sesamens L. spec. e Dahur.

2. spec. Odessanæ.

* sulcatus L. tragacantha L.

* trimestris L.

* uliginosus L. ___ var ?

* utriger Pall.

*(virescens H K. (isetensis Hort.

* pirgatus Pall A. ASTRANTIA L.

* major L. ATHAMANTA L.

alata MB. condensata L.

* flexuosa Dec?

" libanotis L. _ var? A. major Hoffm.

* Matthioli Jacq.

"(rigida H Gor.

(Bubon buchthormensis Spr. sibirica L.

- tauricensis. ATRAGENE L.

alpina L.

(balearica Lam.

(Clematis cal) cina HK. cirrhosa L. (Clematis) florida Th. fl pl. ATRAPHAXIS L. undulata L.

ATRIPLEX L. acuminata W et L.

3,5 angustifolia Sm.

3,5 bengalensis UO. halimus L.

hastata L hortensis L.

laciniata E.

litoralis L.

microsperma Wet K. patula?

(rosea L.

*(albicans B.

sibirica L?

sulcata ?

* tatarica L.

* veneta W.

* virgata HP.
ATROPA L.

ATROPA L. belladonna L.

contorta H M.
AUCUBA Th.

japonica Th.

AVENA L.

barbata Roth.

brevis Roth.

fatua L. A.

flavescens L.

orientalis Schr.

pensylvanica L præcox
planiculmis Schrad.
pratensis L A.
pubescens L.
sativa L. alba anglica

— georgiana

- podolica.

— præcox.

— — sibirica.

__ nigra anglica.

_ _ georgiana.

- nuda L.

sempervirens Host

sterilis L.

strigosa L.

AXYRIS L.

amaranthoides L.

AYENIA L.

pusilla L.

AZALEA L.

pontica L.

(AZIMA Lam.

(Monetia l' Her.

(tetracantha Lam.

(M. barlerioides l' Her BABIANA Gawl.

geranioides.

globosa.

superha.

villosa BM. nigro-

cyanea

BACCHARIS L.

Dioscoridis W.

halimifolia L.

ivoefolia L.

BALBISIA W.

elongata W.

BALLOTA L.

fætida Bernh.

lanata Pall.

nigra L. BALSAMITA W. suaveolens W. BALTIMORA L. recta L. BAMBOS Schr. arundinacea W. BASELLA L. alba L. cordifolia Lam. rubra L. BECKMANNIA Host. * erucæformis L.(Pha laris) A. BECONIA L. dichotoma Jacq. discolor, HK.

BELEMCANDA
Rheede.

(pardanthus Dec.
(Moræa chinensis W.
BELLIS L.
annua L.
perennis L.
— fl. pl. albo

picta.

- fl. pl. rubro - fl. pl. prolif ro. - radio tubuloso BERBERIS L. sibirica Pall. pulgaris L. BERCKHEYA Schr. incana Th. BERRIA. ammomilla. BETA L. trigyna W et K. vulgaris L. BETONICA L. hirsuta L. officinalis L. orientalis L. BETULA L. alba L. fruticosa Pall. lenta L. pubescens Ehrh. BIDENS L. bipinnata L. bullata L. cernua L. frondosa L.

leucantha L.
pilosa L.
parviflora W.
tripartita L.
BIGNOMIA L.
capreolata L.
catalpa L.
radicans L.
BISCUTELLA.

- * apula L.
- auriculata L.
- * depressa W.
- * didyma W.
- * lævigata L.
- * pumila.
- * raphanifolia Poir.
 BISERRULA L.
- * pelecinus L.
 BLITUM L.
 capitatum L.
 purgatum L.
- * tataricum.

 BOERHAAVIA L.

 erecta L.

 excel·a W.

 hirsuta L.

scandens L.

BOLTONIA 1' Her. glastifolia 1' Her., BOMBAX L pentandrum L. BORAGO.

- * africana L. laxiflora Dec.
- * officinalis L.
 BOSEA L.
 Yerva mora L.
 BOTRYCHIUM Sw.
 lunaria L (Osmunda)
 BRACHYSTEM UM
 Mich.
- * lanceolatum W.
 BRASSICA L.
- arvensis L.
- campestris L.
- cheiranthus VM.
- * chinensis L.
- * elongata W et K.
- * eruca L.
- * erucastrum L. fruticulosa W?
- napus 1.
- * oleracea L.
- * _ botrytis.

* _ capitata.

* __ rubra.

* _ gongylodes.

* _ laciniala.

__ lucida.

* - napobrassica.

* _ sabauda.

– viridis longifolia

* orientatis L.

polymorpha Ehrh.

* præcox.

* rapa L.

* subhasiata W. BRIZA L.

* maxima L.

* media L.

* minor L.
BROMELIA L.
anapas L.
Karatas L.
lucida W.
BROMUS L.

* agrestis Host.

* angustifolius MB.

* asper HK.

* commutatus Schrad.

glaucus HGor.

lanceolatus Roth.

laxus W.

ligusticus All.

* longiflorus W.

* madritensis L.

* mollis L.

multiflorus Sm?

pendulinus Horn.

purgans Kalm.

secalinus L.

* squarrosus MB. A.

* sterilis L.

* tectorum L.

verticillatus Cav.

villosus:

BROUSSENETIA.

papyrifera L. (Morus)
BBOWALLIA.

demissa L.

* elata L.

BRUGMANSIA Pers
suaveolens W(Datura)

BRYONIA L.

alba L. dissecta Th. BUBON L. macedonicus L. (rigidus' Spr. (Seseli dichotomum (MB BUDDLEIA L. globosa Lam, salicifolia Jacq. salviæfolia HK. BUFFONIA L. perennis Lam. "(tenuifolia L. annua Lam. (BULBINE W. (Anthericum L. annua L. * frutescens L. #: pendula Horn. BULBOCODIUM vernum L. BUNIAS L. aegyptiaca L. aspera Retz. erucago L. orientalis L.

2:

BUNIUM T. bulbocastanum L. BUPHTHALMUM * aquaticum L. (cordifolium W et K. (speciosum Schr. frutescens L. grandiflorum L. maritimum L. salicifolium L. spinosum L. BUPLEURUM L. * rotundifolim L. BUTOMUS L. umbellatus L. BUXUS L. balearica Lam. sempervirens L. __ fol. auromargin. CACALIA L. anteuphorbia L. (articulata Li (laciniala Jacq. ficoides I. Kleinia L. repens L. sagittata V.

suaveolens L. CACHRYS L. litoralis Spr. taurica W. CACTUS L. alalus Sw. curassavicus L. cylindricus Lam. ficus indica L. flogelliformis L. glomeratus Lam. grandiflorus L. maminillaris L. - prolifera. opuntia L. pendulus Sw. pereskia L peruvianus L. repandus L. spec *) speciosus W spinosissimus tetragonus L. triangularis L. tuna L.

CAKILE Gærtn. maritima Scop. (CALADIUM Vent. (Arun L. auritum L. bicolor HK. esculentum W. sagittæ olium L. seguinum L. CALANCH DE Adans. crenita B R. Verea) CALDASIA Het B. (heterophylla H et B. (Bonplan tia geminiflo-(ra Cav. CALE DULA. arrensis L. aczyptiaca HP. denticulata Schousb. hybrida L. officinalis L.

__ fl. pl.

__ prolifera.

pluvialis L.

sicula. Jacq.

*

^{*)} Confes Suppl. IV. p. 5.

suffruticosa V. CALLA E. æthyopica L. palustris L. CALLICARPA E. americana L. (lanata V. (tomentosa L.

CALLISACE H Gor.

dahurica H Gor. (CALLUNA Salisb.

(Erica L.

(scopuria Salis.

(vulgaris L. CALTHA L.

pulustris L.

- fl pl.

CALYCANTHUS L* bybrida L.

floridus L.

(CAMELINA Vent.

(Alyssum W.

austriaca L. A.

dentata W.

& setipa L.

CAMELLIA Th. japonica Th.

CAMPANULA.

(alli riæfolis W.

peudula M8.

americana L.

barbata L.

bononiens & L.

carpatica Ja q.

* ceruna Th ?

ce vicaria L.

(cochlearifolia Lam.

(fragilis Cyr.

divergens W K.

firingsa Rochel.

glomer to L.

lamifolia MB.

lactiflora MB.

* lat files LA.

lil folia L.

_ stylosa Lam *)

*) C. stylosa vix specifice a C. lilifolia distincta. Floret saltem duabus septimanis prius Flores

* lingulata W et K.

Lychnitis Horn.

* medium L.
(neglecta mihi *)
(ucranica mihi.
* nutans W et K.

mutans vy eur

* pannonica.

patula L.

* peregrina L.

* perfoliata L.

* persicaefolia L.

— fl. pl. alho.

- fl. pl. cœruleo.

petræa, All, pulla Jacq.

pyramidalis I.

rapunculoides L.

-major.

repunculus I4.

rhomboides, L?

reniformis Pers.

Flores sunt quidquam minores. Calycis lacinize germine minus, sulcato breviores (quæ genmen æquant, aut superant, in altera). Folia inferiora petiolata; superiora basi angustata. Forma cæterum non differunt.

*) Nomen specificum muto; nam nan est U-cranize incola, uti putavi (Confer Suppl. II. p.6) sed provenit ex, horto Gorenkensi, quorsum uti cel. Fischer suspicatur, e Beschtau allata fuerat. Diagnosin sequentem propono: C. foliis cordato ovatis (scabris), caule ramoso superne calycumque laciniis patenti-inflexis glabris, floribus subsecundis sparsis. Perennis. Floret Junio. Julio. In C. rapunculoida, cui proxima, caulis superus calycisque lacinize revolutas scabras.

* ruthenica MB A.

* sibirica Jacq.

__ fl. roseo.

* spathulata W'et K. speciosa Horn. sibirica

speculum L.
thyrsoidea L.

* trachelioides MB.

* trachetium L.

— fl. plefi.

urticæfolia Schm.

(coccinea HK *)

rubra W. (crocea HM:

(lutea HK?

glauca L.

*(indica L.

(variabilis W.

patens HK.

(chinensis W.
CANNABIS L.
sativa L.
CAPPARIS L.
spinosa L.
CAPRARIA L.

biflora L.

CAPSELLA Vent.
bursa pastoris L(Thla-

spi)

CAPSICUM L.

annuum L.

- erectum Bernh.

* baccatum L.

* cærulescens Mik. **)
cerasiforme L.

* — macrocarpum ***)

* fr. luteo.

* — fr. miniato.

* frutescens L.

_ torulosum HV. 4)

^{*)} Confer C. variabilis var? coccineam Catal. A. 1811. p. 26. Corolla plerumque 5 partita, rarius 6 partita.

^{***)} Confer Catal. 1811. p. 17. n. 6.

^{***)} Confer Catal s. c. n. 1.

^{4*)} Confer Catal. s. c. n. 2.

w _ fr luteo.

CARDIOSPERMUM L.

- pendolum W *;

grossum L.

_ globesum **) _ luteum ***) sphæricum W.

(Tourneforti nobis 4*) (grossum fr. vifilo (Tournef.

... pomiferum.

To violaceum V. (nigrum W.

CARDAMINE L. amara L.

hirsuta L. impatiens L.

* italica.

prutensis L.

halicacabo n L.

- fr. minori.

CARDUUS L.

acunthoides L.

alpestris Wet K. arctioides W.

candinans Wet K? carlinæfolius V.

* collinus. cr spus L.

defloratus L.

hamulosus W et K, A nigrescens Vill. nutans L.

orientalis Ad.

pycnocephalus L.

CAREX L.

^{*)} Capsicum hoc varians fractibus luteis et miniaiis, hisce sæpius cerauis, imo erectis transit in C. torulosum, quod a C. frutescente specifice non est distinctum.

^{**)} Conf. Catal. s. c. n. 2.

^{***)} Conf. Catal. s. c. n. 4.

^{4*)} confer Catal. s. c. n. 5.

ampullacea L.
br zordes L.
coesp tora L.
citiata W.
chinde tina Good.
conv. xa.

D vallana W. digit to L.

* d vulsa Good.

* Drymeia W. extensa.

fupa L.
hirta L.

lagopod oides SchK.

Michelii Host.

montana L.

multiflora Muehl.

muricata L.

nemorosa Rebent.

(nutans Host.

(mela lostachys W.

Oederi Flich.

(ovalis Good.

(leporina L.

pullescens L.

paludosa L. pilisa Scop. plantaginea Lam. præcox Jacq. pseudocyperus L. recurva Schk. remota L. Schreberi Schk. secalina W. stellulata Good. stricta Good. tenuis W. vesicaria L. vulpusa L. CARICA L. citriformis Jacq. f.

citriformis lacq. f.
CARISSA L.
Ardvini L.
Ardvini L.
CARLINA L.
acanthifolia All.
acaulis L.
echinus MB.
simplex VV et K.
pulgaris L.
CARPESIUM L.

cernuum L.

CARPINUS L.
betutus E.
orientalis Lam.
CARTHAMUS L.

* creticus L.

* tinctorius L. CARUM L.

* carpi L.
CASSIA L.

* absus L. arborescens V.

" chinensis Jacq.

** corymbosa Lam. foetida Roxb. marylandica L.

* sericea Sw.
tomentosa L.
tora L.
torulosa Cav.
vulgaris Roxb.
spec.

(CASTALIA Salisb.
Nymphæa L.

(scutifolia Sal.

(scutifolia Sal. (N. cærulea BR.

(speciosa Sal.

(N. alba L.

CASTANEA Gærtn.
vesca L (Fagus castanea)
CASUARINA L.
equisctifolia Forst.
stricta HK.
torulosa HK.
CAUCALIS L.

* daucoldes L.

* leptophylla L.

* pulcherrima W. . CEANOTHUS L.

africanus L. americanus L.

americanus L. (glaber B. C.

(microphyllus Mich. CEDRELA L.

odorata L. CELASTRUS L.

buxifolius L. cernuus Th.

scandens L. CELOSIA L.

argentea L.

castrensis L.

* coccinea E. comosa Retz.

ristata L.

elongata Spr. (Achyranthes porri-(gens Jacq. pallida?

* trigyna, L. virgata Jacq. CELSIA L. arcturus L. coromandeliana V.? etata V. heterophylla HP. lanata Jacq. orientalis L. sublanata Jacq,

viscosa Roth.

CELTIS L.

australis L. occidentalis L. Tournefortii Lam. CENCHRUS L. echinatus L. tribuloides L. CENTAUREA. Adami W A. alba L. amara L. arenaria MB. aspera L. atropurpurea W. et K austriaca W. *(axillaris W *) (stricta W. et K.

*) Specimen exsiccatum a Willdenovio cum Illmo L. B. Marschall a Bieberstein communicatum omnino quadrat cum planta podolica, (C. mollis ? Suppl III. p. 7.) in qua calycis squamæ margine lato et ciliæ pectinatæ sunt atræ. Centaurea vero axillaris volhynica, eadem cum planta in Flora taurico-Caucasica descripta et cum C. seusana Villarsii, habet calveis squamas margine angusto atro et cilias teneriores argenteas.

(— cauçasica. (C. seusana Vill. babylonica L.

* calcitrapa L.

* calocephula W.
centaureum L.
centauroides L.
cineraria L.

* coriacea W et K.

* crocodyling

* crocodylium L.

* crupina L.

et var.

* dealbata W.

* elongata Schousb.

* eriophora L.

* ferox Dusf.
flosculosa Balb?
glastifolia L.

* jucea L.

* Isnardi L.

* macrocephala Ad.
mollis W et K.

— fl albo
moschata L.

* napifolia L. neglecta W.

* nigra L?

nigrescens W.

a ochreleuca Ad.

— fl. violaceis.

t orientaus A.

opina Pall. A.

* paniculata L.

* pirvifiora Derf.

* pectinate L.

phrygia L.

* pratensis Thuil.

pullata L?

reflexa Lam.

rupestris L. salicifolia MB.

* salmantica L.

scubiosa L.

sempervirens L. seridis L?

sibirica L.

sicula L.

solstitialis L.

* splen-

splendens L.
stoebe L.

tatarica LA.
transalpina Schl.
trichocephala MB.
vaginata.

* verutum L.
vochinensis Bernh.
(CENTRANTHUS

(Dec.

(Valeriana L. angustifolius L. calcitrapa L.

* ruber L.

— fl. albo
CEPHALANTHUS L.
occidentalis L.

CERASTIUM L. anomalum Wet K.

aquaticum L.
arvensis L.

* davuricum H Gor.

dichotomum L.

pensylvanicum W.

totundifolium.

semidecandrum L?

vulgatum L.
CERATONIA L.
siliqua L.
CERATOPHYLLUM
L.

demersum L.
CERUIS L.
canadensis L.
siliquastrum L.
CERINTHE L.
minor L.

— maculata MB, CESTRUM L. cauliflorum Jacq. fastigiatum Jacq. hirsutum Jacq. laurifolium l' Her.

* pargui l'Her.
salicifolium Jacq.
(CETERACH W.

(Asplenium L.
officinarum L;
CHÆROPHYDLUM

L.

angulatum W et K. *

aromaticum L.

* aureum L.

* bulbosum L.
maculatum W.
monogynum Spr.
(Myrrhis)

* temulum L.
tenuifolium Stev.
CHÆTURUS L

fasciculatus W (Polypogon)

CHAMÆROPS.

CHARA L.

vulgaris L. capillacea Dec. A.

CHEIRANTHUS L.

* annuus L.

_ fl. pl.

cheiri L.

— fl. pl.

* cuspidatus MB.

* decumbens Schl.

decumbens Schl.

* fruticulosus L.

græcus Juss.

helveticus.

montanus.
odorus Spr.

parvillorus Schousb.

* sinuatus L.

spec? A.

* tricuspidatus L.

turritoides Lam.

CHELIDONIUM L.

Link. * laciniatum W.

mojus L.

CHELONE L.

barbata Cav .

glabra L.

obliqua L.

CHENOPODIUM L.

album L

* altissimum L.

ambrosioides L.

* aristatum L.

* bonus Henricus L. A.

" botrys L.

(chrysomelanosper-

*(mum Balb.

(urbicum Aut.

crassifolium HP.

* ficifolium Sm.

* foetidum Cav. A. glaucum L. guineense Jacq.

hybridum L.

lanceolatum Muehl.

maritimum L.

murale L.

2/5 olidum Sm.

opulifolium HP. polyspermum L.

- marginatum Spr. rhombifolium Muchl.

* rubrum L.

Xt. serotinum L?

trilobatum.

* viride. CHIONANTHUS L. virginica L. CHIRONIA L. linoides L. CHLORA L. perfoliata L. CHLORIS Sw.

barbata.

ciliata Sw.

fasciculata.

华 monostachya W.

pallida W. radiata CHONDRILLA L. juncea LA. CHRYSANTHE-MUM L.

Achilleze Murr.

atratum L.

1 carinatum Schousb. ceratophylloides All.

coronariom L.

leucanthemum L. -carpathicum Roch.

- sylvaticum VV.

matricarioides HGor.

Myconis L.

montanum L. (purpureum Pers.

(indicum BM.

- aurantiacum.

- roseum.

segetum L. CHRYSOCOMA L. biflora L? coma aurea L.

linifolia?

linosyris L.

villo:a L A.
CHYSOPHY LLUM L
fuscum.
CHRYSOSPLENIUM
L.
alternifolium L.
CHRYSURUS Pers.
(aureus L.
*(CYNOSURUS.

*(CYNOSURUS. CICER L.

* arietinum L.
a. — semin. albis.
b. — nigris.
CICHORIUM L.

* en 'ivi. L.

* intybus L.

- b. hortense,
CICUTA L.
davurica HGor,

* maculata L.

* pirosa L. CIMICIFUGA L.

* foetida L. CINERARIA L.

* alpina W,

amelloides L.

aurantiaca Hoppe.

bicolor W.

* campestris Retz.

* cordifolia Gouan,
cruenta l' Her,
grifolia L.
integrifolia.
longifolia Jacq. Miechowicz.
maritima L.

* palustris L.
(populifolia l' Her,

*(au ita W ?

* sibirica L.
CIRCÆA L.

* lutetiana L.
(CIRSIUM Vaill,
(Cnicus Schr.

(acarna L.

*(CARLINA MB.

*(diacantha Lam, arachnoideum MB, arvense L (Serratula) (atriplicifolium HGor (pachyachanthos HGor

carum L.

centauroides L.

* ciliatum Morr A.

* echinocephalum W.

* eriuphorum Scop.

* erisithales L.

* Halleri Schl.
heterophyllum All.
lanceolatum L.

" monspessulanum L.

* obvallatum MB.

* ochroleucum All. oleraceum L. palustre L.

* r vulure Jacq. (serratuloides I.

*(Cn. pinnonicus Host. setosum W(Serrat)?

* spinosissimum L.

* syriacum L.

* tataricum L.
uliginosum MB?
uniflorum L.
CISSAMPELOS L.
smilacina L.
CISSUS L.
acida L.

hederacea L (Hedera 5 folia) stans (Vitis W) orientalis Lam. CISTUS L.

albidus L. crispus L.

reticus L.

* hirsulus Lam,

incanus L.
ladaniferus L.
monspeliensis L.
purpureus Lam,
salvæfolius L.
villosus major HP.

vaginatus HK.

CITHAREXYLON L
quadrangulare L.
CITRUS L.
aurantium L.
decumana L.
medica L.

— apyrena,

-- limon.

—— pomum para-

disi.

CLEMATIS L. angustifolia Jacq. crispa L.

* erecta L. glauca W.

* integrifolia L. A. lasiantha HCor. maritima L. virginiana L. vitalba L. viticella L. CLEOME L.

* arabica L.

* dodecandra L.

* gigantea L.

* icosandra L.

* pentaphylla L.

* spinosa L.

* violacea L.

* viscosa L.

CLERODENDRON I fragrans Vent. phlomoides V. (viscosum Vent. (infortunatum W.

CLETHRA L.

alnifolia L.

arborea HK.
CLINOPODIUM L.

agyptiacum Lam.

* vulgare L.

* _ variegatum Roth.

* virginiana L.
CLUYTIA L.
pulchella L.
CNEORUM L.

* tricoccon L.
CNIDIUM Moench.
(apioides Spr.

*(Laserpitium silaifo-

(lium L.

*(confertum Moench.

(Selinum Monnieri L. Seguieri L.

COBÆA Cav.

COCHLEARIA L.

armoracea L.

* danica L.

draba L.
glastifolia L.
officinalis L.

COIX L.

exaltata HGor.

a lacrima L. COLCHICUM L.

* autumnale L. umbrosum Stev. COLINSONIA L. canadensis L. COLLADEA Pers.

(monostachya Pers. *(Tripsacum herma-

(phroditum L. COLITMNEA L. scandens L? COLUTEA L.

* arborescens L. cruenta HK. frutescens L.

* media W.

*(Pockockii HK. (halepica Lam. COMARUM L.

* palustre L. COMMELINA L. africana L. angustifolia Mich.

bengalensis L. (coelestis VV.

*(tuberosa Pl. lil. communis L.

- polygama Roth.

pallida W?

tuberosa L. urania? CONIUM L.

maculatum L.

- croaticum W et K nodosum HP. CONVALLARIA L majalis' L.

__ fl. pl.

CONVOLVULUS L. althaeoides L. arvensis T. cantabrica L.

* ciliatus Roth.

* cneorum L. elongatus Brouss.

farinosus L. Hermanniæ l' Her-(jalapa L.

(Jpomæa macrorhiza Mich.

linearis BM.

lineatus L.

micranthus W.

- # sepiun L.
- * siculus L.
- * tricolor L. CONYZA L.
- * aegyptiaca HK.
- * axillaris Horn.
- bifrons L.inuloides L.Gouani Jacq.
- * patula HK. saxatilis L.
- * squarrosa L.
- * thapsoides MB. CORCHORUS L.
- * hirtus Jeeq.
 japonicus Th. fl. pl.
- multisiliquosus.
- * olitorius L
- * trilocularis L.
 C()RDIA L.
 myxa L?*)
 COREOPSIS L.
 autriculata L.
- * diversifolia Jacq. f.

ferulæformis Jacq.

tripteris L.
verticillata L.
CORIANDRUM L.

sativum L. A.

* testiculatum.
CORIARIA L.
myrtifolia L.
CORISPERMUM L.

hyssopifolium I..

squarrosum L. CORNU COPIÆ L.

* cucultatum L. CORNUS L.

* alba L.
candida.
candidissima ?
mascula L.
paniculata l' Her.

* sanguined L.

(serices l' Her.

(cærules Lam.

COR) VILLA L.

coronats L.

- cauca-

^{*)} Flores tetrandros vidi.

taurinensis VV. - caucasica. cretica L. emerus L. glauca L. iberica MB. minima L. securidaca L. paria L. CORONOPUS Hall. (Ruellii Garntn. (Cochlearia coronopus L. Ling and CORREA Sm. alha Sm. (CORYDALIS Vent. (Fumaria L. aurea Muehl. bulbosa L. digitata Curt. formosa B. R. fungosa L. * lutea L. sempervirens L. CORYLUS L. avellana L.

? var maxima.

colurna L. rostrata HK. COSMUS Cav. parvifloras Jacq. -COTULA L. anthemoides Lam. coronopifolia L. pubescens Desf? COTYLED IN L. coccinea Cav. orbiculata L. spuria L. umbilicus L. CRAVIBE L. cordifolia St. hispanica L. tatarica lacq A. CRASSULA L. (arborescens Pers. (cotyledon Jacq. cordata Th. glomerata L. imbricata HK. lactea. Th. marginalis HK. persoliata L. Gina Jarieno e anvintivale, perforata L.
portulacacea Lam.
spathulata Th.
tetragona L.
CREPIS L.

agrestis W et K. alpina L.

aspera L.
bionais L.

* coronopifolia Desf. foetida L.

(Gmelini Schult *)
*(Iodomeriensis B.

* heterosperma Schrad.

* hispida W et K.

* lappacea W.

* panviflora Desf.

* pinnatifida W.

* rhagadioloides L. rigida W et K ! A.

* rubra L.

* scabra W.

* Sprengeriana All.

taurinensis W.

tectorum L.

virens L.

CRINUM L.

Commelini Jacque

Commelini Jacquerubescens HK.
CRITHMUM L.

* maritimum L.
CROCUS L.
biflorus Mill.
(moesiacus Ker-

(moesiacus Ker-(luteus Lam. (Pallasii Gold.

(autumnatis MB.

pulcher.

sativus persicus.
speciosus MB.

sulphureus Ker. biflorus.

susianus Ker. nudi

versicolor Ker.

CROTALARIA L.

incana L.

^{*)} Huc spectat Gmel. Fl. sibir. T. II. Hieracium n. 20. tab. XI. Planta XII. repræsenata minus quadrat cum nostra.

*

* parviflora Roth.
spec. ex India.
spec. e Cap b. sp.
CROTON L.

* lobatum L
penicillatum Vent.
CRUCIANELLA L

* angustifolia L.

* - mucronata Roth.

* latifolia L.

* patula L.
CRYPSIS HK.
schoenoides HK.
CUCUBALUS L.
baccifer L.
CUCUMIS L.

* anguinus L.

* Bericle.

* chate L.

* dudaitn L.

* flexuosos L.

* guincensis.

* Melo.

* _ reticulatus.

* _ candalupa.

* prophetarum L.

* sativus L.

CUCURBITA L.

aurantia W.

citrullus L.

pepo L.

- fa ciata.

- oblonga.

- pyriformis.

sulcata.

subverrucosa W.

tiarata Bernh.

CUNILA L.

pulegioides L(Melissa) CUPHEA Jacq.

viscosissima Jacq.

CUPRESSUS L.

sempervirens L.

k — fastigiata.

Le horizontalis HP.

CURCUMA L.

longa L.

CUSCUTA L.

europæa L.

CYCAS L.

revoluta Th.

CYCLAMEN L.

aleppicum?

autumnale.

europæum L.
hederaefolium HK
(inodorum?

*(C. persicum var. fl. (albis Mill. Diet. odoratissimum. persicum Mill.

(CYDONIA Pers.

(Pyrus L.
japonica Th.
vulgaris L.

— Iusitani a HP. (CYMBIDIUM Sw.

(Epidendron L.
aloifolium L.
corallorh 2a L. A.
ensifolium L.
verecundum Sal.
CYMBOPOGON Spr.

(schoenanthus Vent.

(ANDROPOGON.

CYNANCHUM L.

acutum L?

CYNARA L.

* cardunculus L.
scolymus L.
CYNOGLOSSUM L.

apenninum L.

bicolor W:

lanceolatum K.

* linifolium L.

omphalodes L.

pictum HK.
scorpioides Jacq.
sylvaticum Haenke.
vicginicum L.
CYNOSURUS L.

* cristatus L.

* echinatus L.
CYPERUS L.
* alternifolius L.

* bulbosús V.

esculentus L.

flavescens L.

fuscus L. globosus?

glomeratus L. imbricatus Retz.

* pannonicus Jacq.

patulus Host.

" strigosus L.

* vegetus Retz.
viscosus Sw.
CYPRIPEDIUM L.
calceolus L
CYRTANTHUS HK
angustifolius HK.

CYS ICAPNOS Gærtn.

(africana Gærtn.)
(Fumaria vesicaria L.
CYTISUS L.

* alpinus Sehm. Arb.
argenteus L.
austriacus L.
biflorus l' Her.
cajan L.

_ b.

elongatus W et K.
falcatus W et K.
foliolosus l' Her.
hirsutus L.

laburnum L.

— latifolium HP.

leucanthus W et K.A.

montanus.

nanus W?

nigricans L.
panicularus K.
purpureus Jacq.
sessilifolius L.
supinus L.
— uralensis.
triflorus l' Her.

glomerata L.

* - glaucescens W.

DACTYLIS L.

hispanica L.
 paspaloides W.
 DACTYLOCTE.

DACTYLOCTE. NIUM W.

(ægyptiacum L. *(CYNOSURUS. DALEA Vent.

*(lagopus Cav. (PSORALEA. DALECHAMPIA L.

* scandens L.
DAPHNE L.
alpina L.
cneorum L.
laureola L.
mezereum L.
odora Th.

—fol. variegat. DATURA L.

- * capensis?
- * fasinosa L.
- * ferox L.
- * fruticosa Horn.
- * lævis L.f
- * metel L. stramonium L.
- * tatula L.
 DAUCUS L.
- * carota L.
- * hispanicus.
- * lucidus L.
- * mauritanicus L.
- * polygamus. rigidus HP.
- * visnaga L?
 DECUMARIA L.
 barbara L.
 DELPHINIUM L.
- * Mjacis L. A.
- # __ fl. pl.
- * _ humile fl. pl. alpinum Wet K.

(cheilanthus HGor.

* (dahuricum milii *)

* chinense H Gor.

* consolida L. cuneatum Spr.

* elatum L.

___ fl. pl.

* exaltatum HK.

* _ ? latifolium.

* fissum Wet K.

* grandiflorum L.

*(hirsutum Pers. (hybridum W.

intermedium HK.

* __ villosum.

* pseudoperegrinum HGor.

puniceum L.

spurium HGor.

staphis agria L. tridactylon Mich. varians Schult?

* urceolatum lacq.

spec. ex Ucran A.
DENTARIA L.

bulbifera L. glandulosa W et K. (DESMANTHUS W. * (Mimosa L. cinereus L. diffusus W *) * virgatus L. * virgato affinis **) DIANELLA Lam. cærulea Lain. (nemorosa Eam. (Dracæna ensifolia L. DIANTHUS L. * alpestris Bulb. arenarius L? armeria L. asper Horn.

attenuatus Sm.

atrorubens All. A.

barbatus L.

— fl. pl.

*

数

bicolor MB. cesius Sm. capitatus H V. caryophyllus E. __ fl. pl. caurasicus BM. chinensis L. __ fl. pl. collinus W et K. deltoides L. dubius. (Fischeri Spr. *(collinus ruthenicus (HGor. fruticulosus. furcatus Balb. glaucus Sm. hortensis Schrad: * _ fl. pl. lanceolatus St. monspeliacus L?

*) Confer Suppl. II. p. 7.

^{**)} Differt a D. virgato foliis bi-tri (nec quadri) jugis, floribus minoribus, leguminibus una tertia parte brevioribus et latioribus. E. seminibus petropolitanis.

montanus MB.
moschatus *Mayer* major.
nitidus W et K.

patens Horn.

* petræus W et K.

* plumarius L.

* — fl. pl.

polymorphus MB.A.

præcox.

* prolifer L.A.

serotinus W et K.

spec. e Corsica.

sperbus L.

* sylvestris Wulf. virgineus Jacq. (DIAPHYLLUM

Hoffm.

(Bupleurum L.
aureum HGor.
longifolium L.
DICTAMNUS L.

* fraxinella L.

— fl. albo.
DIERVILLA Mich.
(humilis Pers.
(Lonicera Diervilla L.

DIGITALIS L.

alpina?

aurea.

(ferruginea L.

* lævigata W et K.

* intermedia Roth.

* lanata Ehrh.

* lutea L.

* ochroleuca Jacq.
parviflora Jacq.

* purpurea L.

* — fl. albo

* thapsi L.
DIOSCORÆA L.
sativa L.
DIOSMA L.
ericoides L.
DIOSPYROS L.
lotus L.
DISANDRA L.

pro trata L.
DIPSAEUS L.
ferox Lois.

* full num VV.

lacinuatus L. A.
pilosus L.
sylvestris Jacq.

var? cal. com. phyllis. brevioribu patentihus DODARTIA L. orientalis L. DODECATHEON L. meadia L. DODONÆA L. triquetra W. spec ? DOLICHOS. (abyssinicus. (aureus. (bengalensis, Jacq. (biflorus L. (catiang L. (elegans spr. (lablab L. b. "(lignosus L. (lunatus. (luteolus Jacq. (pubescens W. (sesquipedalis L. (sinensis L. (tranquebaricus Jacq. (unguiculatus L.

A sistemano

(varius vexillatus. (violaceus. (spec. DORSTENIA L. Houstoni Mill. DORONICUM. pard. lianches L. scorpioides W. DORYCNIUM Vill. (herbaceum Vill. (Lotus dorycnium L. latifolium W. monspeliense W. DRABA. aizoides L. contorta Ehrh. hirta L. nemoralis. stellata Jacq. verna L. DRACÆNA L. ferrea L. DRACOCEPHA-LUM L. allaicense L.

austriacum L.

canariense L. canescens L.

moldavicum L. A.

nutans L. 200

peltatum L.

peregrinum L. Ruyschiana L. sibiricum L.

* thymiflorum L.

* virginicum L. DRACONTIUM L. pertusum L. (DREPANOPHYIL

(LUM Hoffm. (Sium L

(agreste Hoffm. (S. falcaria L.

(palustre Hoffm.

(S. latifolium L. DRIMIA Jacq. elata Jacq.

DROSERA L. longifolia L.

rotundifolia L. DRYPIS L.

spinosa L.

DURANTA.

Ellisia L. Plumieri inermis L.

- spinosa

ECHINOPS L.

horridus HP.

paniculatus Jacq.

ritro L A.

: ruthenicus HGor.

sphærocephalus L.

viscosus MB?

ECHIUM L.

ambiguum Dec. bifgons . Dec . candicans Jacq.

creticum L.

giganteum HK.

italicum L. lineatum Jacq. f.

rubrum Jacq.

strictwm HK.

violaceum L. vulgare L. ECLIPTA L.

* erecta L.

latifolia L. *

prostrata L.

EHRETIA L. tinifolia I. EHRHARTA Lam. panicea Sm. ELÆAGRUS L. orientalis L. ELÆODENDRON Jacq. australe Vent. ELEUSINE Gærtn. coracana L. domingensis Jacq. filiformis Pers. 25 indica L. virgata L. ELLISIA L. nyctelea L. ELSHOLTZIA W cristata W. ELYMUS L.

canadensis L.
crinitus Schr.
caput medusæ L.
curopæus L. A.
geniculatus Sm.
glaucifolius Muchl.

arenarius L.

* hirsutus Schr.

* hordeiformis HP.

philadelphicus L.

ramosus ?
sabulosus MB.

* striatus Muehl.

* villosus Muehl?

* virginicus L. EPHEDRA L. monostachya L. EPILOBIUM.

* amplexicaule HGor.
(angustifolium Lam.
(angustissimum Web.
* coloratum Muehl.

* hirsutum L.

* incanum ?

* montanum L.

* _ alpestre Schm.

* pulustre L.

* pubescens Roth.

* roseum A.

(spicatum Lam.

(angustifolium HK. * tetragonum L.

EPIMEDIUM L. alpinum L.

EPIPACTIS Sw. ensifolia Sw. Litifolia L. Serapias ; * atrorubens Hoffm. nidus ap s L Ophrys)* ovata L. (Ophrys) pallens Sw. pulustris Crantz. ruhra L. (Serapias) EQUISEFUM L. arvense L. hyemale L. sylvaticum L. ERICA L. herbacea L. (lugubris Sal, (mediterranea L. multiflora L. (multicaulis Sal. (stricta. (procera Sal. (arborea L. * prolifera Sal? scoparia L. ERIGERON. acre L. - affino A.

alpinum L. canadense L. delphinifolium H etB linifolium W. philadelphioum L. purpureum HK. Villarsii Bell. ERIOCEPHALUS L. africanus L. ERIOPHORUM L. latifolium Hoppe. vaginatum L. A. (ERODIUM I' Her. (Geranium L. chamædryoides HK. chium L. ciconium L. cicutarium L. glaucophyllum L. gruinum L. hymenodes l'Her, malacoides L. ERVUM L. hirsutum L. lens L. lenticula Schr, *(di*(diphyllum mihi *)

* monanthos L.

245 punctulatum.

3,5 tetraspermum L.

** triflorum. ERYNGIUM L. amethystinum Mill. asperifolium Lam. azureum HP.

Bourgati Gouan. campestre L.

corniculatum Lam. dichotomum Desf. giganteum MB.

* maritimum L. planum L.

* tricuspidatum L. ERYSIMUM. alliaria L.

angustifolium Ehrh. burbarea L. bicorne HK. b.

* cheiranthus Pers. (Cheir. erysimoides L.

* hieracifolium L.

longisiliquum Schl.

odoratum Ehrh.

officinale L.

(pallens Hall, f. (CHEIRANTHUS.

* parviflorum Jacq. (cheiranthoides L.

* præcex Sm.

(repandum L. *(Cheir paniculatus Lam

rhæticum. virgatum Roth,

(ERYTHRÆA Ren.

(Gentiana L. centaurium L.

ramosissima A.

ERYTHRINA L. herbacea L. ETHULIA L.

conyzoides L. EUCOMIS l'Herit. punctata l' Herit. speo?

striata.

undulata HK.

^{*)} Confer Suppl. I. p. 15.

EUPATORIUM L.

* ageratoides L.
altissimum L.
cannabinum L.
purpureum L.

* trifoliatum L. EUPHORBIA L.

* agraria MB.

* amygdaloides W. (,anacantha HK. (tridentata Lam.

androsæmifolia Schousb. *

angulata Jacq.

caput medusæ L. *

charatias L.

* cyatophora Jacq. cyparissias L.

* dentata Mich.

* emarginata HK.

* epithymoides L.

* esula L.

— taurica. *)
genistoides L?

Gerardiana Jacq.

* glareosa MB taur.
— podol.

*(gracilis MB. s.

(segetalis B.

hetioscopia L.

Humboldtii W.

hypericifolia L.

* lathyris L. .
linarifolia ? **)

literata Jacq.
lucida W et K? A.

mollis Gmel.

myrsinites L. taur.

neriifolia L.

nummulariæfolia W.

palustris L A.

peplus L.pilosa L,piscatoria Jacq.

* platyphylla L.

* portlandica L.

*) Differt ab E. esula vulgari præprimis, foliis acutis mucronatis et involucris latioribus.

**) Confer Catal. 1811. p. 47.

(prunifolia Jacq.

*(geniculata Ort.
punicea Sw?
salicufolia Host A.

* segetalis L.

* segetalis L.
tenuifolia MB.
tristis MB. s. *)

valentina Ort.

* villosa W et K.

virgata W et K.

— ? uralensis
EUPHRASIA L.
!utea L. A.
odontites L.
off cinalis L.
EVOLVULUS L.
linifolius L.
EVONYMUS L.
atropurpurea Jacq.
europæa L.
latifolia L.

* perrucosa L. FAGONIA L.

retica L.
FAGUS L.
sylvatica L.

— purpurea HP. FARSETIA HK.

*(clypeata L.
(ALYSSUM.
FERRARIA L.
minor Pers?
undulata L.
FERULA L.
communis L.

longifolia MB.
—affinis? **)

nodiflora L.A.
orientalis St ***)
tingitana L.
FESTUCA L.
alopecurus Schousb.

*) Confer Suppl. IV. p. 27. Nomen a colore fusco nectariorum desumptum.

**) Prope Odessam legi seminiferam initio Augusti. Uti videtur biennis.

***) Prope Baltam legit.

Bellardi HV. calycina Cav. ciliata St. diandra Muchl. distachya Roth. divaricata Desf. duriuscula L. elatior L. flavescens Host. (geniculata W. (stipoides W Bromus) gigantea L. (Brom.) glauca Lam. gracilis Moench. hirsuta Host. nutans Spr. ovina Lu pallens Host. pannonica Host. pratensis Huds. pubescens W. pumila Hoppe. pinnata Moench A. rigida Roth. rubra Leers.

rupestris Host Brom) serotina Host A. stricta Host, sylvatica Vill. tenella W. (tenuislora Schrad. (Triticum Nardus Dec tenuifolia Sibth. (unioloides W. (CERATOCHLOA Dec. vaginata K. vallesiaca. FICARIA Dill. (ranunculoides Roth . (Ranunculus Ficaria L. FIGUS L. americana Aubl. bengalensis Vahl? (excl. Syn.) benjamina L? carica L. - fr. viridi. indica Hort. (non-L) lævigata V ? nitida Th? *)

^{*)} Confer Calal. 1811. p. 48.

(oppositifolia Roxb. (scabra Jacq. (hispida L. religiosa L. (rubigiosa Vent. (australis W. scandens Lam. spec. e Semin. americ. spec. e Jamaica. ELAVERIA W. contraierba Cav. (FOENICULUM (Hoffin. (Anethum L. vulgare L. FORSKOLEA L. angustifolia L. tenacissima L. FOURCROYA Vent (gigantea Vent. (Agave foetida L. FRAGARIA L. chiloensis Ehrh. (colling Ehrh. (vesca b. B. grandiflora Ehrh.

(ananassa Duch. vasca L. _ hortensis. --- monophylla Duch FRANKENIA. lævis L pulverulenta L. FRAXINUS L. (atrovirens HP. (crispa Hort. excelsior L. __ b. cortice fusco ramulor. - pendula. juglandifolia Lam. lentiscifolia W? oxyphylla MB. a. cortice cinereo - b. cortice fusco rotundifolia Lam. sambuifolia Lam. simplicifolia W. spec. FRITILLARIA LO imperialis L. - fol. varieg.

meleagrys L. FUCHSIA Plum.

*(coccinea HK:

s (magellánica Lam. FUMARIA E. capreolata L. off cinalis Is.

* parviflora Lam. spicata L. GALANTHUS L. nivalis L.

GALEGA L.

* officinalis L.

--- alba.

* orientalis Lam. GALEOBDOLON Sm. * (luteum Sm.

Galeopsis galeobdolon

to con too di

GALEOPSIS L.

* ladanum L.

* pubesceris B.

tetrahit L.

versicolor Sm. GALINSOGA Cav.

* parviflora Cav. GALLIUM L.

anglicum Huds aparine L.

aristatum L. : austriacum Jacqu

boreale L.

caucasicum HM. cinereum.

diffusum Schrad. var. caul. panicul. divaricatum Lam.

erectum Sm. infestum VV et K.

(intermedium Schults (sylvaticum B. læve HP.

linifolium HK.

litigiosum Dec. lividum: lucidum All:

__ fbericum.

maritimum Gouan

* mollugo L. palustre In.

pseudoverum Schult?

pusillum L.

publioides L. rubrum L.

scabrum Jacq.

sylvaticum L.

tenuissimum MB,

* tyrolense W.

uliginosum L.

verum L.

podolicum A.

GARIDELLA L.

* nigellastrum L.
GAUNIA.
domingensis ?
GAURA L.

mutabilis Cay,

GENISTA L.

* canariensis L.
candicans L.
germanica L.
ovata W et K.

procumbens W et K.

sibicica L.

tinctoria L.

— syrmiensis Rochel

GENTIANA L.

acaplis L.

amarella L. A.

ciliata L.

* cruciata L. lancifolia Eröl.

* pneumonanthe L.

(GEORGINA W., (Dahlia Cav

(Dahlia Cav yariabilis VV.

aurantiaca.atropurpurea.

— atropurpurea.
— carnea.

- coccinea Cava

__ cuprea.

— — formosa ?

— fusca.

— — lilacina.

_____late radiata.

ciata.

--- basi purpurea.

- pallida W.

- purpurascens.

— — purpurea W. — — — fl. pl.

GERANIUM L

* anemonifolium l'Her.

* bohemicum L A.

* canescens l'Her.

collinum Steph, A.

- & columbinum L.
- * dissectum L.
- * diparicatum Ehrh. A. *
- * ibericum Cav.
 lancastriense Sm.
- * lanuginosum Jacq.
 lucidum L,
 molle L?
 palustre L.
- phæum L.
- * pratense L,

 fl. albis,

 pusillum L.
- pyrenaioum L.

 Robertianum L.
- * rotundifolium L. A.
- * sangumeum L.
- sibiricum L.
 sylvaticum L.
 tuberosum L.
- # umbrosum W et K.A.
 GESNERIA L.
 tomentosa L.?
 GEUM L.
- album Gmel.
- i hirsutum Muehl.

intermedium Ehrh.

e Dahur.

macrophyllum W.

rivale L.

* strictum HK,

* urbanum L.
GINGKO Kompf.
(biloba Kaempf.

(Salisburia adiantifolia (Sm.

OM.

(GITHAGO Desf.

(Agrostemma L. (segetum Desf.

* (A. githago L.

nicæensis L.
GLADIOLUS L.

blandus HK.

communis L. A. cuspidatus, Jacq.

expansus.

(grandis V. versicolor BR, longifolius.

Milleri BM,

plicatus L.

pterophyllus.
tardiflorus.
(tenuis MB.

(galiciensis B,
tristis L.
tubispathus,
venosus W,
(GLAUC!UM T.
(Chelidonium L.
) phoeniceum Cr. A.

*(Ch. corniculatum L. fulvum Sm.

* luteum Scop.
GLECOMA L.
hederacea L.
hirsuta W et K.
GLEDITSCHIA L.
horrida W.
triacanthos L.
GLINUS L.

lotoides L.
GLOBBA L,
marantina L,
GLOBULARIA L.
vulgaris L.
GLOXINIA l'Her.
maculata l'Her.

apios L. caribæa Jacq. frutescens L. phaseoloides Sw. præcatoria H et B, sarmentosa Roth. ternata? spec. GLYCYRRHIZA L echinata L. foetida Desf. glabra L. glandulosa W et K, GNAPHALIUM L. arenarium L. arvense I. dioicum L. fætidum L. *? - calycihus flavis, germanicum L. belianthemifolium Th. luteo album L. margaritaceum L.

nitidum.

orientale L.

patulum L?

GLYCINE L.

* pensylvanicum W.
rectum Sm.
stoechas L.
uliginosum L.

undulatum L.
GNIDJA L.
simplex Th.
GOMPHRÆNA L.

* brasiliensis Jacq.

* decumbens Cav.

* globosa L alba

* - rubra.

* interrupta L.
GORTERIA L.
grandiflora?
rigens L.
GOSSYPIUM.
arboreum L?
herbaceum L.
religiosum L.
(GRANGEA Lam.
(Cotula L.

Jatifolia HP,

maderaspatana HP,
GREWIA L.
occidentalis L.
GRINDELIA W.

* inuloides W.
GRONOVIA L.

* scandens L.
GUAIACUM L.

officinale L.

GYMNASTYLES Juss, anthemifolia Juss.
GYPSOPHILA L.
(acutifolia HGor.

(altissima MB.

* altissima L arenaria W et K, compressa Desf.

dubia W,

* elegans MB.

* fustigiata I.?
glomerata MB,

muralis L.

perfoli ta L.
saxifraga L.
spec. nov. e HP.

(Steveni HGor.

(G repens MB, struthium L

* viscosa Murr.

HÆMANTHUS L.

Edccineus L. moschatus Jacq? puniceus L. tigrinus Jacq. (HAGEA Vent. (Mollia W. latifolia W. (Teneriffe Lam. *(VI diffusa W. HALLERIA L. lucida L HALORAGIS HK. # cercodia HK. HARRACHIA Jacq.f. speciosa Jacq Justicia infundibuliformis V. HEDERA L: helix L. __ fol. variegatis. HEDYPNOIS W. arenaria Schousb. cretica Cav. monspeliensis W. pendula Balb.

rhagadioloides L. HEDYSARUM L. alpinum L. - fl. albo bupleurifolium L? canadense L. capitatum Desf. corodarium L. flexuosum L. gangeticum L. herbaceum? maculatum L. *** muricatum Jacq. (paniculatum L ? *) abyssinicum Hort. pictuin Jacq. vespertilionis L. viridiflorum L. viscidum Roxb. spec. HELENIUM L. autumnale L. quadridentatum Lab. (HELIANTHEMUM

^{*)} Confer Suppl. IV. p. 37.

(Cistus L. ægyptiacum Jacq. anglicum. angustifolium Jacq. appeninum L. canariense L. croceum Desf. elongatum W. fælidum Jacq. fumana L. lævipes L. ledifolium L. lineare Cav. marifolium L? - lauric. mutabile lacq. piloticum L. obscurum Pers. grandiflorum pilosum L. pulverulentum Thuill. punctatum W. roseum Jacq, salicifolium L. stachædifolium. Brot. * vulgare Desf. HELIANTHUS L.

annuus L. * decapetalus La, (giganteus L. (virgatus Lam. macrophyllus W. mollis W. multiflorus L. __ fl pl. trachelifolius W. tuberosus L HELICHRYSUM Vent. (chrysanthum Pers. (bracteatum Vent. (lucidum Spr. fulgidum L. (XERANTHEMUM retortum L. HELICONIA L. humilis Jacq? HELIOPHILA L. amplexicaulis L. crithmifolia W. * pendula W. pinnata L. HELIOPSIS Pers. (lævis Pers.

(Buphthalm: helian-(thoides VV. HELIOTROPIUM L. chenopodifolium H et Baissam Ig A curassavicum L. europaum L. indicum La parviflorum L. peruvianum L. HELMINTIA Just, echioides L. HELLEBORUS L. niger L. purpurascens Wet K.A. viridis L. HEMEROCALLIS L. alba Th. cærulea Th. flavar Th. fulway L. A. Sans graminea BR. sibirica HEMIMERIS L. (coccinea W. (Celsia linearis Jacq.

(l'Her. I desanted ! urticæfolia BM. (HEPATICA Dec. (Anemone L. triloba Dec. - fl. pl. cæruleo __ fl pl. roseo HERACLEUM L. angustifolium W. ___ ? var. 1 (flavescens B. angu tifolium Jacq. 2 var. sibiricum L tauricum ? — — podolicum. spec e Sympheropoli HERMANNIA W. decumbens W. denudata L.f. disticha S. H. hirsuta S. H. hyssopifolia I. ? micans S. H. multiflora Jacq. plicata HK. Hemitomus coccinend scabra Jacq. and since economical drive

trifurcata L. HERNIARIA L. glabra L. incana . Lam? (millegrana Pall *) A *(hirsuta MB. HESPERIS L.

africana L. bituminosa Lam. 18 chia L Cheiranth.) hispida HV. laxa Lam.

maritima, L(Cheiranth) matronalis L.A. runcinata W et K. sibirica.

HETEROSPERMA Cav. W amoderate th

pinnata Cav. HIBISCUS L

abelmoschus L. 1

diversifolius Jacq. 2,5

manihot L. 米

D'E militaris Cav.

mutabilis Langua palustris L. antionis rosa sinensis L.

___ fl. pl. coccineo

___ fl. pl. marginato

- fl. pl. pallido

____fl. pl aurantiaco populneus L. ...

speciosus HK. spec. ex Amer. sept. syriacus L. fl: albo

_ fl cæruleo

fl. pl.

- fol. varieg. tiliaceus L.

trionum L. aberia

vesicarius L.

HIERACIUM L.

alpinum L. Blonson

amplexicaule L. andryaloides Vill. angustifolium Gmel?

aurantiacum L.

auricula L.

Asserente cel. Sprengelio, quocum specimina sicca communicatus sum.

_ b. В.

* Bauhini Schult. B.

* bifidum Horn.

(bifurcum MB.

(collinum B.

blattarioides L.

- pyrenaicum L. canescens Schl.

* cerintheides L.

* coronopifolium Bernh

erassifolium.

cydoniæfolium Vill.

cymosum L.

* echioides W et K. fallax W.

flexuosum Wet K.
flosculosum
(florentium All.

*(piloselloides Vill.

* foliosum W et K. A. (glaucum All.

*(polyphyllum W. grandiflorum All.

* Halleri Vill.

hirsutum.

humile Host.

hamifusum Spr. incanum MB.

intybaceum Jacq.

Lachenali Gmel.

lævigatum W.
lanatum W et K?
lapsanoides Gouan.
la Salle de Corse HP.
molle Jacq.

* murosum L.

? — podolicum

nemorosum Pers.

pallescens W et K.

paludosum L.

paniculatum L.

parviflorum Schl.

parvifolium.

pictum Schl.

pilosella L.

porrifolium L.

præmorsum L.

* prenanthoides Vill. prostratum HP. pumilum Hoppe? racemosum W ct K.

* ramosum Wet K. sabaudum La

__ glabrum, saxatile Jarq.

2: sibiricum L. (Crepis)

20 spec, e Dahuria. stoloniferum, stoloniflorum W et K sylvaticum Gouan,

* umbellatum L. undalatum HK.

* villosum L.

* __ b. HIPPOGREPIS L.

& multisiliquosa L. unisiliquosa L. HIPPOPHÆ L.

* rhamnoides L. HIPPURIS L. valgaris L. HOLCUS L.

lanatus L. mollis I. HOLOSTEUM L. cordatum L. umbellatum L.

HORDEUM. bulbosum L taur. distichum L nudum t hexastichon L. (hystrix Roth. (jubatum L.

murinun L. (secalinum L. (vulgare L.

(- co-leste L. (- hybernum.

norvegicum. * zeocrithon L.

HORMINUM L. * pyrenaicum L.

HORNEMANNIA W. bicolor VV. HORTENSIA Juss.

(speciosa. (opulgides Lam.

(rosea HP. HOTTONIA L. palustris L. A. HUMULUS L.

lupulus L. HYACINTHUS L.

non scriptus L.

orientalis L.

— []: pl
HYDRANGEA L.
arborescens L.
radiata Walt.
HYDROCHARIS L.
morsus rance L.
HYMENOCARFUS
W. En. s.
(numanularius W.

(Medicago circinata L.
HYOSCIAMUS.

albus L.
aureus L.
nuger L.

1:5 (nummularius W. * (Medicago circinata L.) 102 aureus L. 245 niger L. pallidus W et K A. pusillus L. * S-opoli L. HYOSERIS L. * radiata La scabra L. HYPECOUM L. * procuntben's L. HYPERICUM L. ascyrou L. androstemum L.

balearicum L.

calycinum L. canariense L. dubiam Leers. elegans MB. hircinum L. hirsutum L. Kohlianum Spr. minus. monogynum L. montanum L. perforatum L. veroneuse Schult. pyramidatum HK. quodrungulare L. tomentosum L undulatum Schousb. HYPOCHÆRIS L. arachnoidea Desf. glabra L. minima Desf. maculata In radicata L. HYPOXIS L. sobolifera Jacq. stellata Li. HYPTIS Jacq. persica Spr.

HYSSOPUS.

- * nepetoides L. officinalis L. orientalis Ad.
- * scrophulariæfolius W JASIONE L.
- * montana L.
 JASMINUM L.
- * azoricum L. fruticans L. gracile Jacq. grandiflorum L. humile L.

mauritianum HP.

- officinale L.
 sambae L.
 JATROPHA L.
- * gossypifolia L.
 palmata W?
 JBERIS L.
- * amara L.
 giberaltarica W.
 linifolia L.
- * odorata L.
- * pinnata L.
 - saxatilis L.

semperflorens L.
umbellata L.
tLEK L.
aquifolium L.
— fol. aureo margin.
— fol.varieg echinatis
JLLECEBRUM L.
achyrantha L.

acnyrantha L.
capitatum L.
narbonense Vill.
polygonifolium Vill.
pubescens W.
sessile L.
JMPATIENS L.

sessile L.

JMPATIENS L.

* balsamina L.

— fl pl. L.

noli tangere L.

JNDIGOFEBA L.

argentea V.

madagascariensis HP?

sarmentosa Th.

* tinctoria L.
JNULA L.

bifrons L

britannica L.

bubonium Jacq.

crithmifolia L.

dysenterica L.

* ensifolia L.
germanica L. A.

helentum L.
hybrida Baumg A.

hirta L.
oculus Christi L. A.

pulicaria L.

* salicina L.

* squarrosa L.
suaveolens Jacq.
thapsoides Spr.
villosa.
viscosa HK.
JPOMÆA L.

coccinea L.

* discolor Jacq.

hederacea L.
heterophylla Ort.

* leucantha Jacq.

luteola Jacq.

nil L (Convolv.)

* parviflora V.

pes trigridis L.

* purpureaL(Convolv.) *
JRIS L.
aphylla L?

arenaria Wet K. bicolor Hort.

biflora L.
cristata HK.
dichotoma Pall.
fimbriata Vent:
flavescens Dec.
foetidi sima L.

F Gawoleri Dec. germanica L (taurica)

* graminea L. A.
Gueldenstædtii Lep.

* halophila Pall.

hungarica W et K. A.
luteseens Lam.
ochroleuca L.?

pallida Lam.

var. albida.

papilionacea Th.

persica L.

plicata Lam.

major. pluvialis. pomeridiana

pseudacorus L.

purpurea ?

— — cærulea. — — flavescens. samhucina L.

* sibirica L.

- Jactea

spuria L.
squalens L?
Swertii Lam.
variegata Jacq.
— var. limbata.
versicolor Mill?
virescens Dec.
virginica L.
xyphioides L.
2 spec e Sibiria.
spec e China.
JSATIS L.

bannatica K.
spec. ex Odessa St.

tinctoria L.

(JSOPHYLLUM

(Hoffm

(Bupleurum L.
bal leuse Turra.
f.lcatum L.
Gerardi Jacq.

JSOPY RUM L. ** fumarioides L.

thalictroides La JTEA L virginiana L. JUGLANS I. cinerea L. regia L. LUNCUS L. (adscendens Host sylvaticus, W. atratus Krock. bulbous Lin bufonius La conglomeratus La effusus L. glaucus, W. obtusiflorus Ehrh. tenuis WA JUNIPERUS L. bernudiana L. communis Li. nana L. ? __ lithuanica. phoenicea L. sabina L. fil. varieg. virginiana L. spec. e sem america JUSSIEUA L, erecta .
JUSTICIA L. adhatoda L. bracteolata Jacq. coccinea V. formosa?

furcata Jacq.
gendarussa L.

lithospermifolia Jacq nasuta Jacq.

* paniculata V. parviflora Ort

periplocifolia Jacq.
pulcherrima Jacq.
quadrifida V.
resupinata V.
JXIA.
aristata Th.
deusta HK.
erecta L. cærulea.
gigantea.
humilis Th aurea?
hyalina L.
lancea Th.
maculata L.

2853352035

miniata b maculata. monadelpha. palmæfolia. scillaris Th. spec. e H. P. spicata Burm. sulphurea? KÆMPFERIA L angustifolia Jacq. galanga L. rotunda L. (KENNEDIA Vent (Glycine L. bimaculata BM. rubicunda, BM. KIGGELARIA L. africana L Foem. KITAIBELIA W. vitifolia W. KLEINIA Jacq porophylla L. KNAUTIA L. orientalis L. plumo a L. (KOCHIA Roth, (Salsola L.

erenaria W et K. hyssopifolia L. prostrata L. A. scoparia L(Chenopod) quercina L. KOELERIA Pers.

cristata Aut.

glauca Spr.

* phleoides Vill.

subspicata L (Aira) villosa:

KOELREUTERIA

Laxm.

paniculata Laxm. KUHNIA Schr. fruticosa Vent. KRUBERA Hoffm.

(peregrina Hoffm.

*(Conium dichotomum (Desf.

KYLLINGIA E.

* triceps L. LACHENALIA Jacq luteola Jacq. quadricolor Jacq. tricolor Th. LACTUCA L.

rispa Roth.

hybrida.

intybacea Jacqu'ic

* palmata W.

saligna L. A.

sativa L.

— capitata.

* - v. Głębiki

scariola L.

virosa L

LAGASCA Cav.

mollis Cav.

LAGERSTROEMIA per filoritolar

indica L. LAGOECIA L.

cuminoides L. LAGUNEA Schr.

:4 lobata Murr. sublobata W.

LAGURUS L.

ovatus L.

LAMIUM T.

album L. Miech. amplexicaule L.

maculatum L.

roseum.

purpurcum I. rugosum K. (LANCISIA Lam. (Lidbeckia W. lobata Lam. LANTANA L. aculeata L. involucrata L.

mista L. nivea Vent. salvifolia Jacq.

scabrida HK. trifoliata L. LAPPAGO Schr.

*(racemosa L.

(CENCHRUS. LAPSANA L.

communis L.

* crispa W.

* lyrata W. LAROCHEA Dec.

(-coccinea L.

(CRASSULA. LASERPITIUM L. archangelica Jacq.

hirsutum Lam. hispidum MB.

latifolium L.

pilosum W? prutenicum L.

LASIOSPERMUM HGor.

(angustifolium HGor. 1 (Scorzonera eniosperma

(MB,

LATHRÆA L. squamaria L. LATHYRUS L.

angustifolius.

annous L.

aphaca L,

articulatus L.

cicera L.

clymenum L.

cornutus Horn.

heterophyllus L.

hirsutus L.

inconspicuus L, latifolius L.

odoratus L. palustris L.

(pisiformis L.

*(palustris var sylvat. B pratensis L.

* sativus L. A.

非

setifolius L.

sphæricus Retz.

spurius W.

sylvestris L. 2:

tingitanus L. 8 tuberosus E LAURUS L. nobilis E. LAVANDUEA E.

abrotanoides Lam.

能 dentata L. latifolia W.

multifida L. 2.3 pinnata L. spica L. stoechas L. LAVATERA L.

arborea L.

cretica L. hispida Desf. maritima Gouan.

* micans L.

olbia L. punctala All.

at thuringiaca L.

triloba L. musumus.

trimestis L. et fl. alb.

pur bureum Is.

unguiculata HP.

LAWSONIA L.

inermis L

LEDUM L.

palustre L.

LEERSIA.

oryzoides L? *)

LEMNA L.

minor L

polyrhiza L.

tritulca L.

(LEONTODON L.

(Apargia Schr.

angustifolius? autumnalis L.

caucasicus W. crispus Vill.

dubius Hoppe.

hastilis L. hispidus L.

pontanus?

pratensis.

Taraxaci L (Hierac)

⁽⁷⁾ Confer Suppl. II. p. 10

Villar si W. LEUNURUS L. card aca Li.

- marrubiastrum L. neglectus.
- tataricus L.
- sibirieus L. LEPECHINIA W.
- 6,2 spicata W. LEPIDIUM L.
- graminifolium L. iberis L.
- incisum Roth, n B.
- latifolium L. A. ruderale L.
- perfoliatum L.
- sativum L.
- 2,6 - crispatum.
- spinosum L. suffruticosum L. LEPTOSPERMUM ambiguum Sm? * lanigerum Sm?
- thea S. H. LESPEDEZA Mich

glomerata HGor ? juncea L (Hedysor) LESSERTIA Dec.

perennans L Colutea) LEUCOIUM L. æstivum L. LIATRIS Schr.

nana, mantanana

LIGUSTICUM L. athamantoides Spr.

levisticum L.

scoticum L. vaginatum \Spr. LIGUSTRUM L vulgare L A. LILIUM L.

hulbiterum L. candidum L.

_ fl. pl. 4 8 9 9

_ fl. variegato. chalcedonicum I. croceum Pers. *)

martagon L. — fl. pl.

pomponium L.

PRINTER DESE

^{*)} Confer Suppl: II. p.

spectabile H. Gor. tenuifolium HGor, tigrinum Gawl. (LIMODORUM L. (BLETIA. Tankervilliae HK. (LINARIA T. (Antirrhinum L. bipartita Vent. 茶 bipunctata L. chalepensis L. cymbalania, L. genistaefolia L. Hælava Forsk. latifolia Desf. litoralis Bernh. micrantha, Cay, minor L. pilosa L. puppurea L. pyrenaica Ram, repens L. simplex W. spec. perennis A. supina L. triphylla L. (palgaris Desf.

25

2:

7:5

3/5

::

75

7,5

75

#

25

2

:

:

er.

2,5

*(A. linaria L. 6,5 versicolor Lam, LINUM L. africanum L. austriacum Jacq. angustifolium Huds, catharticum L. >5 deaumbens Spr. flavum Jacq. hirsutum D. Friedl. narbonense L. nervosum W et K? perenne L. squamulosum Rud. tenuifolium L. usitatissimum. LIQUIDAMBAR L. styraciflua L. LIRIODENDRON L. tulipifera L. LITHOSPERMUM L. arvense L. officinale L. purpureo-coeruleum I. LOBELIA L. * candida.

- bicolor BM.

ardinalis L.

* Cliffortiana L.

* erinus L. fulgens H et B.

* inflata E.

" longiflora L.

* pubescens Th.

* siphylitica L. splendens H et B.

* triquetra L.

* tirens L: LOLIUM.

* arvense With.

(asperum Roth.

*(complanatum Schr.

* perenne L.

* temulentum L.

* tenue L. A.

LONICERA L.

caprifolium L.

periclymenum L.

- quereifolia.
sempervirens L.
LOPEZIA Cav.
(racemosa Cav.

*(mexicana Jacq.

LOTUS L. australis.

* coimbrensis Brot.

corniculatus L.

creticus L.
cytisoides L.

* decumbens.

Gebelia Vent.
gracilis VV et K.

* hirsutus L.

* — affinis *)

* humifusus W.
jacobæus L.
intermedius Lois.
maritimus 1.

^{*)} Differt a L. hirsuto canescentia sericea foliorum, pedunculisque vix folio longioribus, qui in priori sunt folii duplo longiores. Ignoro, unde provenit.

* odoratus Schousb.

ornithopodioides L. prostratus Desf.

rectus L.

* siliquosus L. spec. e Tauria.

* lenuis W et K.

* tetragonolobus L. LUNARIA L.

* annua L.

* red viva L.

LUPINUS L.

* albus L.

* angustifolius L.

* hirsatus L.

* luteus L.

* nutkagensis.

perennis L.

pilosus L.

* varius L.

(LUZULA Dec.

(Juneus L. campestris L. erecta Desv.

pallescens Wahl.

(vernalis Dec.

(pilosus L.

LYCHNIS L.

* alpina L.

* brachypetala HGor.

"chalcedonica L. Friedl.

fl. alb.

_ fl carneo.

- fl pl

coronata Th.

flos cuculi L. læta HK.

sylvestris W.

- fl. pl.

* vespertina Sibth.

* viscaria L.

- fl. pl.

afrum L.

attutt La

barbarum L.
boerhaaviæfolium L.f.

chinense Mill.

lanceolatum Duh.

obovatum R. et P. tenne W.

LYCOPODIUM L.

complanatum L.

LYCOPUS L.

europæus L.,

exaltatus L. A.

LYSIMACHIA L.

ciliata L.

dubia HK.

* ephemerum L. nummularia L.

punctata L. thyrsifora L.

verticillata Pall?

pulgaris L.

LYTHRUM L.

virgatum A.
tomentosum.
MADIA Mol.

mellosa Mol.

viscosa Cav.

MAGNOLIA L.

grandiflora L.

discolor?

(MAJANTHEMUM

(Sm.

(Convallaria L. bifolium L.

(MALABAILA Hoffm (Pastinaca MB. graveolens MB. pimpinellæfolia MB. MALACHRA L.

alceæfolia Jacq.
capitata L.
MALAXIS Sw.

Ophrys L.

monophylla L.
MALOPE L.
trifida Cav
MALPIGHIA L.

globra Lo.

MALVA Lo.

abutiloides Lo.

alcea L.

* angustifolia HK.

asperrima Jacq.

* balsamica Jacq.
* brasiliensis HP.

* capensis L.

(caroliniana L *)

* decumbens W.

^{🖎)} Su b dio annua, in frigidario perennans.

crispa L.

* flexuosa?

fragrans Jacq. gangetica L. grossulariæfolia.

* lactea HK.

limensis L.

4 mauritiana L. micrantha Sm?

25 moschata L.

3,0 parviflora L.

* peruviana L.

* polystachya Cav.

华 reversa BB.

200 rotundifolia L.

20 scoparia Cav.

京 spicata L.

1 stricta Jacq?

3:5 sylvestris L.

40% veneta?

verticillata L.

215 virgata Cav, MANULEA L.

foetida B. R. 040 MARANTA L. arundinacea L. MARCHANTIA

polymorpha L. MARICA Schri (gladiata Dec. (Moraea nortiana B. R.

MARISCUS V. (elatus V.

*(aggregatus W?

umbellatus L.

MARRUBIUM L.

africanum L. alysson L. apulum Ten.

astrachanicum Jacq-

catarizefolium Lams cinereum Lam.

crispum I.

hirsutum W. leonuroides. peregrinum L. pseudodictamnus I. sericeum HMadr. supinum L. vulgare L.

MARTYNIA L. proboscidea HK. MATRICARIA L.

chamomilla L.

MAURANDIA Jacq.

antirrhiniflora HetB.

* semperflorens Jacq.
MEDICAGO I..

apiculata W.

arborea L.

* caspica Bernh.

" ciliaris L.

denticulata M.

falcata L.

Gerardi W et K.

* glutinosa MB.

* græca W.

helix W (hirsuta?.

*(aculeata Gærtn.

aciniata L.

* litoralis Rhode.

* lupulina L.
maculata W.

marginata W.

* media Pers.

minima L. A.

" murex W.

" nigra L.

nummularia Ste.

procumbens B.

prostrata L.

radiata L.

* recta Desf.
rupestris MB.

* sativa L.
tentaculata W.

* tere ellom W.

* tornata L. tribuloides Lam.

tuberculata Retz.

spec.

MELALEUCA L. armillaris Gertn.

hypericifolia Sm.
 linarifolia Sm.
 stypheloides Sm.
 MELAMPYRUM L.

arvense L.

b. flor. albis MB. A. cristatum L.

nemorosum L. vulgatum Pers.

MELANOSELINUM

Hoffm.

decipiens S. H. (Selinum)
MELIA L.
azedarach L.
sempervirens Sw?
MELIANTHUS L.
major L.
minor L.
MELICA L.
attissima L.

- * Buhini Allion.
- * cœrulea L.
- * ciliata L.
- pyramidalis Lam. uniflora Retz. MELILOTUS T.
- * altissima.

 Barnetti angl.
- ok corulea L. A.
- * connata Bernh.
- * cretica L.
- * dentata W et K.
- * indica L.
- * italica L.
- * Kochiana H. macrathiza WetK.A.

mauritanica Schousb.

messanonsis L.

officinalis L.

* palastris Wet K.

Petitpierreana H.

* rugulosa W.

* spec. e Tauria.

* sulcata.

(vulgaris H.

(gigantea Rochela MELISSA La alba &

cordifolia Pers.

MELITTIS L. melissophylla L.

MELOCHIA L. pyramidata L.

MENISPERMUM L.

canadense I.

MENTHA L.

aquatica HP.

arvensis. L.

austriaca L.

canescens Roth.

crispa L.

crispata Schrad.

hirsuta Sm. lævigata W. lavandulæfolia HP. niliaca V. piperita L. pulegium L. rotundifolia L. _ fol varieg. sylvestris L. villosa Huds, viridis L. MENYANTHESL. trifoliata L. MERCURIALIS L. ambigua. annua perennis L. MESEMBRYANTHE.

MUM L. aureum L.

* cordifolium L. * cristallinum L.

croceum,
deflexum HK.
deltoides L.
densum Haw.
ochinatum HK.

glaucum L. hispidum Mill. inclinatum. lacerum. linguæforme L. loreum L. noctiflorum W. pinnatifidum L. pugioniforme L. scabrum L. serratum ? spectabile W. tenellum. tenuisolium L. tomentosum, tuberosum L. umbellatum L. uncinatum Jacq. veruculatum L. violaceum? 5 spec, indeterminatae MESPILUS Sm.

* Cratægi L.

cordata HK?
crus galli L.

* glandulosa HK.

latifolia Poir. melanocarpa MB. monogyna Jacq. - fl. pl. __ fl. rubro. prunifolia Duh. m punctata HK. pyracantha L. speo. ** Mespili L. (ertocarpa Lam: * (coccinea W et K. (cotoneaster Aut. * germanica L. - minor. japonica Th. MESSERSCHMIDIA L fruticosa L. METHONICA Juss (superba L. (GLOBIOSA . METROSIDEROS Banks . lanceolata Sm. linearis Sm. spec? e Bot. bay. superba Hort.

MEUM Moench. (heterophyllum Moench Aethusa bunius L. MICROPUS L. supinus L. MILIUM L. effusium L . multiflorum Cav. MILLERIA L. quinqueflora L. MIMOSA L. capensis. pudica L. MIMULUS L. glutinosus Wendl. guttatus HGor. splendens Hort. MINUARTIA L. dichotoma L. montana L MIRABILIS L. dichotoma L. jalapa L. et variet. longistora L. MOLUCELLA L. lævis L. MOMORDICA L.

* elaterium L.
MONARDA L.
altissima W.
ciliata Gron.

didyma L.
fistulosa L.
media W.

* oblongata HK.

* rugosa HK.

— fl. albo

violacea HP.
MONOTROPA L.
hipopithys L.

MOR.EA L. flavescens.

(flexuosa L.

(longifolia Pers.

tricolor.

MORUS L.

alba L.

_ tatarica Pall.

* nigra L.

MUSA L.

coccinea BR.
sapientum L.

(MUSCARI T. (Hyacinthus L. ambrosiacum.

botryoides L. ciliatum Cyr.

monstrosum L.

racemosum L. A.
MYAGRUM L.
perenne L.

* perfoliatum L.

rugosum L.
MYOSOTIS L.

* arvensis Roth.
lappula L.
marginata MB. A.
montana B.

* palustris Roth.
sparsiflora Mik.

squarrosa L. A.

MYOSURUS L.

MYRIOPHYLLUM L.

spicatum L.

perticillatum L. MYRRHIS Gaertn. *(odorata L. (SCANDIX. MYRICA L. cerifera L. carolinensis W. quercifolia L. MYRSINE L. retusa HK. (MYRSIPHYLLUM (W. F mumal dang (Medeola L. asparagoides L. MYRTUS L. communis L. ____ H. pl. __ fl. varieg. mucronatus? NAIAS L. monosperma W. (NAPÆA L. (Sida Cav. laevis L. NARCISSUS. angustifolius BM.

approximate Long

biflorus BM. incomparabilis L.fl.pl. jonquilla L. odorus La orientalis L. poeticus L. - fl. pl. solgient pseudonarcissus L. fl. pl. tacelta L. triandrus L. trilobus L. NEMESIA Vent. chamædryfolia Vent-NEPETA L. Allionii. argentea. bipinnata Cav. canescens. cataria L. Calcany citriodora. colorata W. sole grandiflora MB. graveolens Vill. hirsuta L. incana HK.

italica L.
lanata Jacq.
latifolia Dec.
longiflora Vent.
(lophantha HGor.
(HYSSOPUS L.
marrubioides W.
multibracteata Desf.

Mussini Spr.

* nuda L.

pannonica L.

parviflora MB.

reticulata Desf.

serpyllifolia.

teucrioides Lam?

tuberosa L.

ucpanica L.

violagea L.
NERIUM L.
odorum HK.
— fl. pl.

* oleander L.

_ fl. albo.

NICANDRA Adans.
physaloides L.
NICOTIANA L.

chinensis MGor.

* crispa H.P.

(plumbaginifolia Viv.

* fruticosa L.

" gigantea HGor.

glutinosa L.

* hybrida Mihi *)

macrophylla Spr.

* quadrivalvis Pursh.

* rustica L.

* - pumila.

* - scapra.

tabacum L.

* _ hungaricum.

* - pensylvanicum.

* - prussigum.

* undulata Vent.
NIGELLA L.

arvensis L

damascena (L.

coarctata.

^{*)} Confer Catal. 1811. p. 74.

* hispanica L.

rientalis L.

* sativa L.
NOLANA L.

prostrata L.
NYMPHÆA L.

(umbiliculis Sal. (lutea L.

OCYMUM L.

OCTATOME LA

(basilicum L.

(— anisatum.

(— bullatum.

(- crispum,

(- latifoiium.

(- laxum L.

(capitellatum L.

(ciliatum.

*(gratissimum L. (micranthum Roth.

(minimum L.

(pilosum Juss.

(polystachion L.

(scutellarioides.

(thyrsiflorum L. ODONTITES Spr.

Bupleurum L.

*(luteola Spr.

(B. Odontites L.

semicom positum L.

tenuissimum L.

OENANTHE L.

* apiifolia Brot.

globosa Gonan-

(involucrata Cav-

*(Lachenali Grnelpeucedanifolia Polk-

pimpinilloides L.

prolifera L.

OENOTHERA L.

biennis L.

* longiflora Jacq-

* mollissima L.

* muricata L.

nocturna Jacq.

do odorata Jacq.

* parviflora L.

* pumila L.

* purpurea BM.

* rosea HK.

* sinuata L.

suaveoleus Persotetraptera Cavo

OLEA, L.

europæa L. - buxifolia. fragrans Th. undulata Jacq. (ONOBRYCHIS T. (Hedysarum L. arenaria K. caput galli L. crista galli L. Pallasii W. petræa MB. sativa Moench. - carpatica K. - hungarica. saxatilis I.. ONONIS L. alopecuroides L. altissima Lam. antiquorum L. aspera? Columnæ All. fruticosa L. hircina Jacq. minutissima L? mitis Gmel. natrix L. pinguis W.

reclinata L. spinosa L. ONOPORDON L. acanthium L. arabicum L. græcum L. gralum. illyricum L. macrocephalum? tauricum W. ONOSMA L. arenaria W et K. echioides L. stellulata W et K. taurica Pall. tinctoria MB. OPHIOGLOSSUM L. vulgatum L. OPHRYS L. monorchis L. ORCHIS L. hifolia L. conovsea L. globosz L. latifolia L. muculata L. mascula L.

militaris L. morio L. odoravissima L. sambucina lu. _ (rubra. (O. incarnala B. u tulata . L. virides L. (ONEOSELINUM: (Holfm. (Selinum L austriacum Jacq. Chabraei Jacq. elegans Balb. montanum W. (podolicum B *) (S. oreofelinum MB rablense Wulfi (Fenula)
ORIGANUM L.
dictamnus.

majorana L.
majoranoides W.

vulgare L.

ORNITHOGALUM L.

* caudatum Jacq. fimbristum Pall... latifolium Jacq.

* longebracteatum Jacq.

* narbonense L. caucas.
nutans L.
pyrenaicum Jacq.

* ? — tauricum.

(Sternbergii Hoppe.

(minimum B. **)

*) Hoe Orcosclinum speciem esse distinctara ab O. Chabræi Jacq. quocum alii illud conjungere contendunt, affirmati sunt cel. Hoffmann et nuperrime cel. Sprengel et Fischer.

**) Definitio et descriptio l. c. omning est ad hanc speciem adaptata; ocurrit tamen et O. pillosum MB (O. minimum W.) circa Cracoviam fide speciminis a p. d. Polaczek hortulano lecti, quod in herbario conservo.

1 sylvaticum Pers. *(luteum B *) umbellatum L. ORNITHOPUS L.

con pressus I.

ebracte tus lois.

heterophyllus Brot.

* perpusillus L. * scorpioides L. (ORNUS Pers. (Fraxinus L. americana? OROBANBHE L. alba W. A arenaria MB A. caerulea Sunt. A. cuerulesceus MB. A. caryophyllacea Sm. major L. A. ramosa L. OROBUS L.

albus L.

lacteus MB;

lævigatus W et K... lathyroides L. ochroleucus W. et K.

niger L.

vernus Lu ORONTIUM L. japonicum Th OROSTACHYS HGor. malacophyllum Pall.

(COTYLEDON. ORYZA L.

sativa I..

--- mutica.

OSTEOSPERMUM L. cæruleum Jacq. moniliferum L. OTHONNA L. crassifolia L? OVIEDA Juss? mitis Pers ? Siphomanthus indicus L.

*) Sub hac quoque descriptione latent et O. luteum et O. sylvaticum (O. Personnii Hoppe in Sturm Fl. Germ.) tunc temporis a me nondum distincta.

OXALIS L. acetosella L. asinina Jacq. cernua Th. convexula Jacq. fabaefolia Jacq. filicaulis Jacq. flabellifolia Jacq. Hava L. incarnata L. lanata Th. multiflora Jacq. (pectinata Jacq. (digitata. purpurea Jacq. reclinata Jacq. reptatrix Jacq. spec. e HP. speciosa b. suggilata Jacq. tenella Jacq. tetraphylla Cav. variabilis Jacq. versicolor I. violacea L. OXYBAPHIIS l'Her.

glabrifolius Ort. viscosus Cav. OXYCOCCUS Scholl. (palustris. (Vaccinium oxycoccus (L. OXYTROPIS Dec. (Astragalus L. deflexa Dec. Gmelini HGor. pilosa L. PÆONIA L. albiflora Pall. anomala L. corallina Retz. ? - latifolia. humilis Retz. officinalis L. fl. pl. - fl. pl. roseo. tenuifolia L. PALAVIA Cav. * malvæfolia Cav. PALIURUS Lam. (aculeatus. (Rhamnus paliurus L. PANAX L.

(acu-

l'aculeatum W. (trifoliatum L. PANCRATIUM L. disciforme Dec. maritimum L. declinatum Jacq. PANICUM L. capillare L. A.

* colonum L.

coloratum L.

crus corvi L. crus galli L.

* echinatum.

* germanicum V. glaucum L.

italicum L. asiat.

miliaceum I. oryzoides Sw. plicatum W. verticillatum L. viride L.

PAPAVER L.

argemone L.

caucasicum MB.

dubium L. A.

nudicaule L. orientale L.

_ fl. dupl. rhoeus L.

__ fl. pl. somniferum L.

- fl. pl. vario.

- fl. pl. laciniato.

- fl. pl. picto.

PARIETARIA L.

cretica L.

judaica L.

officinalis L.

PARIS L.

quadrifolia L.

PARNASSIA L.

palustris L.

PARTHENIUM L.

* hysterophorus L. PASPALUS L.

(elegans Fl.

*(tenellum W. patulus.

*(scrobiculatus FI.

(Kora W.

setaceus Fl.

(pubescens W.

stoloniferus Fl. PASSERINA L. * filiformis L. PASSIFLORA.

* angustifolia L.

* cærulea L. cuprea L.

* hirsuta Jacq.
holosericea L.
incarnata L.

(lunata Sm. (hiflora Lam.

lutea L.
minima L.
pedata L. fol. varieg.
perfoliata W.

rubra L.

serratifolia L.

suberosa L.

PASTINACA IL.

lucida L?
opopanax L.
sativa L.

(PATRINIA Juss .

(Valeriana L.

sibi ica L.

PAVONIA.

(cuneifelia Cav.

(præmotsa L.

spinifex L. zeylanica L.

PEDICULARIS L.

comosa L? A.

foliosa Lif

palustris L.

sceptrum Carolinum L

PEGANUM L.

harmila L.

(PELIARGONIUM

(Bunn.

(Geraniam L.

acerifolium of Her.

acetosum L.

b. latifolium.

althæoides oL.

anceps Jacq.

anguløsum HK. asperum Ehrh ?

australe W.

beaufortianum.

Desf.

bentinkianum Hort

betalinum L. Burmanni.

W - 000

canariense W. capitatum L. a. floribus roseis. b. fl. rubicundis. carnosum L. cochleatum W. columbinum Jacq. conduplicatum W. cordatum HK. coriandrifolium L. (cucullatum L. (Barringtonii W. En. crispum L. b. majus. denticulatum Jacq. b. asperum. echinatum HK. exstipulatum l'Her, formosum Host. similear observamus Gillerentiam . Varietates

f'(glomeratum Donn. P. inodorum W? glutinosum Jacq., * _ b. crategifoliuma - c laciniatum HP. gratum W. grossularioides L. hybridum L. _ b. roseum HV. incisum B. R. inquinans, L. _ b. fol. zonatis. : - c. (flor. pallidis (P.ing roseum В С. lacerum Jacq. malvæfolium Hort *) (mucronatum B. C. (sidæfolium , W. En? Fragrans W. odoratissimum L. fulgidum L. papilionaceum L. gibbosum L. peltatum L.

the course of multiple therefore as to be a Gonf. Suppl. H., ad Catal. nostrum P. zonalis varietatem, que est, eadem planta modo sub hoc nomine nobiscum communicata.

fol. marginat penicillatum W.

* procumbens B. R.

* radula l'Her.

b. roseum Hort.
c.rosaceum H.Crac
scandens Ehrh.
semitrilobum Jacq.
speciosum BM
stenopetalum Ehrh.
superbum.

* tabulare Th.

ternatum Jacq.

tetragonum Jacq.

— fol. variegat.

triste L.

tomentosum Jacq.
vitifolium L.
zonale L.

- a. fl. coccineis L.

- b. fl. miniatis.

— — fol.margi-

_ c. fl. incarnatis.

_ d. fl. roseis.

(G marginalum B. C. *)

E. fl. albis.
 PELTARIA Jacq.
 alliacea Jacq.
 PENICILLARIA W.

*) Bene monet cel. Du Mont de Courset Granarginatum floribus miniatis et fl. roseis esse species distinctas. Prioris caules sunt. tortuosi, ramis patentibus, hujns caules et rami erecti, fastigiati. Inter sie dictas varietates P. zonalis similem observamus differentiam. Varietates c. d. et e. præseferunt habitum P. marginati fl. roseis; varietatum vero a. et b. caules et rami eandem servant directionem uti varietatis alterius marginatæ.

*(spicata L. (HOLCUS. PENTAPETES L.

ovata Cav.

* phoenicea L.
PENTAPHYLLUM
Pers.

(lupinaster L.

*, TRIFOLIUM.
PENTSTEMON HK

campanulatus W.
pubescens, HK.
PEPLIS L.
portula L.

PERILLA L. cocymoides L.

PERGULARIA L.
lucida?
PERIPLOCA L.

græca L.

PETIVERIA L.

* alliacea L.
PETROSELINUM
Hoffm.

(sativum.

*(Apium petroselinum (L.

PEUCEDANUM L
album HP.
alpestre L?

alsaticum L.

longisolium W et K.

off cinale L.

tenuifolium Poir.

PHACA L.

alpina L.
astragalina Dec.
triangularis Zea.
spec e Dahur.

PHACELIA Jacq. f.

(circinata.

(Aldaeea W.

(Hydrophyllum ma-

(gellanicum Hort. PHALARIS L.

* aquatica, L.

* arundinacea L.

__ fol. pictis.

(capensis L.

* minor Retz.

* paradoxa L. (sativa Desf.

*(Bellardi W.

bulbosa PHARNACEUM L a cerviana L. A.

PHASEOLUS L.

(angulosus Ort. (bicolor HV.

(bipanetatus.

(Boccom HP.

(chunda.

((coccineus Lam.

(multiflands, W.

(domingensis.

(fuscus HV.

(heterospermus. (inamoenus L.

*(lunatus. L.

(luteus.

(max L.

(maculatus.

(at bassandonna

(melanospermus.

(Mungo L.

(nanus L.

(- s. fuscescens.

(- s. parvulis.

(- s, luleis,

(- s. nigris.

(pisiformis, sissing)

(prætiosus.

(scripius.

(sinensis, which elever

(sphærospermus L.

"(syriacus.

(vulgaris E., mad

(- sem minimis., (zebra.

PHELLANDRIUM L

* aquaticum 1

PHILADI LPHUS L.

coronarius L.

- nana.

inodorus, W?

PHII LYREA L.

media L.

angustifolia L.

PHLEUM L.

alpinum L.

asperum Jacq.

Boehmeri Schrad.

(Hostii HV

(Phalaris, trigyna Host

Michelii Schrad.

* prateuse L.

b. nodosum. PHLOMIS L. herba venti L: leonarus Fa

martinfocusis Sw.

* nepelæfolia L.

purgens W: A.

米 tuberosa L. fruticosa L. PHLOX L. divaricata L. glaherrima L. latifelia Mich. machlata Le Ppaniculata L. fl. albo. replans Mich. setacea L. undulata HK. suaveolens HK. subulata L. suffruticosa, PHOENIX L. dactylifera L. PHORMIUM Forst tenax Forst.

PHYLICA L.

ericoides L. YHT rosmarinifolia W. PHYLLANTHUS T. arbus ula Sw. ...) epiphyllanthus E. felcala Switcher PHYLLOLOBIUM HG. Read preginv

chinense HC PHYLLIS L

* nobla la PHYSALIS L.

× alkekengt Lines

angulata I.

* barbadensis L. chenopodiidelia H etB

物

3,4 flexuosa Li.

2: ixocarpa Brota

peruviana L. pubescens (L.

somnifera L. PHYTEUMA L.

canescens Wet K. A. orbiculare Grimm. scorzoner refolium Vill

spicatum L.A. stylosum.

PHYTOLACCA L.

decandra L.

* icosandra L.

(PICRIDIUM Desf.

(Sonchus L.

* hispanicum Jacq.

* tingitanum L.

* vulgare Desf.

PICRIS L.

hieracioides L.

PIMPINELLA L.

* dichotoma L. dissecta Retz.

* glauca Gouan.

* magna L.
nigra W.
orientalis Gouan.
rotundifolia MB.
saxifraga L A.
? tragium Vill.
PINGUICULA L.
valgaris L.
PINUS L.

* Abietes.

**abies L.

**balsamea L.

**canadensis L.

picea L. altaica.

†† Larices.

* larix L.

- sibirica

*** pini.

halepensis HK. taur.

maritima Mill.

pinea.

strobus.

2 spec. e sem. amer.

PIPER L.

blandum Jacq. magnoliæfolium Jacq.

pellucidum L. pereskiæfolium L.

pulchellum V. PISTACIA L.

lentiscus L.

therebinthus L. trifolia L.

PIQUERIA Cav.

trinervia Cav.

arvense L.

sativum L.

- saccharatum.

smyrniense.

* _ umbellatum.
PITCAIRNIA l'Her.
bromeliæfolia l'Her.
latifolia l'Her.
PITTOSPORUM
Banks.

chinense.

undulatum Vent. PLANTAGO L.

Plantagines.

* albicans L. alpina L.

altissima Jacq.
amplexicaulis Cav.

asiatica Lam.

* Bellardi L.

carinata.

cordata Lam.

coronopus L.

crassa W.

depressa W.

hirsuta Th.

* lanceolata L.

Loeflingii L.

lusitanica L.

major L.

maritima L.

maxima L.

* monspeliensis W.

pumila L. recurvata L.

* salsa Pall. saxatilis Pall.

* serraria L.

* sibirica HGor.

* vaginata Vent.

* villosa Roth.

* virginica L. ** Psyllia Juss.

de arenarium Wet K.

* cynops L. genevense.

officinarum L.

* indicum L.

* rigidum.

* strictum Schousb.

* squarrosum Murr PLATANUS L.

hispanicus.

occidentalis L.

105	
(PLATYSPERMUM	* alpina L.
(Hoffin.	* amabilis VV.
(Daucus.	* annua L.
* muricatum L.	* aquatica L.
PLECTRANTHUS	* badensis Hænke.
l'Her amblequement	brevifolia.
* fruticosus l'Her.	THE RESERVE AND A STREET
* parviflorus W.	* _ vivipara.
(PLEUROSPERMUM	% (caesia.
(Hoffm.	(glauca With.
	aspera
(Spr. market springs	(caroliniana
(Ligusticum L.	*(ERAGROSTIS HV.
* austriacum Jacq.	cenisia b. carelle
PLUMBAGO L.	* ciliaris L. * coarctata.
BURNEL BURNELS OF SECTION AND SECTION ASSESSMENT OF SECTION ASSESS	THE PERSON OF A PROPERTY OF A STATE OF THE PERSON OF THE P
Boardons, 21	A STATE OF THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE
Zeylanica, all 2 y	debilis.
POA L. ** abyssinica Jacq.	* depauperata
abyssinica Jacq.	THE PERSON SPECIAL PROPERTY.
The second secon	I suque di
A THE PARTY OF THE PROPERTY OF	Crassa VY

*) Folia ovata, in petiolnm altenuata undata./Bracteæ glabræ.

2*); Folia oblongo - lanceolata plana, magis lucida. Bracteæ dorso glandulosæ, ...)

lusinanium !

d silamabicoo

distychophylla. (dura I.

*(CYNOSURUS.

* elongala W.

* eragrastis L. A.

* (fertilis Host.

(serotina Ehrh.

__ b. *)

festucæformis Ehrh?

(fluitons L.

(Festuca.

glaucanthos Garid? intermedia.

* laxa W. lævis.

maritima L?

(megastachya Koel. (Briza eragrostis L.

nemoralis L.

nervata W.

* peruviana Jacq.

* pilosa L.A. 2*)

pratensis L.

_ angustifolia.

procumbens Sm.

rigida L.

scabra.

sicula Ideq.

sterilis MB.

sudetica Haenke.

* trivialis L. violacea.

PODALYRIA.

cærulea HP.

PODOSPERMUM

(Dec.

(Scorzonera L. laciniatum L.

muricutum Balb. octangulare Roth.

(subulatum, Dec.

(Sc. graminifolia Jacq. POINCIANA L.

pulcherrima L.

P

^{*)} Occurrit ligula oblonga (Hist) et brevis. sima (Schrader.) Anne specie distinguende? 2#) Confer Suppl. IV: p. 17.

POLEMONIUM L.

- * cæruleum L.
- * __ fl. albo.
- * gracile HGor.
 reptans L.
 POLLICHIA HK.
- * campestris HK.
 POLLINIA Spr.

(gryllus L.

(ANDROPOGON.
POLYANTHES L.
tuberosa L.

__ fl. pl.

POLYCNEMUM L. arvense L.

POLYGALA L. myrtifolia L.

vulgaris L.

POLYGONATUM T.

latifolium Jacq.

multiflorum L.

vulgare Desf.

— ff. pl? verticillatum L caucasicum:

POLYGONUM L.

arenarium W etK. A. aviculare L.

- ? erectum A.

(Bellardi L.

*(patulum MB.

* bistorta L.

* convolvulus L. divaricatum L.

dumetorum L.

* emarginatum L.

frutescens L.
hydropiper L.
incanum Schm.
lapathifolium L.
minus Sm.

orientale L.

tataricum L.

POLYMNIA L.

* uvedalia L.

POLYPODIUM L.

dryopteris L.

phegopteris L.

elatum A.
POLYPOGON Desf-

monspeliense Desf. POPULUS L. alba L. balsamifera L. ? — angustifolia HG canadensis Schm Arb candicans HK. fastigiata HP. græca HK. hudsonica. monilisera HK. nigra L. . pannonica K Jllm. Boreyko. suaveolens HG. tremula L. POPTLANDIA L. grandiflora L. PORTIJLACA L.

* oleracea L.

* / __ latifolia.

* pilosa L.
PORTULACARIA
Jacq.
afra Jacq.
POTAMOGETON.
natans L.

lucens L.

perfoliatum L.

crispum L.

marinum L.

pusillum L.

POTENTILLA L.

agrimonioides MB.

alba L.

anserina L.

argentea L.

* ascendens W. K.
astrachanica W. Jacq.
aurea L.
collina

diffusa W.

* fragarioides L?

geoides MB.
geranioides W?
(grandiflora L.
(deelinata HV.

* hirta L.

* hungarica.

inclinata VII. A.

*(intermedia W.

(canescens B.

aciniosa W et K.

multifida L.

* norvegica L. obscura W. taurica.

* opaca Jacq.

* pensylvanica L.

pilosa W. pyrenaica Decl

* recta Jacq.

—? flor. pallidis.
reptans L.
(rubens Vill.

* hirta b rubens HL.

rupestris L.

sericea L.

spec. ex Ochotsk.

e Sympheropoli.

umbrosa Stev.

* visco a Horn?
POTERIUM L.

* agrimonifolium Cav. *

* bybridum L.
polygamum Wet K.

sanguisorba L. POTHUS L. cordata L. crassinervia Jacq. PRASIUM L. majus L. PRENANTHES L. arborea W. hieracifolia L. muralis L. PRIMULA L. auricula L. _ fl. duplici. vario. cortusoides L. elatior Jacq. - hortensis. - calycantha. (farinosa L. (ANDROSACE Spr. officinalis. vulgaris Sm. taur. - fl. dupl. roseo. - A albo.

PRIVA Juss.

hispida Juss.

PROTEA L.

argenica L.

obliqua Th.
pallens L.
PRUNELLA L.
grand foru L.

* — łaciniata.

* hyssopifolia L.
hirta Bernh.
longifolia HP.
ovata HP.
pensylvanica W.
pinnatifida Bernh.
vulgaris L.

- minor.
PRUNUS L.

Cerasi.

avium L.

cerasus L.

— fl. pl.

chamvecerasus Jacq.

laurocerasus L. Insitanica L. mahaleb L? *) A padus. L. pumila L. semperflorens W. serotina Ehrh. virginiana L. ** Pruni. brigantina Vill. domestica L. __ fl. pl. insiticia L et var. spinosa L. PSORALEA L. bituminosa L. bracteata L.

glandulosa L.

intermedia 2")nobis.

^{*,} Fructus coloris draparum P. cerasi vulgaris.

2*) Ps. tolius pianatis, toliolis 5... 7nis, lanceolato—linearibus, pedunculis axillaribus, solitariis, trinisve unifloris, ramis verrucosis mihi.

(Ps. verrucosa vero sic erit definienda: Ps. foliis ternatis pianatisque, foliolis glaucis lanceolatis.

odoratissima Jacq.

palæstina L.

pinnata L. pubescens Balb. verrucosa W. PSYDIUM L. pyriferum L.

PTELEA L. * trifoliata L. PTERIS L. aquilina L. longifolia L. serrulata L. s. PULMONARIA L.

(azurea B. (angustata Schrad.

(angustifolia MB.

angustifolia L.

officinalis L.

(PULSATILLA T.

(Anemone L.

patens L. pratensis L. A. _ minor B. A.

olatis, pedunculis axillaribus solitariis trinisve subunifloris, ramis verrucosis laxis.) Species hæc omnino intermedia P. pinnatam inter et P. verrucosam videtur qua varietas sub descriptione P. angustsfoliae Jacq. Hort. Schonbr. T. II p. 537 t.226 latere. Primo intuitu differt a Ps. verrucosa viredine læta P. pinnatæ; (junior habitu firmiori:) a P. pinnata vero foliolis lanceolato-linearibus, præprimis extimo, longioribus et toto habitu. Petioli, pedunculi, bræcteæ et flores uti in P. verrucosa, nisi quod pedunculi sint breviores, in apicibus ramorum congesti et vexillum magis cæruleum. Patris ignota. An proles hybrida?

vulgaris W. PUNICA L. granatum L. - fl. pl. - fl. pl. albo. PYRETHRUM Sm. Chrysanthemum L. bipinnatum L. canescens? coronopifolium W. corymbosum L. fruticosum L. inodorum I. maritimum L. macrophyllum Wetk millefoliatum L. parthenium L. parthenifolium W. pulverulentum W. sericeum MB. uliginosum K. PYROLA L. minor L. rotundifolia L. secunda L. umbellata L. PYRUS L.

Mali. baccata Pall. (dioica W. (apetala Munchh. malus I. - et var. - præcox Pall. __ sibirica Hort. (prunifolia W. (baccata Hort. sempervirens HP. spectabilis HK.fl.pl. ** Pyri. communis L. - et var. edulis W? elæagrifolia MB. __ glabra. nivalis Jacq. (Pollveria L. (irregularis Munchh. salicifolia Pall OUERCUS L. pedunculata Ehrh. robur T. rubra L. suber L.

RANUNCULUS L

abortivus L.
aconitifolius L fl. pl

* acres L.
aquatelis L.

* arvensis L.
asiaticus L.
— fl. pl.

* auricomus L.

* bulbosus L.

* cassubicus L. flammula L.

* lanuginosus L. A.

— fl. pl.
lingua L.
montanus W.

* muricatus L.

* napellifolius.

* parviflorus L.
pedatus W et K.
pensylvanicus L.
pulyanthemos L.
— tauricus *, A.
repens L.
— fl. pl.

sceleratus L.
Steveni A.
tuberculatus W et K.
Villarsi.

RAPHANUS L. sativus L. vernus.

- æstivalis.

- hyemalis.
RAPISTRUM T.

paniculatum L. MY AGRUM. RESEDA L.

alba L.

canescens V.

"(linifolia.

* fruticulosa L.

* glauca L.

* lutea L.

* luteola L.

med terranea Jacq A. odorata L.

* phyteuma L.
sesamoides L.
RHAGADIOLUS
Schr.

^{*)} Confer Suppl. III. p. 18.

edulis Gærtn. Koelpinia L. stellatus L. RHAMNUS L.

alaternus L. cotharticus L.

Clusii W.
erythroxylon Pall.
frangula L.
rupestris Scop.
RHAPIS Jacq.
flabelliformis Jacq.
RHEUM L.
caspicum Pall.

compactum L.

crispum.

* hybridum L. palmatum L.

rhaponticum I..

* tataricum L.

windulatum L.
RHINANTHUS L.
major Ehrh.
minor Ehrh.
RHODODENDRON
L.

maximum L. ponticum L. RHUS L. coriaria L. -? taurica. copallina L. cotinus L. lucida T. pendulina Jacq. quercifolia? radicans L. typhina L. vernix L. viminalis HK. RHY NCHOSPORA V alba L. (Schoenus) A. RIBES L. alpinum Mill. di cantha Pall. grossularia L. nigrum L. (pensylvanicum Lám (floridum l' Her. petræum Jacy. procumbens Pall. rubrum L.

- fr. albo. spec. e Sibir. uva crispa L. BICINUS L.

africanus W.

communis L.

hybridus nobis *)

inermis Jacq.

* lividus Jacq.

* undulatus nobis 2*)

* viridis W. RINDERA Pall umbellata W et K. (Cynoglossum)

RIVINA L.

* brasiliensis Nocca. (humilis' L.

* canescens B. C.

octandra L.

purpurascens Schrad.

ROBINIA L.

* Caraganae Lam.

altagana Pall.

caragana L.

frutescens L.

__ ? bessarabica. * fruticosa Pall? 3*)

mol-

2*) Confer. Catal. 1811. p. 90.

3*) Hocce sub nomine testatur Illmus Boreyko obtinuisse hanc speciem ab ipso autore nullihi descriptam. Affinis est R. caraganæ differt vero præprimis floribus majoribus, solitariis et leguminibus junioribus rubris An. R. mongolica, an R speciosa, quas cel. Swartz colit Upsalia, sit cadem cum nostra, quod supponere licet, decidere non valeo, carens illarum descriptione.

^{*)} Confer Suppl. II. p. 13.

mollis MB. s. A. spinosa I..

** Robiniæ Horn. angustifolia.

hispida L.

* pseudacacia L. sophoræfolia. viscosa Vent. ROSA L. alba L duplex. - fl. pl. alpina L. altaica W.

And zejowscii Stev. A

blanda HK. bracteata Wendl. burgundica BM. (Roses pornpones)

canina L. carolina L.

caryophyllacea no-

bis *) A. - Par? centifolia L. - minor (Gros pompone) __ unica. (chinensis Jacq. fl. pl. (R. semperflorens pal-(Iida W. cinnamomea L.

- fl. pl. corymbosa Bork. I damascena HK.

(bifera Poir.

* dimorpha mihi 2*) * frutetorum mihi 3*) gallica L fl. pl. ? __ fl. maximo. ? - versicolor. horrida MB. humilis mihi 4*) (Jundzilli mihi A.

^{*)} Confer Suppl. IV. p. 18.

^{2*)} Confer Suppl. III. p. 19.

^{3&}quot;) Confer Suppl. III. p. 20.

^{4*)} Confer Supp. IV. p. 19.

(glandulosa mihi *)
(Klukii mihi.
(balsamica mihi *)
livescens mihi *)

* lucida Ehrh.
lutea Mill.

— bicolor Jacq.
microcurpa nobis 2*)
moschata HK.
multiflora Th.
muscosa HK.
myriacantha Dec.

* mitidula nobis 3*)
parvifolia Ehrh.

parvula.
pendulina L.
pimpinellæfolia L.
— affinis e HGor.
provincialis HK.fl.pl.
pumila Jacq A.
? — fr. globoso A.
pygmæa MB? A.
pyrenaica Gouan.
repens Scop.
reversa W et K.
rubiginosa L.
rubrifolia Vill.
scandens.

Cum hisce nominibus a. p. d. Willdenovio aliæ jam species sint insignitæ, priorem in memoriam primi, Botanici 'systematici Poloniæ Rev. Kluk. appello Rosum Klukir; alteram vero in honorem Reverendissimi Jundaitt Prof. p. o. Zool. et Botan: in Univers. J m p e r a t o r i a Vilnensi Terminologia botanica polonica. et operibus suis scientiam propagando optime meriti Rosam Jundaitti.

^{1*)} Confer Suppl. IV. p. 19.

^{2*)} Confer Suppl. IV. p 20.

^{3*)} Confer Suppl. IV. p. 20,

schoenbrunensis nigra. semperflorens BM. fl. pl. sinica HK? solstitiales B. (R. dumetorum (Thuil? (collina MB. spec. ex Alpe Kaischaur. e Wladi Caucaso. - e Tauria.

of spinosissima LA. sulphurea HK. fl pl. taurica MB.

tomentosa Sm. turbinata HK. uncinella mihi *)

villosa L. virginiana. ROSMARINUS L. officinalis L. ROTTBOELLIA L.

(biflora Roth.

(pannonica Host.

monandra Cav. ROTHIA Schr. runcinata Roth. ROYENA L. lucida L. RUBIA L. cordifolia L. - xanthocarpa HGor linctorum L. RUBUS L. corsius L. canadensis? corylifolius? - caucasicus. fruticosus L. fl. ros. taur. __ fl. pl. hirsulus Wet K. idæus L. - fr flavo. laciniatus W. occidentalis Ta odoratus I. suxatilis L. RUDBECKIA L.

^{*} Confer Suppl. IV. p. 21.

* amplexifolia V. digitata HK. pinnata Vent. purpurea L. RUELLIA L.

ciliata Horn.

* lactea Cav.

* patula lacq.

tuberosa L. (varians Vent.

(Eranthemum pul-

(chellum BR.

RUMEX L.

(abyssinicus Jacq.

(arifolius L.

acetosa L.

- latifolia A. acetosella L.

acutus L?

al inus L.

aquaticus L. (arifolius All. (montanus HP. (hispanicus Gmel.

bucephalophorus L.

& confertus W.

crispus L.

divaricatus L.

*(exsanguis K.

(condyloides MB. hastaefolius MB.

hydrolaputhum HK.

lævigatus.

lunaria L.

nemoiapathum A.

nemorosus Schrad.

obtustfolius L.

"(palustris Sm.

(maritimus L.

patientia L.

sanguineus L.

scutatus L.

* spinosus L. undulatus HP. A.

verticillatus.

3% vesicarius L. RUSCUS L.

aculeatus L.

androgynus L. hypoglossum L.

hypophyllum L. racemosus L.

RUTA L.

angustifolia.

graveolens L.

* halepensis L.
SABAL Guers.
Adansoni Gue.
SACCHARUM L.
officinarum L.
Ravennæ L.

strictum Host. (Andropogon) violaceum. SAGINA L. procumbens L. SAGITTARIA L. cuneifolia Steph. sagittæfoliu L. _ b. minor. SALICORNIA T. fruticosa L. SALIX L. babylonica L. acuminata L? ? _ variegata. alba L. aurita L? (Besseriana Host. (malifolia B.

capræa L.

fragilis L. helix L. herbacea L. incubacea W. leucophylla W Illm. Boreyko, pentandra L. (prainosa mihi. (acutifolia W. riparia W? A. spec. spec. triandra L. undulata W. viminalis L. vitellina L. SALSOLA L. fruticosa L. Kali L. SALVIA L. abyssinica Jacq. (nilotica Mur. acetabulosa I.? aegypliaca L. æthiopis L. amarissima Ort.

albiflora?

amplexicaulis Lam. angustifolia Cav.

* argentea L.

* aurea L. aurita?

* austriaca Jacq. A.
bicolor Jacq.
campestris MB.
canariensis L.
ceratophylla L.
clandestina L.
coccinea L.
disermas L.
(dumetorum A.
(pratensis minor Cat.
(1811.
(formosa l'Her.
(leonuroides Glox.

* glutinosa L.

* grandiflora Schr.

*(Hablitziana Pall. (scabiosæfolia Lam.

*(hirsuta Jacq. (sideritidis V. hispanica L.

* horminum L.

truncata. indica L. interrupta Schousb. *(lanceolata Brouss. (reflexa V. lusitanica Lam. ly ata L. mexicana L. micrantha V. napifolia Jacq. nemorosa W. - fl. albo A. nutans L. - aff nis A. oblongata V. officinalis L. - fol. pictis. __ fol varieg. pinnata L? pomifera L. pratensis L. - f' rubris - fl. albis.

pseudococcinea Jacq. rosea? rugosa HK?

run.

runcinata Jacq.

sclarea L.

* serotina Ard. spinosa L

* sylvestris L. tiliæfolia V. triloba L. variegata W et K.

* verbenaca L.

* verticillata L. - fl. albis A. virgata L.

viridis L. viscosa Jacq. SAMBUCUS L. ebulus L.

nigra L. _ laciniata L. racemosa L. SAMOLUS L. Valerandi L.

SANGUISORBA media L.

officinalis L. SANICULA L.

europea L.

SANSEVIERA Th. carnea BR. fragrans L. (Aletris) guineensis Jacq. ? - fol viridibus. zeylanica W. SANTOLINA L. alpina L. chamæcyparissus L. squarrosa W. viridis W. SAPINDUS L. saponaria L. SAPONARIA L. ocymoides L. officinalis L. _ fl. pl. porrigens L. vaccaria L A. SARACHA Ret P. (procumbens Jacq. (ATROPA.

SATUREJA L. hortensis L. juliana L.

mon-

* montana L. rupestris Wulf. sophia.

* thymbra f..
SAXIFRAGA L.
aizoon Jacq.
crassifolia L.
geranioides Gouan.

* geum L.

* granulata I. Grab.
hirculus L.
hypnoides L.
longifolia Lapeyr.
rotundifolia L.
sarmentosa Th.

* Sternbergii W. tridactilites L.

(SAUSSUREA Dec. (Heterotrichum MB.

(Serratula L. amara L. SCABIOSA L. africana L? agrestis W et K. alpina L. amoena Jacq. £ argentea L.

* arvensis L.

* atropurpurea L

*(australis Wulf Illen. (Rat.

(inflexa Kluk.

bannatica W et K.
campestris A.
canescens W et K.
caucasica MB.
columbaria L.
connata.
graminifolia W et K.
gramuntia L.
isetensis L.
lævigata W et K.
laxiflora W.
leucantha L.

* longepedunculata HGor.

lucida Vill.

montana MB.

* ochroleuca L.
pubescens W et K.

* pyrenaica All.

* Scapalii HV

* Scopolii HV.

* sicula L.

* stellata L.

succisa L.
sylvatica L.
syriaca L.

tata ica L.
transylvanica L.

* ucranica L St uralensis Murr A. SCANDIX L.

* pecten L.
SCHINUS L.
molle L.
(SCHOLLIA Jacq.

(Hoya HK. (crassifolia Jacq.

(Asclepias carnosa L. SCHULTESIA Spr.

*(petræa Sw.

(Chloris.

SCILLA L.

autumnalis L.
bifolia L. Miech.

- fl. albo.

campanulata L. italica L.

maritima L.

* peruviana L.

(sibirica BR.

(amoena MB. SCIRPUS L.

ocicularis L

acicularis L. caricinus Schrad.

holoschoenus L A.

* lacustris L.
Michelianus L.
maritimus L A.
palustris L.
sylvaticus L.

SCLERANTHUS L.

annuus L.

perennis L.
SCLEROCARPUS

Jacq.

africanus Jacq.
SCOLOPENDRIUM

Sm.

(officinarum.

(Asplenium Scolopen-

drium L.

SCOLYMUS L.

* maculatus L.
SCOPARIA L.

* dulcis L.

SCORPIURUS L.

- muricala L.
- * subvillosa L.
- * sulcata L.
 SCORZONERA L.
 angustifolia L.
 calcitrapifolia V.
 caricifolia Pall.
 glastifolia W.

* hispanica L. humilis L.

- * rosea W et K.
 stricta Horn.
 taurica MB.
 SCROPHULARIA L
 altaica Murr.
- aquatica L.
 auriculata L.
 Balbisii Horn.
- betonicæfolia L.
 biserrata.
 chrysanthemifolia MB.
 glabrata HK.
- * glandulosa W et K.
 hirsuta.
 laciniata W et K.

* lucida L.

mellifera Desf.
nodosa L.
obtusifolia.
orientalis L.
peregrina L.

orientalis L.
peregrina L.
sambuifolia L.
scorodonia L.
trifoliata L.
tanacetifolia W.
vernalis L.

SCUTELLARIA L.

* albida L.

columnæ.

galericulata L.

* lateriflora.

*(lupulina L. Fr. (verna B. ovatifolia Pers.

(peregrina L? A.

SECALE L.

"(cereale L. A.

(- æstivum.

(- tunetanum.

— hybernum.

*(- archangelicum

(- montalbanum.

(- norvegicum .

(- multicaule.

(- wallachieum.

(- villosum L. SEDUM I. acre L.

minus A.

* aizoon L.

* album L. alpestre Vill.

315 anacampseros L. desyphyllum L.

glaucum Wet K. hispanicum HK.

* hybridum L. maximum HP.

* pallidum MB.

* populifolium L.

portulacoides Muehl.

purpureum A. recurvatum W.

rupestre L?

: 15 saxatile All? sexaugulare A.

* sexfldum MB.

* spathulatum Wet K.

* spurium MB.

* stellatum L.

* telephium L. SELINUM Hoffm.

* carvifolia L.

* baicalense Red.

(corvaria L.

(ATHAMANTA.

"(oreoselinum L.

(ATHAMANTA. peucedanoides Desf.

SEMPERVIVUM L

aizoides Lam. *)

^{*)} S. aizoides Lam. nimis est affine S. tortuoso. quam ut generice ab hoc possit separari; (Conf. Pers. Syn. pl. P. l. p. 511, ubi sub Sedo divaricato citatur;) aut utrumque ad Seda est relegendum.

arachnoideum L.
arboreum L.
— fol. atropurp.
— fol. varieg.
canarieuse L.
hirtum L?
globiferum L?
tectorum L.
tortuosum HK.
SENEBIERA Dec.

*(didyma L. (pinnatifida Dec. SENECIO L.

* aqualicus Sm.

* arabicus L. artemisiæfolius Pers.

* cernuus L.
chrysanthemifolius
Poir.

coriaceus HK.

croaticus W et K. dentatus Jacq. desquamatus W.

elegans L.

— fl. pl.
crucæfolius L.
halimifolius L.

* hieracifolius L.

Jacobæa L.

— affinis *)

* lividus L.

(macrophyllus MB. A.

(Doria B.

montanus Hoppe.

nemorensis Jacq.
paludosus L.

rigidus L.

rupestris W et K. saracenicus L. A.

squalidus L.

*) Major. Radius apice crenatus, longior, magis aureus. Anthodii phylla apice sphacelata. Calyculi squamæ et bracteæ adpressæ.

apice reflexo emarginatus. Calyculi squame subsphacelatæ adpressæ. Bracteæ patulæ Folia obscure viridia, laciniis angustis. tenuifolius Jacq 1*) A. * (cyanoides L. volhynicus III. Rat. 2*) - affinis 3") A.

triflorus L.

* umbrosus Wet K A.

* verbenæfolius Jacq. vernalis W et K.

* viscosus L. vulgaris L. SERIANA V. (mexicana L. (PAULLINIA. (SEBIOLA L.

æthnensis. SERISSA Juss. fætida L. __ fl. pl. SFRRATULA L. ciliata V.

coronata L.

(CARDUUS. lyrata.

*(mollis L. (CARDUUS.

(nitida Wet K. A.

(CARDUUS.

(heterophylla, Dec. quinquefolia MB.

(radiata W et K. A.

*(CARDUUS.

(pinnatifida HP. (S. centauroides MB.

(excluso Syn. Linnei) setosa W?

* tinctoria W. SESBANIA Poir

*(aculeata W. (CORONILLA. SESAMUM L.

orientale L.

2*) Confer Suppl. III. p. 22.

^{3*)} Major Radius semilineam latus, patentissimus, apice adscendens. Calyculi squamæ patentes, imo patentissimæ. Bracteæ patentes. Folia lætius viridia, laciniis latioribus, magis incisis. Per Ucraniam et Bessarabiam frequens.

SESELI L.

* corsicum.
dichotomum (non
MB) tauric.

sicum. L. cauca-

tauric.

*hippomarathrum L.Fr.

* leucospermum Wet? montanum L.

* Pallasii.

petræum MB.

pyrenaeum L.

spec. e Cauc.

* tortuosum L A.
— caucasicum.

? — tauricum.

*(venosum Hoffm.
(selinoides mihi *)
SESUVIUM L.
revolutum Dec.
sessile Dec.
SHERARDIA L.

* arvensis L.

SICYOS L. augulata L. SIDA L. (abutilon L. alnifolia L. (angusti olia L. (asiatica L. (carpinifolia L. crenatiflora Art. (crispa L. (cristata L. (deflexa Cav. hastata Cav. hirta Cav. (jatrophoides l' Her. (mauritiana Jacq. mollissima Cav (rhombifolia L. (rotundi olia Cav. Sonneratiana Cav. (spinosa L. ((stellata Cav.

(nudiflora l'Her.

(tiliæfolia HGor.

(tri_

^{*)} Confer Suppl. II. p., 15.

(triquetra L. (triloba Jacq.

(umbellata L. (vesicaria Cav. SIDERITIS L. canariensis L.

cretica L.

* montana L.

* scordioides Mill. taurica MB. SIEGESBECKIA L.

* flosculosa L.
SILENE L.
acaulis L.
alpina.

amoena L?

* antirrhina L. apetala L. armeria L.

bassanensis Sternb.

bellidifolia Jacq.

bipartita Desf.

canescens Schott. fill

carnosa.

chlorantha Ehrh.

clandestina W.

conica L.

considea L. corsidea Dec.

cretica L.

" dichotoma Ehrh. A.

disticha W.

* eranthema.

*(fabaria L. (CUCUBALUS.

fimbriata MB.

(CUCUBALUS WetK.

* fruticosa L.

gallica L.

gigantea L.glutinosa Retz.

(Cucub. catholicus Is.

hirta?

(inflata Sm.

(Cuc. behen L. — alpina. HP. infracta W et K.

5

*(italica Jacq. (CUCUBALUS.

linifolia W.

* livida W.

longicaulis Poir.

* longifiora Ehrh. Fr.

* lusitanica L.

* marginala Schott. fil.

* maritima W. (mollissima L.

CUCUBALUS.

*(multiflora Ehrh. (CUCUBALUS.

* muscipala L. Mussini.

* mutica.

nemoralis Wet K.

noctifiora, L.

* nocturna L. nutuus L. __ fl. ros. A. nyctantha W. obtusifolia W.

* ornata HK.

(otites L. CUCUBALUS.

r paradoxa L.

(parviflora Ehrh. (CUCUBALUS.

pendula L.

petræa W et K.

picta Pers.

*(pilosa W.

CUCUBALUS.

pinguis V.

quiquevulnera L.

rubella L.

saponariæfolia Schott. fil.

saxatilis MB.

saxifraga L.

*(scabra HGor.

CUCUBALUS. sedoides Jacq.

spec. e Dahur. HGor.

_ Banatu Rl.

stricta L.

* supina MB.

(tatarica L. A.

(CUCUBALUS.

* tricuspidata.

* vespertina Retz.

* viri iflora L.

*(viscosa L. A.

(CUCUBALUS. volgensis. (SILER Gærtn. (Laserpitium. aquilegifolium Jacq.A SILPHIUM L. connatum E. perfoliatum L. ternatum L. SINAPIS L. (alba L. (Allionii Jacq. (arvensis L. (erucoides L." (foliosa W. (hispida Schousb. (incana L. (incisa. "(integrifolia Vest. (juncea L. (lævigata L. (nigra L. (orientalis L. (pyrenaica L. (pubescens L. (retrohirsula.

(tortuosa.

SISON L. ainmi L. amomum L. canadense L. segelum. SISYMBRIUM L. affine W. amphibium Laquaticum. asperum. barbarea L. bursæfelium L. Columnæ Jacq. contorium Cav. eckartshergense L. erysimoides L. hispanicum Jacq. irio E. (junceum Wet K. A. CHEFBANTHUS. (Erysimum W. Loeselit Li. monense All. murale L. ::: obtusangulum Hall. f. oriențale L.

palustre Poll.

pyrenaicum L.

sophia L.

* strictissimum L.A.
sylvestre L.
tenuifolium L.
SISY RINCHIUM L

anceps Lam?

bermudiana Li.

convolutum Nages.

striatum Sm.

tenuifolium H et B.
SIUM L.
sisarum L.
SLATERIA Desv.
(jpponica Th.
(CONVALLARIA.
SMILAX L.
aspera L.
rotundifolia L?
sarsaparilla L.
SMYRNIUM L.
aureum L.
SOLANDRA Sw.
grandiflora Sw.
SOLANUM L.

aculeatissimum Jaco æthyopioides Sw. alatum. auriculatum HK. bombense Jacq. * ciliare W. corymbosum Jacq. diphyllum L. dulcamara L. guineense W. humile Bernh. hybridum Jacq. igneum Jacu. lycopersioum L. - macrocarpum. 14 - pyriforme. 1/3 macrocarpon L. marginatum L. *(miniatum Bernh. (judaicum B. nigrum L. nodiflorum Jacq. oporinum W? pseudocapsicum L. pyracantha Lam. radicans L. reclinatum l'Her.

sodomæum L.
(Thouini Sohult.)
(formosum HD.
*(brancæfolium Jacq.
(mauritianum W.
tomentosum L.
tuberosum L.

aracatscha. Zuccagnianum. SOLDANELLA L. alpina L. SOLIDAGO L. aspera HK. cæsia Mill. canadensis L. cinerea. flexicaulis L latifolia hirla W. lanceolata L. lateriflora L. nemoralis HK. procera HK. reflexa HK. rigida L. sempervirens L. varia? pirgaurea L.

SONCHUS L. acuminatus W. arvensis L. asper Hoffm. caucasicus Spr. chinensis HGor. fruticosus l'Her. lacerus W. lapponicus Frol. leucophæus W. oleraceus L. palustris L. Plumieri L. prenanthoides MB. spec. e Dahur, tenerrimus L. SOPHORA. japonica. tetraptera. spec. SORBUS L. (alpina L ? *(CRATÆGUS. (intermedia Ehrh? (aria L. (CRATÆGUS. aucuparia Li

domestica L.

* hybrida L. lanuginosa.

(latifolia Lam.

(CRATÆGUS.

(torminalis L.

(CRATAGUS.

(SORGHUM Pers.

(Holcus L.

Arduini.

bicolor L.

cernuum W.

rubens W. *

36 saccharatum L. SPANANTHE Jacq. paniculata Jacq. SPARAXIS Gawl. grandiflora BM. tricolor BM. SPARGANIUM L. ramosum Sm. simplex Sm. SPARMANNIA L. africana L. SPARTIUM L.

junceum L. linifolium L. multiflorum L. patens L.

radiatum L.

SPERGULA L.

arveusis L.

(glandulosa B.

(nodosa L.

pentandra L A. SPERMACOCE L.

hispida L.

* rubra Jacq.

tenuior L.

(SPHONDYLIUM Hoff.

(Heracleum L. branca ursi L (H. sphondylium) longifolium Jacq.

*(pubescens Hoffm? (H. speciosum HD.

*(pyrenaicum MB.

(H. tauricum H Tig. SPIELMANNIA. Med.

(africana L. (LANTANA.

SPIGELIA L.

marylandica L.

SPINACIA L.

* oleracea L. SPIRÆA L. acutifolia W. altaica Pall.

* aruncus L. -- caucasic. (carpinifolia W. (salicifolia, paniculata. HK.

chamædrylolia Pall. * _ ? volhynica.

_ var? crenata L.

3 _ rotundifolia A filipendula L.

__ fl. pl. flexuosa HGor */ hypericifolia L. lævigata L?

* lobata Jacq. oblongifolia W et K. opulifolia L.

salicifolia L.

*) Affinis Sp. ulmifoliæ. E Dahuria. 1") Anne hujus loci et A. diandra?

dahurica HGor.

_ .carnea. sorbifolia L.

_ grandiflora Pall.

tomentosa L. trifoliata L. triloba Pall.

- præcecior H Gor.

ulmaria L.

__ fl. pl. ulmifolia Scop. SPOROBOLUS Brown.

(tanacissimus L. AGROSTIS 1#) STACHYS L.

alpina L. annua L. circinata L. coccinea, Jacq. erecta? germanica L. intermedia HK.

lanala L.

patustris L.
(pubescens Tenore.
(sideritidis.

* recta L. rugosa HK.

*(scordifolia W. (purpurea. sibirica HP.

* sylvatica L. ...
(STACHYTARPHE-(TA V.

Cymburus Salisb.

(Verbena L.

* angustifolia V.

jamaicensis L.

mutabilis Jacq.
 prismatica L.
 STÆHELINA L.

* chamæpeuce L. STAPELIA L. buffonia Jacq.

* cæspitosa Mass.
geminata Mass.
grandiflora Mass.
hircosa Jacq.

hirsuta I. maculosa Jacq. marmorata W. paniculata W. planiflora Jacq. reclinata Mass. revoluta Mass. roriflua Jacq. tubata Jacq. variegala L. - ? monstrosa. verrucosa Mass. vetula Jacq. STAPHYLEA L. pinnata L. trifoliata L. STATICE L. auriculæfolia V? elata HGor. flexuosa Pall. e Dahuria. Gmelini W. (latifolia W. (coriaria Pall. monopetala L. mucronata L.

olese-

oleæfolia Scop.
reticulata L.
scoparia Pall.
sinuata L.
spathulata W?
spec. e Sibirica.
virgata Jacq.

* tatarica L. A.

STELLARIA L.

alsine W A.

graminea L.

nemorum L.

holostea L.

media L. (Alsine)

palustris Retz A.

STELLERA L.

passerina L A.

STERCULIA L.

platanifolia L.

STEVIA L.

* eupatoria W.

ivæsolia W.

*(ovata W. (paniculata HP. pedata Cav.

* purpurea Bout,

STIPA L.

* aristella L.

capillata L.
juncea L.
pennata L.

STRATIOTES L.

aloides L.

STRELITZIA Banks
Reginæ Banks

STYLLINGIA Mich.

(sebifera L.

(CROTON.

SUCCOWIA Moench

*(balearicca I.

(BUNIAS.
SWERTIA L.
perennis L.

(SYLIBUM Vaill.

(Carduus L.

" marianum L.

SYMPHORICARPOS Dill.

(vulgaris L.(Lonicera)

(parviflora HP. SYMPHYTUM L.

bullatum Horn.

* tauricum W.
tuberosum L.
SYNTHERISMA
Mich.

Digitaria Pers.

aegyptiacum A.
glabram Schrad.
vulgare Schrad.
SYRINGA L.
chinensis W.
media B. C.
persica L.
— laciniata.
— fl. albo
rothomagensis Hort.
vulgaris.
— pallida.
— rosea?
— alba.

TAGETES L.

erecta L. lucida Cav. patula L. TALINUM. anacam pseros L. palens W. reflexum Cav. TAMARIX L. gallica L. germanica L. A. tetrandra Pall. TANACETUM L. vulgare L. - crispum. (TARAXACUM Hall (Leontodon L. lividum W et K. (dens lecnis Desf. (L. Taraxacum. (salinum mihi *) A. (bessarabicum HGor.

serotinum W et K.

^{*)} Nomen triviale hujus speciei muto; non provenit enim testante cel. Fischero ex Besserabia, sed ab Illmo L. B. Marschall a Bieberstein e Podolia allata fuit, ubi in salsuginosis crescit-

ranchonanthus *
camphoratus L.
*
TAXOOIUM Rich.
distichumL(Cypressus)

* distichum L(Cypressus)
TAXUS.
baccata L.

(TENORIA Spr.

(Bupleurum L. fruticosa L

(TEPHROSIA Pers.

(Galega L, cinerea?

* ochroleuca L. TETRAGONIA L.

* cristallina l'Her.

* echipata HK.

** expansa Murr.
TEUCRIUM L.
asialicum L.

betonicum l'Her. botrys L. canadense Mill.

* chamaedrys L.

* flavum L. fruticans L.

* hyrcanicum L. Laxmanni L. A.,

marum L.
massiliense L.
orientale L.
regium Schr.

scordium L. scorodonia L.

supinum Jacq.
THALICTRUM L.
alpinum L.
angustifolium Jacq.

aquilegifolium L.

concinnum W.

discolor W.

* elatum Jacq.

* flavum L A.

foetidum L.
glaucescens W.
laserpitiifolium W.

* majus lacq.

* medium Jacq.

* minus L?

nigrescens Jacq. nigricans Jacq. Grab.

nigrum.

nutans W.

* oligospermum HGor.

purpurascens L.

rugosum HK.
ruthenicum.
sibiricum L.

* simplex L.

*(speciosum W. (glaucum HP. THESIUM L. ebracteatum H. linophyllum L. THLASPI L.

arvense L. campestre L.

* ceratocarpon L.

* perfoli tum L.

* saxatile L. THRINCIA Roth.

k hirta L

* hispida Roth.
THUIA L.

occidentalis Li.

* orientalis L.
THYMUS L.
acicularis W et K. A
calamintha L.
creticus L

* fileformis HK.

(hirsutus MB. (pannonicus All. (serpyllum var. 4. B. Marschallianus W. -a augustifolius A. -b. (latifolius. (serpyllum Var. 5. B. * mastichinus. (montanus. (serpyllum Var. 3. B. nepeta L. serpyllum L. - a. exserens Ehrh. - b. includens Ehrh. - c.villosum HP. - d.var. 7. B. vulgaris L. THYSSELINUM (Hoffm. Selinum L. palustre L. Schiwerekii B. TIARELLA L. cordifolia L. TIGRIDIA Juss.

pavonia L. (Ferraria)

TILIA L. americana L. platyphylla Scop. microphylla Vent. TOFIELDIA Sm.

* palustris Sm? *) TOLPIS Gertn.

* (barbata L. (CREPIS. TORDYLUM L. apulum L. syriacum L. (TORILIS Moench. (Caucalis W.

anthriscus I. (TORDY LIUM. (arrensis Huds A. (CAUCALIS.

- officis A.

*(infesta Jacq. (SCANDIX.

*(nodosa L.

(TORDYLIUM. TORMENTILLA L

erecta L.

TOURNEFORTIA L mutabilis Vent. volubilis L. TRACHELIUM L.

* cæruleum L. TRADESCANTIAL * cristata Jacq.

discolor l'Her. * erecta Jacq.

undata W. virginica L.

- fl. albo. (TRAGIUM Spr.

(Pimpinella L. anisum L. peregrinum L. TRAGOPOGON L. angustifolius Bell. canus W et K. A.

crocifolius L.

mijor L. orientalis L.

porrifolius L.

pratensis L.

2/4 rossicus HGor.

^{*)} Confer Catal. An. 1811. p. 109.

" undulatus L. villosus L. TRAPA L. nataus L. TRE IBANA W. (coccinea Scop.

*(ACHIMENES Pers. Cyrilla pulchella

(I Her.

TRIANTHEMAL. * monogyna L. TRIBULUS L.

* terrestris L. A. TRICHODIUM Mich. diffusum Mich. (TRICHONEMA

(Gawl. (IXIA I.

bulbocodium L. roseum L. TRIENTALIS L. europæq L.

TRIFOLIUM L. albidum L. alpestre L. arvense L.

bracteatum Schousb:

campestre.

Cherleri L. clypealum L. diffusum Ehrh.

elegans Sav. elongatum.

expansum W et K.

filiforme L.

fragiterum L. glomeratum L. hispidum Desf.

hybridum L.

incarnatum L. medium L. minus.

montanum L. ochroleucum L. A.

pallidum Wet K.

pannonieum L. parviflorum Ehrh.

2;5 pensylvanicum W.

* pictum Roth. pratense L.

repens L.

__ fusco maculatum

resupinatum L.

rubens L.

scabrum L.

- ? caucasicum.

* spadiceum L. spumosum L. squarrosum L. striatum L.

* suaveolens W. TRIGLOCHIN L. maritimum L. palustre L. TRIGONELLA L.

(corniculata L. (esculenta Roth. (foenu graecum L.

(ornithopodioides. *(pinnatifida Cav. (polycerata L.

(ruthenica L.

(spinosa L. (striata L.

(TRINIA Hoffm.

(Pimpinella. Henningii Hoffm.

spec ? TRITICUM.

*(caninum L.

(ELYMUS.

compositum L.

aristatum.

*(cristatum.

(BROMUS Schr. A.

densiflorum W?

imbricatum MB., intermedium Host.

polonicum L.

prostratum L. repens L.

rigidum Schrad.

sibiricum V.

(spelta L.

(- aristata.

(- bengalensis.

*(- italorum.

(- nigra.

(- subcomposita.

guarrosum Roth.

(patulum W.

(Secale pungens Pers.

turgidum L. ustulatum.

variegatum Stev. (vulgare æstivum.

(— e Candia.

- siculum Mischio

(_ s. Sambucara. - (_ s. scorzone di sommatino. (-- s. Timilia. 1 _ s. Vinciatutti. (- hybernum. *(__ creticum. (_ _ neapolitanum . Saravolla. (- Pinkelweitzen. (- sardinicum. (-- tunetanum. (- Wechselweitzen. (zea . Host. (TRITOMA Gawl. (Aletris L. (media Gawl. (sarmentosa BR. uvaria L. (TRITONIA Gawl. Jxia L. crocata L. - b. rosea. squalida HK. - et var. b.

viridis.

TRIUMFETTAL. semitriloba L. TROLLIUS L. europæus L TROPÆOLUM L. majus L. minus L. __ fl. pl. TULIPA L. Gesneriana L. - fl. pl. - oculus solis. suaveolens W? sylvestris L. turcica W? TURNERA L. ulmifolia L. TURRITIS L. glabra L. hirsuta L. nutans. stenopetala W. scabra. TUSSILAGO L. anandria L. jarfara L.

nivea Vill. odorata. petasites L. A. TYPHA L. angustifolia L. ·latifolia I. ULEX L. europaeus L. ULMUS L. americana L? campestris Li. parvifolia Jacq. suberosa Ehrh. spec. URENA L.

B lobata L. (UROSPERMUM (Scop.

(Arnopogon W.

* capense Jacq.

Dalechampii L.

picroides L. URTICA L.

astuans L.

balearica L.

cannabina L. doica L.

Dodartii L.

* membranacea Desf. nivea L.

- fol. varieg.

24 pilulisera L. urens L. UTRICULARIA L. vulgaris L. A. VACCINIUM L. myrtillus L. wiginosum L.

vitis idea L. VALANTIA L. aparine L.

glabra L.

hispida L?

* (muralis L. (Galium.

pedemontana L. taurica Pall. VALERIANA L.

altissima? A.

dioica L.

officinalis L.

* phu L.

(VALERIANELLA T. * Boerhaavii L.

(Fedia W.

(Valeriana L .

(coronata L.

(dentata L. A.

(discoidea L.

*(echinata W.

(radiata W.

(rugulosa Spr.

(vesicaria L.

VANILLA Sw. pfanifolia BR. VELLA L. psendocytisus L.

VELTHEIMIA Gled.

glauca HK.

* viridifelia Jacq.
VERATRUM L.
album L.
Lobelianum Bernh.
nigrum L.
VERBASCUM L.
acuminatum Schrad.

* album ?

austriacum Schrad.

blattaria L. Jll. Rate

_ laciniatum.

Boerhaavii L.
condensatum Schradeuspidatum Schradelongatum W.
floccosum Wet K.
formosum H Gor.

- ibericum.

— tauricum. glabrum W. Hornemanni.

Lychnitis L.
macranthon Link.
mixtum.
montanum Schrad.
(nemorosum Schrad.

(phlomoides B.
nigrum L.
orientale A.
phlomoides L.
phoeniceum L.
pyramidatum Mi

pyramidatum MB.
repandum W.
rugosum?
rugulosum W.
speciosum Schrad.

thapsoides L. thapsus L. VERBENA L.

* bonariensis L.

* bracteata Mich.

* hastata L.

officinalis L.

nugosa Muchl.

stricta Vent.

* supina L.

verbesina L.

* alata L.
crassifolia
dichotoma Murr.
gigantea Jacq.
serrata Cav.
VERNONIA L.

* anthelmintica L. VERONICA L. agrestis L. amethystina W.

anagallis L.

arguta Schrad.

australis Schrad.

austriaca L. A.
beccabunga L.

*(canescens Schrad.
(neglecta V.
caucasica MB.
chamædrys L.

* complicata Hoffm.

— fl. albo

condensata?
crassifolia.

(crenulata Hoffm. (villosa Schrad. decussata L. dentata Schm.

digitata L.

clatior Ehrh.
foliosa W et K.

gentianoides V.

glabra Schrad?

* hybrida L? * incana L. A.

* incisa HK.

* laciniata HK.

* lævigata.

latifolia Jacq.

longifolia Schrad A.

longiflora?

media Schrad.

mollis H. Madr. (melissæfoliamultifida L.

e officinalis L.

* orchidea Cr.

* orientalis HK.

* persica Desf.

(filiformis B.

* pinnata L.

prostrata Li. saxatilis L.

scutellata L.

* serpyllifolia L.

* serrata Hoffm.
sibirica L.

spicata L.
spuria L.
taurica MB.
triphyllos L.

* verna L.

virginica L. VESTIA W.

(lycioides W.

(Periphragmos fætidus R et P.

VIBURNUM L. dentatum L.

lantana L.

opulus I..

- sterile (Boule de neige)

* tinus L.

VICIA L.

(angustifolia Roth,

(articulata W.

(bætica Schousb.

*(bengalensis L.

(bicolor.

(biennis L.

(bithynica L.

dumetorum L.

((ervilia L.

((ERVUM.

(faba L.

(- chinensis.

*(ferruginea.

(globosa Retz.

hirta.

(hybrida L.

(lathyroides L.

(lutea L.

(megalosperma MB. (Michauxii Spr. * (narbonensis L . (nissoliana L. (peregrina L. pisiformis L. * platycarpos Roth. polyphylla Desf. sotiva L. sepium I. (serratifolia Jacq. (sibirica. (sordida W et K. st (spec e Dahuria. (sylvitica L.

herbacea Wet K. A minor L. - fol. argenteo - varieg | arenaria Dec.

tenuifolia Roth.

villosa Roth.

VINCA L.

- fol. auro varieg. fl. pl. rubro. major L. rosea L.

* -- fl. albo (VINCETOXICUM

(Moench.

(Asclepias L.

* nigrum L. ___ volubile.

(officinale Moench.

(A. Vincetoxicum L.

minus.

VIOLA L.

* arvensis L.

* campestris MB.

s canina L.

* __ ? podolica *) collina nobis 1th, A.

*(glauca MB. 24)

^{*)} Confer Suppl. IV. p. 25.

^{2*)} Confer Suppl. III. p. 25. et IV. p. 25.

^{1*)} V. (acaulis) stolonibus nullis, subhirsuta, foliis cordatis, calveibus obtusis, floribus .

hirta L.

lancifolia Dec?

mirabilis L.

montana L.

odarata L.

— ? alba. fl. pl.

* _ ? taurica.
_ fl. pleno.
_ semperflorens.
persicæfolia Røth Fr.

rothomagensis Th.

* rupestris.

* rupestris.

* tricolor L.

— hortensis.

— fl nigro.

VISCUM L.

* album L. VITEX.

* agnus castus L. incisa L. VITIS L. incisa Jacq. labrusca L. laciniosa L. vinifera L. - apyrena. vulpina L. VOLCAMERIA L. aculeata L. inermis L. ligustrina Jasq. WALDSTEINIA W. geoides W. WATSONIA Mill. meriana L. (Antholyza) rosea.

ribus odoratis; mihi. Crescit in apricis elatis, floret prima vere. Flores pallide lilacini parvuli. Affinis V. odoratæ campestri et liirtæ, sed prima præter magnitudinem majorem floris et colorena ejusdem differt stolonibus, altera foliis sub cordato-ovatis pubescentibus et tentia denique floribus inodoribus et foliis cordato-ovatis piloso - hispidis.

WEDELIA Jacq.

perfoliata W.

 WES ERINGIABR

* rosmarinifolia W. WULFENIA Jacq. carinthiaca Jacq. XANTHIUM L.

* echinatum Murr.

orientale L. strumarium L.

* spinosum L. A. XERANTHEMUM L.

* annuum L A.

* — fl. albo.

XYMENESIA Cav.

* encelioides Cav.

XYLOPHYLLA L.

ramiflora L.

(XYLOSTEUM T.

(Lonicera L. alpigenum L.

cæruleum L.
hispidum Steph.
marylandicum ?
nigrum L.

* tataricum L.

(dumetorum Pers.
(L xylosteum L.
YUCCA L.
aloifolia L.
draconis L.
gloriosa L.
ZACINTHA T.

* verrucosa Gærtn.
ZALUZANIA Pers.

*(triloba Ort.

*(triloba Ort.

(ANTHEMIS:

ZANTHOXYLONL

fraxineum L.

(ZAPANIA Juss.

(Verbena L. nodiflora L.

ZEA L.

mais L.
ZINNIA L.

multiflora L.

* revoluta Cav.

verticillata B.R.

(ZINGIBER Rosc.)
(Amomum. L.

officinale L.

ZOSIMA Hoffm.

(orientalis L.
(Heracl. absynthifoliom Vent.
ZIZYPHORA L.
acynoides.
* capitata L.
spicata Cav.
serpyllaces MB.

tenuior.

ZIZYPHUS W.
(vulgaris W.
(Rhamnus zizyphus L.
(ZUCCAGNIA Th.
(Lachenalia W.
(Hyacinthus L.
viridis:
ZYGOPHYLLUM L.
fabago L.

ADDENDA.

Achillea.
myriophylla.
Amygdalus.
persica fl. pl.
Anthericum.
spec. e Tauria.
Arum.
orientale L.
Asparagus.
spec. e Tauria.
Calendula.
fruticosa L.
Carica.
papaya L.

Cassia.
procumbens.
Cerastium.
lanatum.
Cerinthe.
major L.
Convolvulus.
saxatilis.
Cuscuta.
lupuliformis Krok *) A
Datura.
fastuosa fl. pl.
Doliehos.
soia L.

^{*)}C.monogyna e Tiflis fert caspulas tetraspermas.

Dracocephalum. denticulatum. Frodium. moschatum. Erynthrina. corallodendron. Euphorbia. meapolitana? Galanthus. , nivalis fl. pl. Georgina. variabilis alba. Helianthus pubescens. Hesperis. tristis. HEUCHERA: americana. Jasminum. sambae fl. pl. Ixia.

capitata lutea. Linum. maritimum. Lupinus linifolius. MELANANTHERA Pers. (deltoidea Pers. (Galea aspera Wa Mentha. cervina. Melilotus. uncinale. Onobrychis. Buxbaumii MB. Oxytropis. deflexæ affinis. Pyrus. hybrida Moench! Saussurec. alata Dec.

Figura media tab. 42. Flor. Ross. Pallasii, que repræsentat secundum cel. autorem Robiniæ altaganæ arborescentis ramulum florentem, videtur eadem cum nostra Robinia fruticosa. Sideritis. fætida. Sison. crinitum

(nodiflora L. (Verbesina. TRISETUM. paniceum. Zinnia. SYNEDRELLA Pers | elegans Jacq.

A HERETHERA LA

EXPLICATIO

Abbreviation um in hoc Catalogo

usitatarum.

Andrzejowski Ant. Adanson. Ad. Allioni. All. Aublet. Aubl. Primit Fl. Galic austriace Balbis. Balb. Botaniste Cultivateur. 8.C. ___ Botanical Magazine. BM. ___ Bellardi. Bell. Bernhardi. Bernh. -Botanists Repository B.R. Brotera. Brot. -Broussenet. Brouss. -Burmann. Burm. · coocate Cavanilles. Cav.

Cr. sie	Crantz,
Cyr.	Cyrillo.
Dec.	Dc Candolle.
Desf. ' —	Desfontaines.
Desv.	Desvaux.
Dr.	Dryander.
Donn.	C Hænkel a Donnersmark.
Duch	Duchesne.
Duh	Duhamel.
Ehrh. —	Ehrhart.
Fl. (Fluegge.
Forsk. —	Forskol.
Fr	Dr. Friedlænder
Fröl	Froelich.
Gærtn	Gærtner.
Gawl	Gawler.
Gmel.	Gmelin Fl. bad.
Good,	Goodenough.
Gron. —	Gronovius.'
H	Hayne.
Hall	Haller.
Hall.f	Haller filius.
THer	l'Heritier.
Hoffm	Hoffmann.
Horn, -	Hornemann.
Hort.	Hortulanorum.
HD (Weinmann) Hortus Dorpatensis

** ** *	(Park) H Talana
H. Ert.	(Bernh) H. Erlangensis.
H.Gor.	(Fischer) H. Gorenkensis.
H.K. —	(Aiton) H. Kewensis.
HM	H. Madritensis.
H.P. —	(Desf.) H. Parisinus.
H.V	(Schott) H. Vindebonensis.
HetB.	Humboldt et Bonpland.
Huds	Hudson.
Jacq. —	L.B. Jacquin (Nic.)
Jacq. f	L. B. Jacquin filius.
Juss,	Jussieu (Ant. Laur.)
к	Kitaibel.
Kampf.	Kæmpfer
L. —	Linne
Lab.	Labillardiere.
Lam. —	Lamark.
Lapeyr.	Picot Lapeyrouse
Laxm.	Laxmann.
Ledeb. —	Ledebour,
	Lepechin.
Lep.	
Loefl.	Loefling.
Lois,	Loiseleun
Mass.	Masson.
MB. —	L. B. Marschall Bieberstein.
MB. s. —	L B. MB. Floræ taurico-cau-
was the server.	casicae Supplem, inedit.
or Descriptions	Med
	The state of the s

A PARTY	The state of the s
Med, —	Medicus.
Mich. —	Michaux.
Mill.	Miller.
Mol. —	Molina.
Munchh	L. B. Munchhausen,
Murr.	Murray.
Mut.	Mutis.
Ort.	Ortega.
Palis. —	Palisot —Beauvois
Pall.	Pallas.
Pers	Persoon.
Plum. —	Plumier.
Poir	Poiret.
Pourr	Pourret.
Ram.	Ramond.
Rebent.	Rebentisch,
Red.	Redowsky
Ren	Renealm.
Roth. n. B.	Roth neue Beytræge

R. et P.— Ruiz et Pavon,
Rud. — Rudolphi,
Sal. — Salisbury.
Schk. — Schkuhr.

Schl. _ Schleichen

Schm. _ W. Schmidt.

Schm. Arb, F.Schmidt. Arboret. austriacum

Schoush -	Schousboe.
Schr.	Schreber.
Schrad	Schraden.
Schult, -	Schultes .
Scop.	Scopoli.
S.H. —	Schrad. et Wendl. Sertum
	hannoveranum.
Sm	Smith.
Spr.	Sprengel.
St. —	Steven.
Steph. —	Stephan.
Sternb, -	C. Sternberg.
Sw	Swartz.
T. —	Tournefort.
Ten. —	Tengre.
Th	Thunberg:
Tratt.	Trattinik.
Ucr. —	Ucria.
V.	Vahl.
Vent, -	Ventenat.
Vill.	Willars.
Viv. —	Viviani.
W	Willdenow.
W. En	W. Enumeratio.
W.En.s.	W. E. supplem.
Web -	Weber.
The state of the s	CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR

W.etK. __ C.Waldstein et Kitaibel.

Wendl — Wendland. Wulfen.

plantæ, quarum semina pro





desired a translation of the Mail - Ibun old Jim Roow Wallet ... Violen. planta, querem carriera pro committee thede mutage expent. A STATE OF THE PARTY OF THE PAR



